





FLORUM
ET
CORONARI














1819

387 Herbal.—DODONÆUS (R.) Flo
Coronariarum odoratarumque nonnullarum
barum Historia, sm. 8vo, many full-page
of plants, title little soiled, otherwise FI
tree calf, gilt, m.e., scarce, 21/-
Antv., Christ. Plan

L

415
387

Herbal
Dodonæus
21/-

m/d
400

21 a 4724

FL
CO
ON

RE
M

Ex

FLORVM, ET
 CORONARIARVM
 ODORATARVMQVE
 NONNVLLARVM
 HERBARVM
 HISTORIA,

REMBERTO DODONÆO
 Mechliniensi Medico auctore.



J. G. Leluyse Doctor de D. P. L.
 ANTVERPIÆ,

Ex officina Christophori Plantini.

M. D. LXXVIII.

SVMMA PRIVILEGIORVM.

CAVTVM est Regio priuilegio, ne quis alius
prater Christophorum Plantinum, librum
cui titulus est, *Florum & coronariarum odoratarumq;
nonnullarum herbarum Historia*, Remb. Dodonæo Mechli-
niensi Medico auctore, imprimat, vel alibi impressum
vendat hinc ad sexennium, sub pœna confiscatio-
nis librorum, vt latius patet in litteris datis Bru-
xellæ 2. Decembris M. D. LXVII.


Subsignat.

De Langhe.

Idem cautum est in Consilio Brabantia, ad toti-
dem annos, & sub pœnis ijsdem, vt in superiori
Priuilegio; quemadmodum latius patet in litteris
dati Bruxellæ 3. Decembris eiusdem anni.

Subsignat.

De Langhe.



CLARISSIMO AC
AMPLISSIMO VIRO;

D. IOACHIMO HOPPERO, AV-
rata militiæ Equiti, Domino de Dalem,
Regis Consiliario, & supplicum libello-
rum magistro, cognato suo, Rembertus
Dodoneus Medicus. S. P. D.



EFLOREBVS, odora-
tisq; ac coronarijs stirpi-
bus, Clarissime HOP-
PERE, multa nobis di-
cenda occurrerent, si
per omnes dicendi lo-
cos discurrere, & en-
comium scribere cogitaremus: sed id fa-
ciendum non instituimus, abunde esse ra-
ti, vtilitatem eorum & quantum mate-
riæ Medicæ conferant, in hac, ad te, præ-
fatione paucis ostendisse. Nam de inuen-
tione ac origine florum herbarumque: de
amœnitate, quæ hortis, viridarijs, ac om-

A 2 nibus

nibus ferè locis ex ijs accedit: aut de ea quæ ex aspectu, odore aut tractatione florum, voluptas animi aut recreatio concipitur, quid refert verba facere? De origine siquidem ac inventoribus florum herbarumque, multa fabulosa apud Poëtas & alios subinde auctores; tam Græcos, quàm Latinos reperiuntur, quæ longum & perquam molestum foret huc referre. Maximum verò ornatum, maximumque decorem, summamque gratiam, hortos hinc accipere, notissimum est. Neque etenim ex vllis quantumvis artificiose contextis, aut coloribus ornatis, topiarijs vel perticalibus scenis, umbraculis aut alijs hortensibus operibus, tantum ornatus his accedit, quantum ex floribus, herbisque odoratis coronarijsue; absque quibus etiam omnia hortensia opera, ornatu, gratia; & amœnitate destituuntur. Voluptas autem & animi recreatio ex his ipsis, non nisi honestissima esse potest. Ad id enim quod pulchrum honestumque, hominem commonefaciunt. Suggestunt siquidem flores sua pulchritudine, coloris elegatia, formæ præstantia, odoris suauitate ac fragrantia, generosis

nerosis
nium
que, v
conten
chrisq
aut tur
ro quæ
macen
sed fœ
est. Pr
deinde
quamp
refouet
dinteg
excitan
clemet
ra siue
pem fa
parabil
miliare
moie
uehunc
sora in
pæ par
arua sp
suis faci

nerosis animis honesti pulchrique, & omnium virtutum recordationē. Turpe namque, ut quidam sapiens ait, fuerit, pulchra contemplantem, pulchra tractantem, pulchrisque in locis versantem, non pulchrum aut turpem habere animum. Vtilitas porro quæ à floribus materiæ medicæ, & pharmaceuticæ accedit, non exigua aut sterilis, sed fecunda, varia & omnino multiplex est. Profunt vel solo odore, non parum: deinde & alijs suis facultatibus, flores quamplurimum. Odore siquidem spiritus refouent, reficiuntque; collapsas vires reintegrant; torpentem animum non raro excitant; subinde remorantem somnum clemēter conciliant; & inter ea quæ ὀσφραγνὰ siue odorabilia nuncupantur, principem faciliè locum tenent; faciliè videlicet parabiles & amica naturæ consuetudine familiares. Alia etenim quæ ab Indis, extremo Oriente aut Occidente odorata aduehuntur, nō ita familiaria sunt, sumptuosiora interim, neque cuius statim & promptè parabilia: flores verò horti, & subinde arua sponte etiam suppeditant. Alijs verò suis facultatibus, calfaciendi videlicet, re-

frigerandi, reprimendi, corroborandi, concoquendi, digerendi, discutiendi, resol-
uendi, aperiendi, attenuandi, leniendi, &
si quæ sunt similes; sic conducibiles flores
sunt, vt nulla corporis pars malè affici pos-
sit, cui non ex floribus remedium adhiberi
queat: pauca item compositiones mi-
xtaque medicamenta, quæ non flores ali-
quos admittant. Capitis doloribus & ple-
risque alijs eiusdem morbis, flores mede-
lam conferunt. Pulmoni, lateriue dolenti-
bus flores præsidio sunt. Ventriculum cor-
roborant: aluum laxiorem reprimunt, ean-
dem adstrictam laxant & aperiunt. Iocino-
ris & Lienis medicamentis flores permis-
centur. Si calculi, coli aut vesicæ dolor vi-
get, flores præsto sunt. Vteri dolores le-
niunt: menses sistunt & citant. Antidotis
& alijs compositis medicamentis magna
vtilitate admiscuntur. Recipiuntur in ca-
taplasmata, malagmata, emplastra, vn-
guenta, fots, balnea. Rara absque flori-
bus enemata. Oleorum ex floribus multæ
compositiones. Condiuntur flores. Fiunt
ex floribus tragemata, serapia; elicitor ex
ipsis liquor. Vino, melli, aceto, flores vires
com-

communicant. Ita nullam alicui stirpi indidisse facultatem natura videtur, quam non & floribus communem fecerit, & subinde etiam cumulatiùs contulerit. Et tantum quidem abest, ut florum materia vel ieiuna sit aut sterilis; vel ad medicinam nihil faciat; uti sycophantæ & calumniatores quidam indocti clamitant, qui non modò florum, verùm omnium herbarum ac simplicium medicamentorum, adde etiam compositorum notitiam, medico non necessariam opinantur; imò veluti superfluam temerario ausu damnant: ad solos Pharmacopœos eam, aut mulieres reijciantes, & pertinere iudicantes. Qua vel sola sententia se indignos titulo ac nomine medici planè ostendunt. Nam ita cohærens stirpium, herbarum & reliquorum simplicium medicamentorum, & multorum compositorum cognitio, alijs artis partibus est, ut nemo verè Medicinæ cognitionem habere queat, qui notitiæ eorum rudis sit & imperitus: ut & nos alibi, & Galenus quoque ipse manifestis verbis scriptum reliquit. Si etenim omnis artifex artis suæ instrumenta cognita & in nume-

rato habere debet , quomodo ea ignorans
medicus , ab artis suæ imperitia excusari
poterit ? Inter instrumenta siquidem qui-
bus ars medendi in curationibus morbo-
rum vitur , ipsæ sunt stirpes earumque ra-
dices , cortices , medullæ , folia , flores , fru-
ctus , semina , succi , lacrymæ , & quæ sunt
alia . Necessum namque est huiuscemodi
medicos sæpenumerò hæsitare , & veluti
palabundos diuagari , ac in grauissimos per-
niciosissimosque errores labi . Veluti non
ita pridem in celebri quadam ciuitate me-
dico cuidam , magnifico tamen titulo su-
perbiæti accidisse , à fide dignis accepimus .
Præscripserat is cuidam Diagridij drach-
mas duas ; monente autem Pharmacopœo
excessum quantitatis esse nimium , & per-
cunctante eo , an pro Diagridio cogitasset
Diatragachantes scribere ; responsurus in-
terrogauit an ne idem Diagridium & Dia-
tragachantes esset . Adeò stupidus , omnisq;
materiæ medicamentorum , atque etiam
artis ipsius magnificus iste λογίατρος fuit :
vt quantum inter Diatragachantes arteria-
cam compositionem , ac Diagridium me-
dicamentum potentissimum bilem per al-
uum

uum subducens , discriminis fuerit , planè ignorauerit . Alius nuper aquam elici voluit ex herba quæ Latinis Thyrsus dicitur (ita siquidem scriptum eius habebat) ipse tamen & multum arrogans , & fastu quodam sibi plurimum in modum placens ; persuasumque habens , se omnes quotquot sunt medicos iudicio & eruditione superare , quum tamen serò artem cognoscere cœperit ex pēdotriba medicus factus . Meminisse hunc oportebat Thyrsum non aliquam herbam esse , sed propriè quidem hastam aut facem hederis obuinctam ; metaphorice verò Thyrsos , cuiusuis herbæ cauliculos superiores , in quibus flores gignuntur , appellari . Fuit & olim medicus quidam , qui vbi apud Galenum in compositione quadam Origani Onitidis nomen reperisset , ægrotanti mox cuidam compositionem quandam parauit , quæ Onitidem recipiebat . Hic Pharmacopœo ignoranti qualis herba Onitis esset ; & percunctanti , quum non haberet quod responderet ; suggerenti an Ononidem putaret ; mox annuit , ac pro Origano Onitide , Ononidem substitui permisit ; herbam

multum ab Origano Onitide differentem. Atque in tales errores medicos perducit, & stirpium materiæque medicæ imperitia, tum & neglecta ea artis pars, quæ sola propriè Medicinæ nomine appellari meretur: curandorum videlicet morborum ratio ac methodus. Fieri etenim non poterit, vt doctus & in operibus artis versatus exercitatusque Medicus, in huiusmodi errores labatur. Dosim siquidem, iustumque pondus singulorum exactè tenebit: ignota, vana, & quæ in rerum natura non sunt, aut quæ ipsi somnianti vel deliranti occurrerunt, ad vsum ducere non putabit: in veterum compositionibus si vnum aliquod desideretur, non nomine ac appellatione simile, sed viribus ac facultate respondens substituet, alteriusque deficientis loco addet. Ex his quantum stirpium materiæque medicæ notitia, medico sit necessaria, plenè & abundè constare potest: & quàm nihil à nostra professione, aut artis in qua versamur exercitatione peregrinum aut alienum sit, hoc quod tractauimus argumentum: quum inter stirpes, non postremo flores sint loco; & hu-

& humanis vsibus varijs multisque modis utiles. Et de florum quidem utilitate hæc satis.

NUNC ad te clarissime ac amplissime Hoppere me conuerto, atque hanc nostram de floribus ac odoratis coronarijsque nonnullis herbis historiam, tibi offero & dedico: non modò diuturnæ nostræ amicitiae veluti pignus quoddam apud te futuram; aut absentis cognati & amici *μνημόσυνον*; sed præcipuè & maximè nonnullæ cōgratulationis ergò. Posteaquam enim te magnis muneribus ac præmijs D. Philippus Hispaniæ &c. Rex Catholicus sibi obstringat ac deuinciat, honoribus nō exiguis augeat; alijque proceres & magnates summis fauoribus prosequantur; de his tibi, Historiæ huius nostræ dedicatione, omnino congratulandum, pro ea, quæ inter nos à prima adoleſcentia coaluit amicitia, putavi: ne videlicet amici & cognati officio defuisse videri possem. Solent siquidem amici, prosperis & lætis amicorum rebus non solum gaudere & exultare, verùm & verbis ac factis lætitiā exprimere & ostendere. Prodit igitur Historia

ria hæc nostra, & maximi ac potentissimi
Regis fauorem & munera, deinde & alio-
rum nobilium ac magnorum procerum
amicitiam tibi gratulans, omniaque fau-
sta & felicia deprecans. Reliquum foret
eam commédare, nisi iamdudum gratam
tibi ac iucundam futuram, certus essem.
Proinde & ne verbum vllum quidem ad-
do, optans modò, studiosis omnibus vti-
lem, & æquè ac tibi, acceptam esse posse.
Bene vale, clarissime D. Hoppere. Nonis
Ianuarij, Anno 1568. Mechliniæ.

REM-

13

REMBERTI DODONÆI
 FLORVM ET CORONARIARVM
 ODORATARVMQVE NONNVLLA-
 RVN HERBARVN HISTORIA.

DE NIGRA SIVE PURPUREA
 VIOLA. CAP. I.



NIGRA siue purpurea Viola mox à radice fo-
 lia promit, multa, lata, venosa, per ambitum
 leuiter crenata, hederæ foliis rotundiora, te-
 nuiora, nigrioraq; præsertim parte superiore,
 inter quæ mediæ, tenues exeunt styli, & in singulis flores
 singuli,

singuli, pulchri, odorati, colore in cœruleo subnigro purpurei, nonnunquam sed raro candidi, ex quinque parvis foliis compositi, quorum infimum maius; ac deinde pensiles caliculi, qui per maturitatem in tres partes dehiscunt: semen paruum & in rotunditate oblongum est: radicibus tenuibus ac fibrosis firmatur. viret hyeme pariter ac æstate, frigoris patientissima. locis opacis, iuxta dumos, muros, agrorum hortorumq; margines, pingui solo plurima frequensq; emicat: flores vt plurimum Martio, vbi serius Aprili prodeunt mense.

EST huius generis quedam, florum foliola multiplicans, cum purpurea, tum candida, hortensis vtraque.

EST & genus quoddam sylvestre, foliis minoribus, floribus pallidioribus, minus aut non odoratis: nascitur id, & locis quidem opacis, ac secus vias & margines agrorum, verum arido steriliq; solo.

VIOLAM autem Graci *ἰov*, & *ἰov πορφυρεόν*, id est, Violam purpuream nuncupant. Theophrastus vero & *ἰov μέλαν* & *μελάνιον*, hoc est, nigram Violam; à nigricantis purpureæ florum colore. Plinius solam banc Græco nomine, à cæteris Violis discerni, appellariq; *ἰov*, & ab his Ianthinam vestim dici refert. Officina latinum nomen seruant; at herbam Violariam nominant, & matrem violarum. Germani florem, *blau beiel* oder *Mertzen violen*: Galli similiter *Violette de Mars*, hoc est, Violam Martiam: Belgæ, *violetten* dicunt.

ἰov autem Græcis vocatum in Geoponicis Nicander credit, vt refert Hermolaus, quod Nympha quedam Ionia, florem eum Ioui primum dedere muneri. Alij *ἰov* dictum affirmant, quod cum Io puellam adamatam Iupiter in vascam conuertisset, terra florem hunc pabulo eius produxerit; qui propter ipsam factus, ab ipsa nomē accepit. Atq; inde etiam

Latinis

Latinis Viola, quasi vitula, extrita littera t dici putatur. Seruius Violam Latinis etiam vaccinium, eadem occasione dici refert, locum enarrans Vergilij in Bucolicis:

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Vergilius tamē Ecloga 10. Vacciniū à Viola differre ostēdit:

Et nigra Viola sunt, & Vaccinia nigra.

Vitruuius etiam Architectura libro septimo, Violam à Vaccinio distinguit. Nam ex Viola Silis Attici colorem, ex Vaccinio purpuram fieri elegantem memoria prodidit. Tinctores, inquit, cum volunt Sile Atticum imitari, Silis Attici Violam aridam coniicientes in vas cum aqua conferuescere color.

faciunt ad ignem: deinde cum est temperatum, coniiciunt in linteum, & inde manibus exprimētes, recipiunt in mortarium aquam ex Violis coloratam, & ex ea eretrium infundentes, & eam terentes, efficiunt Silis Attici colorem. Eadem ratione Vaccinium temperantes, & lac miscentes, purpuram faciunt elegantem. Quæ autem sint appellata Vaccinia, alio, & suo loco explicabitur.

AD Violas reuertimur, quarum & flores & folia temperiem habent frigidam & humidam. Et flores quidem omnibus internis inflammationibus, laterum potissimum & pulmonis, vtilis sunt: pectoris, asperæ arteriæ, nec non faucium asperitates & scabrities leniunt: iocinoris, renum, & vesicæ nimios calores restinguunt: ardentium febrium ardorem mitigant: bilis acrimoniam obtundunt: suum arcem & sedant.

QVOD ex ipsis sit $\delta\rho\sigma\acute{\alpha}\tau\omicron\nu$, siue uti Actuarius nominat $\sigma\epsilon\rho\acute{\alpha}\pi\iota\omicron\nu$, si ex diluto decoquatur in quo pluries recentes Viola fuerint macerata, aluum lenit, & bilem per inferna educit, trium aut quatuor vnciarum pondo sumptum.

FIT & ex Violis oleum quod refrigeradi humectandiq; potentia pallet: temporibus illis, somnum clementer conciliat,

ciliat, quem calida aut sicca intemperies remoratur: cum
oni luteo sedis & hamorrhoidum dolores mulcet: additur
quoque vtilissimè cataplasmatibus refrigerantibus, ac dolorem
sopientibus.

SIT autem oleum, in quo Viola macerantur aut ex im-
maturis Oliuis, Græci ὀμωτρίβες ἢ ὀμωράκιον nominant:
aut ex Amygdalis dulcibus, vti Mesues ait: Sint & viola
ipsa recentes humentesq; oportet. Arida etenim iam deper-
dita humiditate, & minus refrigerant, & caliditatis non-
nihil adeptæ videntur.

RECENTIORES aridas violas, medicamentis qua-
cor roborare creduntur, vtiliter admisceri sentiunt.

FOLIA Violarum in olerè sumpta, refrigerant, hume-
ctant, aluumq; leniunt: foris admota, calidas omnes inflam-
mationes mitigant, cum per se, tum cum polenta imposita.
Imponuntur & æstuanti stomacho, & oculis, Galeno testè.
Dioscorides sedi etiam excidenti imponi scribit. Crapulam,
Plinius ait, & grauedines capitis impositis coronis, olfa-
ctûue discutiunt: anginas ex aqua potæ.

ID quod purpureum est ex iis, comitialibus medetur;
maximè pueris in aqua potum.

SEMEN Scorpionibus aduersatur.


DIOSCORIDES florem purpureum non viola, sed
Asteris Attici, cum aqua potum anginæ & comitali in-
morbo pueris, auxiliari scribit. Ex cuius historia, hæc perpe-

Plinij locus
suspectus. ram Viola apud Plinium accessisse suspicari, & non temere
quidem, licet.

DE TRICOLORE VIOLA. CAP. II.

FOLIA tricolori Viola exigua sunt, ac initio quidem
rotundiuscula, deinde oblongiora, per ambitum modicè ser-
rata:

Tata: can-
gitudine
Viola form



rata: caules infirmi, tenues, angulosi, geniculati, palmi longitudine : flores longiusculis pediculis insident, purpurea
Viola forma similes, & magnitudine ut plurimum pares,
 triplici

B

triplici colore splendentes, purpureo videlicet, luteo, candidoq; vel ceruleo: quorum elegantia ac varietate colorum, maximè placent, cum odore exiguum aut nullum habeant. In summis duobus flosculi foliolis, & subinde in inferioris, & quandoque etiam in mediorum extrema parte, purpureus relucet Viola nigra. Medius ut plurimum, ac nonnunquam inferiori candidus aut ceruleus insidet. Luteus non raro inferius foliolum vel magnam eius partem, semper autem flosculi medium, intercurrentibus vnà nigris aliquor radiolis, occupat. Semen exiguis, in rotunditate oblongis, vasculis, ochri magnitudine continetur, quæ decidentibus succedunt floribus, & vltro semine iam maturo dehiscunt. Radicibus nititur fibrosis. In aruis pluribus locis exit: nascitur & in hortis, & crebro quidem sua sponte, sylvestri speciosior & elegantior. Vere vnà cum Viola nigra aut paulo post emicat, æstate dein tota & maxima Autumni parte, ac subinde etiam hyeme floret.

IACEA à plerisque nominatur: est tamen & alia iacea quæ nigra cognominatur. Aliis, herba Trinitatis, propter triplicem floris colorem, dicitur. Nonnullis herba clauellata. Galli flores pensees nuncupant, quæ etiam appellatione Brabantis ac vicinis Belgis innotuere. Germani Freyscham kraut, vnd Dzyfelfelticheyt blumen appellant. Cum φλόγι Theophrasti conuenire videtur, quod φλόγιον etiam dicitur, & flos est tantum sylvestris absq; odore. Vere vnà cum Viola alba aut paulo post exiens, plurimumq; durans: cuiusmodi hæc tricolor Viola est, quæ vti scripsimus, natura sua sylvestris est atque in odora, & diutine floret. φλόγα autem siue φλόγιον, Gaza Violam flammeam interpretatur.

QUALITATEM herba habet, frigidam quidem obscuram, sed humidam manifestiorem, lenti glutinosiq; succi,

DE LEVCOIO SIVE VIOLA ALBA. 19

succi, vti Malua, particeps: emollientis ea de causa quoque facultatis, verum minus quam illa. Prodest, vt recentiores aiunt, febricitantibus maximè pueris & infantibus, quorum conuulsionibus ac comitalis morbi accessionibus subuenire creditur: commendatur item ad pulmonis pectorisq; inflammationes, & ad scabiem corporisq; pruritus: vlcera quoque glutinare fertur.


DE LEVCOIO SIVE VIOLA

ALBA. CAP. III.

LEVCOII voce plura Violarum genera comprehenduntur, quorum in florum quidem colore præcipua, sed tamen & nonnulla in foliis differentia. Possunt hæc in duo genera distingui. Vnum genus cui folia candidiora & molliora, candidum Leucoion, à foliorum non florum colore quis nuncupauerit. Alterum verò Leucoion luteum, à floris colore luteo. Sunt autem candidi Leucoij genera, rursus duo: maius videlicet & minus.

MAIORI, caulis est bipedalis aut altior, rotundus, in alis nonnullas diuisus: folia oblonga, candida, mollia, & veluti lanuginem habentia, salicis foliis quodammodo similia, verum molliora: flores odorati, ex quatuor foliolis congesti, secundum cauliculos, superiori parte in tenuibus pediculis exeunt, colore aut rubentes, aut candidi, aut ex purpureo punicei, aut cineri candidiori proximi. subinde varij: filiqua inde sequuntur, oblongæ, angustæ, in quibus semen latum & rotundum: radicibus nititur fibrosis, sed validis. Floret primo Vere & tota propemodum æstate, altero à satione anno, deinde & aliquot sequentibus, si diligentia & cura adhibitis, hybernis mensibus à frigore arceatur.

MINVS genus à priori, non forma sed magnitudine



DE
sola diffi
etiam no
puniunt
Floret in
Augusto
Est
rarissim
re incipit
re offend
PRA
Leucoion
maritimi
IAM
quo subse
MA
git Viola
locubitat
Catechism
tem quan
APP
Viola alb
Tholue
Verumqu
different
dis potes
FAC
dissimila
DE
LVI
oblonga

DE LEVCOIO SIVE VIOLA ALBA. 21

sola differt : caules foliaq; habet similia, sed minora : flores etiam non vnius coloris, sed vel candidos vel rubentes, vel punicantes, vti maioris : siliquas etiam & semina similia. Floret istud genus, non quidem Vere, sed Iunio, Iulio, aut Augusto, & eodem quidē quo satum est anno: hyeme perit.

EST verò & Leucoion, florum foliola multiplicans, sed rarissimum, quod ex maioris genere est, primog; Vere flore-re incipit, & maiorem curam hybernis mensibus, ne à frigo-re offendatur, requirit. Seruntur ferè in hortis.

PRÆTER hæc, est & sylvestre quoddam candidum Leucoion, humile & paruum, quod in Zelandia locis exit maritimis; ac iuxta Monspelii quoq; vti Gesnerus scribit.

IAM & Leucoion quoddam etiam est bulbosum, de quo subsequētib; capitibus.


MATTHIOLVS & fruticosam quandam depin-git Violam foliis latis; flore Consolida regie, odorato; caule bicubitali; ex monte Baldo allatam, & ad se à Francisco Calzolari Pharmacopœo Veronensi missam: arborescen-tem quam Violam nominat.

APPELLATUR autem λευκοιον, Latinis quidem Viola alba, Arabibus verò Keyri. Nostri maius genus, stock Violieren nominant; minus verò, heete Violieren: Virumque à canitie foliorum, vti diximus, candidum, ad differentiam lutei, quod præstantissimum est, non improprie dici potest.

FACULTATE autē Leucoia hæc, luteo Leucoio haud dissimilia videntur; viribus tamen infirmiora.

DE LEVCOIO LVTEO. CAP. IIII.

LVTEO Leucoio caules sunt ramosi virentes, folia oblonga angusta, glabra, in virore nigricantia, Leucoij can-



doli foli
 muer ob
 lyrenu
 hyems d
 mris, &
 feritur
 Hvi
 ci, cui fili
 leu
 Latini
 quing
 la d
 Gallia
 Est
 extergen
 res: & in
 Dio
 cina v
 decoct
 cere: ca
 aphtha
 tam, au
 educere:
 pedagra
 Hip
 das educ
 fomen
 laci Leu

DE

Ma
 lunga, lat

dididi foliis minora : flores lutei perquam odorati ; filiqua tenuis oblonga in quibus semen latum . Totus frutex lignosus hyemis rigorem facile sustinet . Floret Aprili & Maio, & si hyems clemens fuerit, etiam Martio vel prius . In peruetustis muris , in ruderibus & aliis saxosis locis libentius nascitur ; feritur & in hortis iuxta parietes ac muros .

Huius Leucoij quoddam quoque est genus, flore multiplici, cui filiqua nulla . Seritur hoc surculis, & in hortis colitur .

λευκόιον & istud Græci nominant, & λευκόιον κήλειον, Latini Violam albam & Leucoion luteum . Arabibus Keyri est : nostris, *stœen Violieren* . Parietinas aut saxatiles Violas dixeris, & *geel Violierē* . Germanis *geel Violaten* . Gallis *Giroffles iaulnes* .


Est autem Leucoij frutex vniuersus , vt Galenus ait, extergentis facultatis, ac tenuium partium, plus tamen flores : & inter hos, qui sint sicciores, magis etiā quā virides .

Dioscorides lutea Leucoia præcipui in medicina vsus esse scribit ; & huius aridos flores in desessionibus decoctos, ad vteri inflammationes & menstrua ducenda facere : cerato exceptos sedis rimas sanare, & cum melle oris aphthas : semen duarum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle subditum, menses, secundas, & foetus educere : radices cum aceto impositas, lienem reprimere, & podagricis prodesse .

Hippocrates lib. de natura muliebri, ad secundas educendas , & sanguinem ex vteris pellendum, Leucoij semen tritum cum vino bibendum exhibet : & ad eadem lutei Leucoij radicem, eodem quoque modo sumendam tradit .

DE VIOLA MATRONALI. CAP. V.

MATRONALIS Viola folia habet mox à radice longa, lata, subnigra, per ambitum crenata : caules cubi-



tales aut
 consolator
 cōiū p
 pora; se
 vum, fig
 fulsum
 fūa est d
 mōratiō
 GAI
 dimes a
 pta voc
 al est Vi
 S v n
 aria &
 cultate p

DE

FOL

lorum cre
 cales vo
 fulcarul
 tunda sit
 pūte, m
 quōtāmo
 brama: ra
 Poeme
 mōrtes e
 cum aliū
 tero à qu
 BVL
 Violam la

DE VIOLA LATIFOLIA. 25

tales aut altiores, foliis similibus, sed tamen minoribus circundatos: flores in summis alarum virgis erumpunt, Leucois similes, coloris aut candidi aut rubentis, dilute purpure; semen in siliquis oblongis & rotundis gignitur paruum, figura oblongum, colore in ruffo subnigrum; radices subsunt fibrosæ & validæ. Nascitur in hortis. Altero à quo sata est anno, Maio & Iunio mensibus potissimum floret; non raro tota æstate floris eius productio.


GALLI Violettes des dames, & Giroflees des dames appellant, hoc est, Violas matronales; nostri corrupta voce, Damas bloemen. Germani Winter violen/ id est Violas hybernas siue hyemales.

SUNT autem harum Violarum folia gustu quidem acria & calida, Eruca cuius species videntur, sapore & facultate proxima.

DE VIOLA LATIFOLIA. CAP. VI.

FOLIA, Viola latifolia promit, virentia, lata, per ambitum crenata, Alliaria vocata herba similia, sed maiora: caules rotundos ramosos: flores Leucoij colore purpureos subcæruleos; quos sequuntur lata, plana & propemodum rotunda siliqua ex tenuissimis mēbranis, veluti laminis compactæ; intra quas semina plana, lata, obscuri coloris, forma quodāmodo διχοτόμου Luna, inter quæ media tertia membrana: radices subsunt crassæ, candidæ, in diuersa tendentes, Pœonia scemina alterius, radicibus quodammodo similes, sed minores & tenuiores, intus porosæ. Belgæ hanc Violam vnâ cum aliis in hortis serunt: flores Aprili prodeunt mense, altero à quo sata est anno.

BVLBONAC aut Bolbonac voce barbara vulgo, nos Violam latifoliam, aut vt plerisque placet, Violam peregri-



nam nunc
 a filiqua
 Paclit
 semper fl
 dy Luna
 gura, au
 quo, de
 vna, p
 arum v
 nonnulla
 des ait,
 n, pax
 omnino h
 H v
 est & al
 hyeme n
 la multa
 quam pr
 rui in ho
 C. A.
 semen co
 semini s
 nonnulla
 ri, ut qu
 DE V
 MA
 ta, sub
 glori soli
 denia se

nam nūcupare maluimus. Brabantī Denuinckbloemen à siliquarum forma, denarium quodammodo referente, & Daelchbloemen/ quod circa Pasche solennitatem ferè semper floreat, nominant. Recentiorum pleriq³ Lunariam, alij Lunariam Gracam appellant: vel ab ipsius seminis figura, aut siliquarum mediæ membrana argenteo splendore, quo, decidentibus per summam siccitatem cum semine ex utraq³ parte membranis, nitet. Veterum autem Thlaspi alterum videtur, quod videlicet à Crateua describitur, à Thlaspi Crateuæ. nonnullis Sinapi Persicum appellatum. Nam vt Dioscorides ait, Crateuas Thlaspi quoddam recenset πλατύφυλλον & μεγαλόρριζον, id est, latifoliū & magnis radicibus; qualis omnino Viola hæc est, quam latifoliam cognominauimus.

HVIC latīs folijs & siliquis planis ac rotundis similis est & alia quedam Viola, quæ perenni radice nititur, ac hyeme non marcescit. Sunt huic caules lignosi cubitales: folia multa lata, siliquæ planæ & latæ, utraq³ paulo minora quàm prioris: flores candidi instar Viola marronalis. Reperitur in hortis; floret æstatè.

CÆTERVM facultate ac potentia, Latifolia Viola semen calidū quidem, & siccum est, gustuq³ acre, Thlaspios semini sapore & viribus simile: radices acrimoniæ quoque nonnullæ sed non multa participes sunt: eduntur cum acetarijs vt quarundam aliarum.

DE VIOLA MARIANA, SIVE RAPO
SYLVESTRI DIOSCORIDIS.

CAP. VII.

MARIANA Viola folia primum habet oblonga, lata, subnigra, aspera, nonnihil hirsuta, vulgaris Buglosi folijs nigriora, minora minúsque aspera. Caules deinde secundo anno profert rotundos, rectos, ramosos, ali-



aliquant
 memora.
 di. pe
 re ve pla
 re quib
 deus sc
 fectur, s
 bens, &
 acer sum
 guum, s
 prius prop
 candida,
 montibus
 rivulos re
 gas in ho
 eius pro
 neque en
 Vio
 riettes.
 autem D
 quidam
 magnam
 similem
 gustu ace
 modum r
 du. folia
 aut semen
 Medion,
 deat. 77
 prone me
 cane lob
 amiffa.

aliquantulum etiam hirsutos, circa quos folia similia, sed minora: flores in summis virgis exeunt oblongi, caui, rotundi, per oras incisuris quinque sed non profundis diuisi, coloris vt plurimum in caeruleo purpurei, subinde candicantes, in quibus stamina duo aut tria candida; qui & priusquam debiscunt quinquangulares sunt. Post flores capitulum nascitur, superiore parte latius, quinque quoque angulos habens, & quinque loculis veluti caligulis asperis & hirsutis deorsum dependentibus circum vestitum, in quo semen exiguum, subrussi, & eius cuius Castanea fructus echino exemptus propemodum coloris. Radices subsunt longæ, crassæ, candidæ, non ingrati saporis. Nascitur vt aiunt in syluis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus, vt Matthiolus refert, plerisque Italia & Germanie locis: apud Belgas in hortis colitur, Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem peruenit; neque enim simul sed particularim floret.

VIOLAM Marianam nostri appellant, & vulgo Mariettes. Recentiorum plerique Medion esse volunt. Medion. autem Dioscorides tradit folia habere Seridis, (exemplaria quædam Iridis habent) caulem tricubitalem, & in eo florem magnum, rotundum, purpurascens: fructum paruum similem Cnico; radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Cum qua descriptione Viola mariana non admodum respondet: tamen si enim illi flos grandis & rotundus; folium tamen propriè nec Iridis nec Seridis: & fructus aut semen, Cnici semine haud simile. Quas ob causas non Medion, sed potius verum Dioscoridis Rapum sylvestre videtur; ρογγύλην ἄγρια que Græcis dicitur, cum cuius descriptione magis conuenit. Nam fruticosa est stirps & ramosa, cuius lobi siue capitula appendentibus aliquot loculis circumtectæ, quibus sublatis interior lobus siue capitulum conspicuum

Dioscori-
dis locus
corruptus.

spicuum est: quale Rapum sylvestre esse, ex eius apud Dioscoridem descriptione satis constat. Quae tamen si superfluum quorundam accessione corrupta, Rapo tamen sylvestri propriissima complectitur. Describitur autem Rapum sylvestre à Dioscoride his verbis: ἀγρία γογγύλη φύεται ἐν ἀρούραις, θάμνος πηχραῖος τὸ ὕψος, πολὺ κλάδος, ἐξ ἄκρου λείης. φύλλα ἔχουσα λεία, δακτύλου τὸ πᾶχος, ἢ ἢ μείζονα. καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς καλυκώδεσιν, ἀνοιχθέντων δὲ τῶν περικαρπίων, ἔσωθεν ἄλλος κεφαλοειδὴς ἐστὶ λοβός, ἐν ᾧ σπερματῖα μέλανα, θραυσθέντα δὲ λευκὰ ἐνδοθεν. id est, Rapum sylvestre, nascitur in aruis, frutex altitudine cubitalis, summa parte levis: folia habens leuia, digiti latitudine aut maiora: fructum in lobis calycularis, quorum inuolucra cum aperiuntur, alius capituli modo lobus subest, in quibus semina nigra, contrita verò intus candida. In qua descriptione, quae de leuitate summorum caulium ac foliorum, & seninis nigredine, ac interiori eius medulla candida traduntur, ad sylvestris Rapi, huius praesertim, descriptionem non faciunt, sed aliò pertinent. Huius siquidem sylvestris Rapi caules aut folia non sunt leuia, sed aliquantulum hirsuta: semen etiam non nigrum, verum subruffum, & castaneis, vt diximus, colore affine. Videntur autem, quae de leuitate foliorum & summarum partium, Campanula conuenire, de qua in sequentibus capitibus, quae sortè & Rapi sylvestris species habita est: semen verò, quod hic describitur, satiuu Rapi est. Ita plurium stirpium descriptiones inter se confuse.

CÆTERVM quod ad facultates attinet, radix Viola Mariana refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: esui vt aliorum sylvestrium Raporum apta est, & non incommodè acetarijs additur.

DE ALIIS SYLVESTRIBVS
RAPIS. CAP. VIII.

SUNT verò & multa alia Rapi sylvestris genera, Calathoide florum figura, & radicibus Viola Mariana haud multum dissimilia.

VNI, quod à Viola Mariana alterum, caules sunt cubi-
tales aut altiores, angulosi, asperi, hirsuti, folia aliquantulum aspera, lata, in acutū desinentia, per ambitum crenata; vrtica folijs & forma & colore quodammodo similia: flores secundum caules exeunt, Viola Mariana floribus minores, per ambitum quinque similiter incisuris, sed profundioribus, diuisi, intus aliquantulum hirsuti, colore aut candidi, aut dilute purpurei, vel ad caeruleum inclinantes. Nominant hoc genus Germani *Halzkraut*/ Nostri *Haliscrypt*/ id est, Latinè *Ceruicariam*, & *Ceruicariam maiorem*, Gracè *τρεχύνιον*, plerique *vuulariam*, Fuchsius *Campanulam*. Ceruicaria maior.

TERTIVM genus caules habet breuiores: folia minora, candidiora, minus aspera, oblonga, Salviae folijs similia: flores *Ceruicariae* minores, colore proximi Viola nigrae dilutam purpuram referentes, radices quoque similes. Hoc genus plerique *Ceruicariam minorem* appellant. Nascuntur haec duo in Germania ac Belgio plerisque aridioribus locis secus pratorum margines, & crebro locis senticosis; transferuntur in hortos, florum gratia: florent Iunio, Iulio & Augusto mensibus.

HIS autem simile & quartum genus est, caules id facit breuiores: folia lata & *Ceruicariae* prioris proxima, minus tamen aspera, minusq; per ambitum crenata: flores deorsum pendent, coloris vt plurimum dilute purpura: pro radicibus, multae, tenues, transversim & obliquè serpentes fibrae sunt, à quibus multa oblonga, candida radicante, Rapun-



Rapum
propaga
nes in
eodem q
pari pote

Qv

caules pr
aria mi
des, digi
bis frequ
bus radice
ment hoc
panum
ponce

Ho

quingua
calati fi
circumfer
angulas lo
ria, super
bus aut lo
Mariane
lobos hab
exaltius

nia Rapa

P. a

superior
ba prim
les dote
nam plena
duntur, c
verdin qu

Rapunculi radicibus similes demittuntur. Ita facile seipsum propagat & late serpit hoc genus. Secus aruorum margines in Zelandia & alibi locis maritimis reperitur; floret eodem quo reliqua tempore: Cernicaria marina nuncupari potest.

QVINTVM genus, vulgo Rapunculum nominant, 5
caules proferit tenues: folia oblonga, angusta: flores Cernicaria minores, caruleo vt plurimum colore: radices candidas, digitalis longitudinis; esui aptas. Exit in aruis multis locis frequens, floret plurima aestatis parte: hybernis mensibus radices leguntur, & cum acetarijs inferuntur. Nominant hoc genus vulgo, vti diximus, Rapunculum, quasi paruum Rapum: Germani Rapuntzelu/ Noſtri Ra-
ponce/ Galli Raiponce.

HORVM omnium flores priusquam adaperiuntur, quinquangulares sunt; completi vero rotundi, & inuerſi calathi figuram referunt, ſtaminibus intus candidis; & per circumferentiam quinque inciſuras, totidemq; eminentes angulos habent: capitula autem in quibus ſemen, angularia, ſuperiore parte ampliora, ſed nuda, & nullis appendicibus aut loculis ſue pericardijs circumteſta, vii ſunt Viola Mariana; quæ eam ob cauſam, nempe quod capitula, ſue lobos habeat circumteſtos, cum ſylueſtris Rapi deſcriptione exactius, quàm vllum horum conuenit, quæ tamen & omnia Rapa ſylueſtria ſunt.

PRÆTER hæc verò & ſextum quoddam genus eſt, à 6
ſuperioribus forma aliquantulum differens: huic autem folia primum lata, poſtea ſecundum caules anguſtiora: caules dodranteeles, ſumma parte veluti ſpicam paruorum ſtorum plenam proferunt, quorum ſinguli antequàm panduntur, corniculi cuiuſdam ſimilitudinem referunt; aperti verò in quatuor anguſta ſoliola ſinduntur, colore aliàs can-


didi, aliàs cerulei, aliàs purpurei: floribus capitula parua succedunt, rapunculi capitulis ferè similia, verùm minora, multa circa caulem simul arctèq; composita: radices candidæ, vt aliorum raporum syluestrium. Cignitur locis syluosis & opacis, pingui lutosq; solo. Floret Maio, Iunio & Iulio mensibus. Nonnulli Alopecuron appellant, ab ipsa florum plena spica; quæ iam apertis flosculis, mollis & veluti lanuginosa, vulpiumq; caudis propemodum asimilis, ea de causa, videtur. Sed Alopecuros alia omnino est herba, in frumentorum & leguminum historia à nobis descripta.

RADICES porro omnium horum refrigerantis potentia sunt & nonnihil adstringentis: possunt autem omnes vnâ cum alijs acetarijs edi. Sunt etiam qui Ceruicaria radicum decoctum, aduersus incipientes oris & tonsillarum inflammationes conferre affirmant.

DE VIOLA CALATHIANA.

CAP. IX.

CALATHIANA Viola caulibus exit dodrantalibus, tenuibus: folijs oblongis angustis binis ex aduerso positis: flores & in cauliculorum summo, & è foliorum sinibus prodeunt oblongi, calathoides, sursum hiantes, in ceruleo saturato purpurei, staminibus in medio candidis, Rapi syluestris floribus quodammodo forma similes, quinquangulares similiter nondum completi, & quinque per circumferentiam diuisi, sed minus patentes angustiores & minores: semen exiguum in paruis oblongis capitulis continetur: radices subsunt tenues oblongæ, subinde bifidæ, trifidæ, aut in plures diuisæ, gustu amaricantes. Reperitur aliquando in pratis, frequentius in alijs incultis & iisdem quibus Erica humi-



humidioribus locis : & in pratis quidem procerior, auctuq³
 amplior, in ericastris tenuior prouenit. Augusto & Septem-
 bri floret.

APUD nostros vulgo nomen non habet ; sunt tamen qui *blauw Lelickens* id est, *ceruleum Liliū* nuncupent : *Ananiensia* rura vulgo *Pettimborsa* vocant , *Mathiolo* teste : *Plinio* dicta videtur *Calathiana Viola* , de qua lib. 21. cap. 6. paucis his verbis : In totum sine odore , minutoq³ folio *Calathiana* (videlicet *Viola*) munus *Autumni* , cetera *Veris* . *Ruellius* tamen *Calathianam Violam* ex *Plinio* describens , plura & non ita succisa verba adducit : *Calathiana* , inquit , munus *Autumni* , *Viola* cetera *Veris* ; ea minuto est folio *Viola* alba non dissimili , in totum sine odore , *calathi* similitudine , *Autumno* tantum proueniens , tanta coloris pulchritudine , vt *ceruleum* ipsum , quod imitatur , prouocet : in pratis post ætatem emicat ; *Autumnalem Violam* nominant . Videtur eadem à *Valerio Cordo* *Pneumonanthæ* nuncupata , quam *Germanicè Lungen blume* dici refert .

QUALITATE autem hac *Viola* calida est , *Gentiana* , cuius species nonnullis videtur , facultate quodammodo similis , multo tamen imbecillior . Efficax à recentioribus habetur aduersus pestilentes morbos , & ad virulentorum animalium morsus & ictus .

DE CAMPANVLA. CAP. X.

CAMPANVLÆ duæ sunt : vna *hortensis* maior , altera *gluestris* minor .

HORTENSIS multa è radicibus terræ proxima promittit folia , oblonga , angusta , viroris saturi , inter quæ caules assurgunt striati , bicubitales , tricubitales , aut subinde altiores , circa quos folia similia , & flores ad superiores partes , in singulis pediculis singuli , maiores & patetiores quàm *Rapunculi* , *campanulis* aut *tintinnabulis* similes , colore vt pluri-



plurimum cerulei, non raro candidi, in quibus & candida aliquot stamina: floribus succedunt capitula, Rapunculi capitibus forma quidem satis similia, sed foraminosa & perforata, in quibus semen perquam exiguum: radices candidae, tenues, fibrosa.

- SYLVESTRIS hortensi exceptis primis folijs similis est, sed tamen omnino minor: prima & terra proxima folia lata sunt & pauca, Viola nigra folijs satis similia, attamen non tam magna: reliqua verò oblonga & angusta; flores similes cerulei, saepe Rapunculi floribus maiores: radices tenues.

VTRAQUE lacti similem succum praebeat, cauliculis & folijs vulneratis, copiosorem tamen sylvestris: flores utriusque nondum completi quinquangulares quoque sunt, & patentes in quinque similiter angulos exeunt, sicuti sylvestrium Raporum; quorum haec ea de causa species putantur, tametsi radices exiguae & quae edules non habeantur. Prior in hortis seritur: altera passim in Belgio iuxta aruorum & agrorum incultos margines nascitur. Florent Iunio, Iulio & Augusto mensibus.

VULGO Campanulas nuncupant, & priorem quidem plerique Belvedere nuncupant: sed Italici Belvedere, Graecorum est Ophrys, cum qua Campanula nihil habet similitudinis. Matthiolus hanc eandem hortensem campanulam Phyteuma esse existimat: at nobis Campanula Iasionae similior videtur. Phyteuma verò esse Antirrhini sylvestris species, de qua inferius suo loco. At etenim Theophrastus Iasionae florem unico folio constare, similitudinem autem plurium ostendere, quae tamen non separentur, & superiorem floris partem angulosam esse. Talis certe huius Campanula flos est, & omnium similiter Raporum sylvestrium (excepto generis sexti) quae tamen ea de causa Iasionae esse affir-

affirmari non possunt; si modo eadem Theophrasti & Plinii est Iasione. Plinius siquidem Iasionem lac sit habere copiosum, quod sole Campanula precipue fundunt. Dubitet fortasse aliquis, & Campanulam non esse Iasionem existimet, quod Plinius olus esse Iasionem scribat sylvestre, in terra repens, flore candido. Sed si olus est omnis herba edulis, & Campanula olus est, cum eam edi posse non sit dubium: repunt verò & in terra subinde radices, atque ea de causa citissime vna aliqua stirps multiplicatur & ampla fit: florem verò hortensis non raro candidum esse scripsimus; sylvestris verò & talem alicubi reperiri posse quis negauerit? Constat etenim pro locorum & regionum varietate & florum colores & non raro stirpium ipsarum figuras aliquo modo immutari. Theophrasti autem de Iasione hac sunt verba, lib. I. Iasione. vbi de florum agit differentijs: Nonnulli, inquit, vnius folij nascuntur, similitudinem tantum plurium ostendentes, ut flos Iasiones; huius etenim non separatur vllum in flore folium, neque conceptaculo pars inferior eger, superior autem angulosa. De Iasione verò Plinius lib. 22. cap. 22. hunc in modum: Iasione olus sylvestre habetur; in terra repens, cum lacte multo, florem fert candidum, Concilium vocant.

PRÆTER verò duas has campanulas, & tertia quæ-
dam humilis & parua est, cui caules tenelli, dodrantes, in
alas plures diuisi, plurima parte humi decumbentes: folia
circa cauliculos parua, per ambitum leniter crenata: flores
paruuli, in puniceo purpurei, pulchri, multum patentibus
tintinnabulis aut campanulis similes, stamine in medio can-
dido, qui interdum patent; circa verò occasum Solis reclu-
duntur, & in quinquangularem speciem contrahuntur,
quam etiam nondum aperti, uti alia Campanula, referunt:
radices tenuissima sunt. In agris frumentarijs, inter segetes
exit, fertili & facundo solo: Iunio & Iulio floret. Anonymos

nostris est herba ; non esse Onobrychim , quod quandoque suspicati fuimus , satis constat. Campanularum videtur esse species , non tamen Iasiones , cum lac nullum vulnerata fundat.

FACILITATEM autem Campanula cōpertam nullam habent , cum nullus in medicina sint vsus.

DE DIGITALI. CAP. XI.

DIGITALIVM plures sunt species , non modo florum colore , sed & foliorum forma disidentes.

VULGATISSIMA purpurei floris est , cui longa lata per ambitum crenata , dilute virentia folia , Verbasci quodammodo similia , minora tamen minusq; lanuginosa ; caulis rectus rotundus , à medio sursum versus compluribus floribus grauidus , non alternatim , aut orbiculatim , sed ab vno caulis latere supra inuicem , aut vt Græci aiunt , ἐπ' ἀλλήλων dispositis , deorsum versus dependentibus , forma oblongis , intus cauis dactylotheis propemodum similibus , colore ex rubore purpureis , punctis quibusdam candidis intercurrentibus ; quos rotunda sequuntur vascula , in quibus semen exiguum : radices multe tenues fibræ sunt . Plarisque Germaniæ & Belgij locis saxosis & vmbrosis , in montium conuallibus , & vbi ferri & Lithanthracon fodina vicina sunt , sponte exit : transfertur etiam in hortos.

2 ALTERA Digitalis , priori folijs similis est , longioribus tamen ac latioribus : flores huius cum prioris floribus forma etiam conueniunt , colore verò candidi.

3 TERTIA , folia habet angustiora , venosa , glabra , saturato virore nigricantia , auersa tamen parte candidiora , per ambitum nonnihil serrata : flores huic lutei , forma prioribus



42 DE LYCHNIDE CORONARIA.

ribus ferè similes. Sunt duo hæc genera rarissima, & in paucorum hortis tantum conspicua.

4 QVARTA digitalis folia promit tertia similia, in virore quoque obscuro nigricantia, & candidiora similiter parte auersa, sed minora & angustiora; flores paruos, deorsumq; dependentes, verum minores, colore subluteos aut pallentes. Apud Belgas satis familiaris & cognita hæc est.


APPELLANT autem Germani quidem hanc stirpem vulgari lingua *Fingherbut* & *Fingherkraut*: Belgæ *Wingherboet*: Galli, *Digitale*, aut, quidam aiunt, *Gants nostre dame*: Fuchsius appositè Latine *Digitalem* nuncupauit. Nonnulli *Ἰφυαλλίς* nominant, & *Verbasci* speciem faciunt, quæ *λυχνίς* dicitur. Sed *Lychnitis* siue *Thryallis* folia habet pingua, crassa & hirsuta, ad *ellychnia* in lucernis apta, qualia minimè digitalis, cuius tam crassa aut hirsuta non sunt, vt *ellychnij* vicem explere queant.

FACULTATEM autem digitalis quidem folia, cum amara sint, calidam obtinent & siccam, cum nonnulla absterfione coniunctam, interim tamen nullius sunt vsus, nec medicamentis vllis admiscuntur. flos solus, sola pulchritudine & forma placet gratusq; est.

DE LYCHNIDE CORONARIA.

CAP. XII.

LYCHNIS coronaria folia gerit oblonga, pollicis latitudine aut paulo latiora, mollia, lanosa, cana, *Verbasci* folijs minora quidem, sed candidiora & lanuginosiora; caules cubitales, rotundos, geniculatos, canos quoque & lanuginosos, in plures breues alas diuisos; in quarum summo singuli flores, è calycibus suis, aspectu pulchri, sed inodori, *Viola matronalis* floribus maiores, colore rubro & veluti flammeo fulgen-



fulgentes, subinde sed rarius candidi, aut dilute rubentes, ex foliis ut plurimum quinis, rarissime senis nec pluribus congesti, nisi floris foliis (quod uti alijs floribus hortensibus, ita & huic aliquando contingit) multiplicatis; in medio florum apices sunt acuti & pungentes: radices subsunt tenues. Seritur in hortis; Italia, Germania, Gallia, Belgioq; familiaris: Apud Ananienses autem, uti Matthiolus refert, etiam sylvestris, sponteq; exit. Iunio, Iulio ac Augusto aestivis mensibus florum exortus.

NOMINANT hunc florem Germani, *Frauwenzroslin*, *Mariē roslin*, *Marghen roslin*, & *Himmel roslin*: Latine *Dominarum rosam*, *Marianam rosam*, *Celi rosam* & *celi florem*; Belgæ *Christus ooghen*, id est *oculum Christi*; Galli, *Oeillets*, & *Oeillets Dieu*. *Dioscoridi* λυχνὶς στεφανωματικὴ ἐστὶ, hoc est *Lychnis coronaria*, siue *sariva*. *Gaza* λυχνίδα lucernulam conuertit. Videtur eadem & λυχνίτις ἢ λυγνίτις per γ, esse *Verbasci* species, quæ & *ἑρπυλλίς*: folia siquidem habet mollia, hirsuta, ad lucernarum funiculos siue *ellychnia* apta, cuiusmodi *Lychniridis* esse *Dioscorides* testatur: florem item ut plurimum rubentem habet, qualem *ἑρπυλλίδος* esse, *Nicander* innuit rubentem eam in *Theriakis* nominans:

ὅσσα τε λυχνὶς ἐνερπεν, ἑρπυλλίς τε ἑρπυλλίς.

In quo versiculo *Lychnis* intelligi debet *sylvestris*, ut ipse *Nicander* interpretes monet, ne coronariam *Lychnida* à *Thryallide* differre hinc quis existimet. *Conradus Gesnerus* hunc *Iouis florem* & Græcè διὸς ἄνθος nuncupari existimat. Sed *Theophrastus* inter *Lychnida* & *Iouis florem*, διὸς ἄνθος lib. 6. distinctionem facit; aestiva sunt, ait, λυχνὶς, διὸς ἄνθος & c. & similiter *Plinius*, lib. 21. cap. 11. hæc *Theophrasti* verba referens, succedunt illis aestivi, scribit, *Lychnis* & *Iouis flos* & c. Est autem διὸς ἄνθος siue *Iouis flos*, flos æstivus,

affinius, coronarius, absque odore, cui radices lignosae; Theophrastus lib. 6. Sunt verò & qui velint Lychnida, Plinij Rosa Graecam esse, quam refert, non nisi in humidis provenire, nec unquam excedere quinque folia, Viola magnitudine, odore nullo. Porro Lychnidis & alia multa reperiuntur nomina, inter notha tamen & supposititia relata; dicitur etenim & ἀθάνατος, quasi immortalis, quod diuturnè pulchritudinem suam retineat. Item ἀκρόνιον, καλλάριον siue Bellaria, γερωνόδιον, hoc est Gruis pes; κορύμβιον; & hanc esse Corymben Ruellius iudicat, cuius Columella lib. 10. hoc senario meminit:

Nunc veniat quamvis oculis inimica Corymbe.

Corymbe.

Coronis etenim, inquit, inserta, igneo micans aspectu, oculorū aciem obtundit. Iam & Lychnis hac τείριον dicitur: alia tamē, idem Ruellius ait, quae Taura siue Tora vulgo nominatur, flore ceruleo, folio rotundo, radice Polypodij hirsuta, & vermīs nigri effigie; venenosa herba. Nominatur praeterea & σκῆπτρον, ἰτέμαλδιον, & Latine Genicularis.

Tora.

FACULTATE autem Lychnidis coronariae semen, Galenus ait, calidum est secundo quodammodo ordine, & siccum eodem modo: cum vino potum, à Scorpione ictis auxiliatur, auctore Dioscoride.

DE LYCHNIDE SYLVESTRI.

CAP. XIII.

SYLVESTRIS Lychnis geniculatis caulibus, folijsq; mollibus, Coronariae Lychnidi satis similis est; minus tamen cana, aut lanuginosa; folijs item angustioribus, & caulibus tenerioribus, pluresq; alas facientibus; floribus etiam minoribus, colore candidis aut ruberibus; calycibus tamen maioribus, in quibus semen parvum rotundum subnigricans; radicibus longis & digitalis subinde crassitudinis. Iuxta praetorum,



totam, ar
 totam etia
 folia, p
 Nost
 Bergen
 Lindwey
 Gracu
 SVNT
 nate Lych
 in Amiro
 Leontopet
 SVNT
 maculatur
 va, & ap
 & reiectu
 narian ha
 mferim. N
 possit & su
 lader breu
 pponacum
 us, folia ob
 & crassas
 tus huius
 CÆT
 drachmaru
 suspione id
 & ad ledet
 mitor Dio
 DE
 NIGE
 animatis

torum, aruorumq³ margines, & alibi sua sponte exit, transfertur etiam in hortos, in quibus quandoq³ florū foliola multiplicat. Plurima estatis parte, & in Autumnū vsq³ florēt.

NOSTRI Henettekens appellant: Germani etiam *Margen roßlin* / & *wilde Margen roßlin*: item *Ljdweyck* & *widerstoß*: Galli *Oeillets sauages*: Græcis *λυχνίς ἄγρια*: Latinis *Lychnis sylvestris* dicitur.

SUNT tamen & alia sylvestres appellatæ & cognominatæ *Lychnides*, huic haud similes. Sylvestris etenim *Lychnis Antirrhinum* quoque auctore *Dioscoride*: & similiter *Leontopetalon* *Apuleio* teste appellatur.

SUNT verò huic *Lychnidi* & alia quoq³ quedam nomenclatura, vt: *τρεχόναντον, ἀτόκιον, ἱερακοπόδιον, λευκοπᾶς*, & apud Romanos *Intybum agreste*, quæ inter nothas & reiectitias reperiuntur. Ex recentioribus plerique *Saponariam* hanc nuncupant, est tamē & alia *Saponaria*, de qua inferius. Nonnullis etiam *Ocimastrum* esse videtur; at *ᾠκίμοις* siue *ocimastrum*, *Ocimo* folijs simile est, ramosq³ habet breues dodrantales modò, radicemq³ tenuem & superuacuum. *Lychnis* verò hac caules promit cubito longiores, folia oblonga *Ocimo* nullatenus similia, & radices longas crassasq³, quæ manifestam contradictionem, & euidentem huius cum *Ocimastro* differentiam ostendunt.

CÆTERVM *Lychnidis* sylvestris semen, duarum drachmarum pondere potum, biliosa per aluum ducit, & à scorpione ictis conuenit: aiunt etiam scorpiones torpescere, & ad ledendum inefficaces reddi, hac herba ipsis apposita: auctor *Dioscorides*.

DE NIGELLAstro. CAP. XIII.

NIGELLAstrum folijs est oblongis, angustis, acuminatis, culmo cubito altiore, rotundo; virisque hirsutis
& pi-



& pilos
 Lychmide
 rotare au
 chus vi
 geribus po
 GER
 gtele: Be
 lit: Itals
 rois m. d
 esse credid
 refelli de
 ist & ali
 que Melac
 paphas
 gumi Me
 re, par, h
 mas Gith
 dem ob ca
 p. & p
 & florem
 non corda
 themis est
 basum An
 C. E. T.
 secundo es
 non men
 habet
 muni ad
 DE
 CYAN
 ammat

& pilosis; flore purpureo obscuro ad puniceum inclinante, Lychnidis sativæ simili sed minori; semine nigro, cum asperitate quadam amaro, quod in oblongis capitulis, siue calycibus vti sylvestris Lychnidis continetur; radice tenui. In segetibus passim provenit; intra quas Maio & Iunio floret.

GERMANI, raden/ ratten/ kornrosz/ kornnegelc/ Belgæ, Coerenroosen & negelbloemen appellant: Itali githone siue gitthone. Vnde pleriq; similitudine vocis inducti, verum ac legitimum Gith siue Melanthium esse crediderunt: quos à veritate recessisse notius est quàm refelli debeat. A vero siquidem Melanthio non solum folijs, sed & alijs proprietatibus differt. Appellatur tamen & Gith siue Melanthium, à semine nempe nigredine, verum non simpliciter sed cum adiectione aliqua, ad differentiam legitimi Melanthij. Hippocrates siquidem μελάνθιον ἐκ τῶν τρυῶν, hoc est, Melanthium ex tritico. Octavius Horatianus Gith quod in segete nascitur ipsum nominat: & eandem ob causam ab huius ætatis doctis, Nigellastrum, Githago, & pseudomelanthium dicitur. Ruellius à Gallis nielle & florem micancalū refert appellari, & Theophrasti ἀνθεμον φυλλῶδες esse iudicat. Sed Anthemon Theophrasti, Anthemis est apud Dioscoridem, & ἀνθεμον φυλλῶδες siue foliosum Anthemidis species, cum Nigellastro parū conveniēs.


CÆTERVM Nigellastri semen, calidum & siccum secundo est ordine satis intenso: in pessa cum melle subditum menses euocat; vt Hippocrates in lib. de morbis muliebribus testatur. Octavius Horatianus, semen frictum & tritum ad auriginem bibendum exhibet.

DE CYANO FLORE. CAP. XV.

CYANO flori caules angulosi; folia verò oblonga sunt, acuminata, per oras aliquo modo angulosa, in virore albi-

D

cantia;



cania; &
 la. & m
 squam
 popula; &
 pictura
 nam, for
 barbatul
 candidus
 que in ip
 nax, fibri
 tays, vna
 tor & in
 mutat, mo
 rubentia, a
 gius flore
 C. A.
 dore. F
 appellatio
 mani ete
 & Belg
 ucole. A
 pefes, &
 blactifec
 nfa in ei
 P. A.
 fide oblon
 canibus,
 bu: caule
 aterius: j
 peram non
 agio h
 gement

cantia; capitula in summo cauliculorum rotunda, turbina-
ta, & in angustius se contrahentia ex multis parvis veluti
squamis sibi invicē impositis, conis alicuius parvi modo com-
posita; ē quibus flores erumpunt ex multis quasi simbrijs
pulchrā serie in orbem digestis, colore cerulei; semen par-
vum, forma oblongum, laeve, splendidum, superiori parte
barbatulum, Centaurij maioris semini simile, sed minus &
candidius, quod in ipsis capitulis siue calycibus, inter eas,
que in ipsis gignuntur mollibus pilis, reperitur: radices te-
nues, fibris quibusdam capillatę. Nascitur in agris frumen-
tarijs, vñā cum tritico, secali, hordeo & alijs frugibus: seri-
tur & in hortis, qui cultura mangonio colorem sape per-
mutat, modò albicantis, modò purpurei, & eius, aliās dilutē
rubentis, aliās ad puniceum inclinantis. Maio vñā cum fru-
gibus florere incipit, deinde Iunio & Iulio floret.

CYANO flori, ab ipso ceruleo colore, nomen veteres
dedere. Recentiorum plerique Vernaculam Germanorum
appellationem secuti florem frumentorum nuncupant. Ger-
mani etenim *Kornblumen* & *blauw Kornblumen*:
& Belge similiter *Tozenbloemen* appellant. Galli Bla-
ueole, Aubifoin, aut bluet, dicunt. Ab Italis fior Cam-
pese, & battifecula siue baptifecula nominatur: quasi
Blaptifecula, quòd metentibus & secantibus officiat, re-
tusa in eius occurſu falce.

PRÆTER verò & hunc, & alius est Cyanus maior, 2
folijs oblongis, pollice latioribus, mollibus, lanuginosis, albi-
cantibus, Verbasci tamen folijs & minoribus & nigriori-
bus: cauliculis dodrantalibus: capitulis etiam squamosis vñ
alterius: floribus quoque similibus & ceruleis, sed ad pur-
puram nonnihil vergentibus, ac maioribus: radicibus, quę
crassis hæreant fibris, & durabilis natura, singulis annis re-
germinant. In sylvis & montosis Trago teste reperitur: no-



fr in her
blumen
Cy
hafa spec
frifum
POR
peta sunt
tur tamen
io normid
thibus po

DI

REGI
ramulos co
a fazione
tia: & ad
& fpeciatim
lum, angus
dinem refer
bi: filiqua
men angul
enna ferua
EXIT
pro: qui fo
hor tamen
lue tancum

FLOR
terfis.

APPE
fris EDD
Sperone

DE FLORE REGIO.

13

fri in hortis serunt. Aestate floret. Germani Wald korn-blumen appellant.

CYANVS maior appositè dici potest. Thryallis Verbasci species nonnullis esse videtur, sed Thryallis, vt superius scripsimus, flore rubet.

PORRO facultates horum florum, nondum satis comperta sunt; cum nullum in medicina vsum habeant. Videtur tamen Cyanus prior, siue frumentorum flos, refrigerantis nonnihil esse potentia, atque hinc oculorum inflammationibus posse prodesse; quod à plerisque ei ascribitur.

DE FLORE REGIO: CAP. XVI.

REGIO flori caules exeunt cubito altiores, rotundi, in ramulos complures diuisi; circa quos folia tenuia, multiplici sectione diuisa, Abrotoni folijs maiora, è virore nigricantia: & ad superiores eorundem partes, flores pulchri, ordine & spicatum digesti, quibus à tergo paruum veluti corniculum, angustum & acuminatum veterum calcaris similitudinem referens: colore aut candidi, aut purpurei, aut cerulei: siliqua inde oblonga, rotunda, subnigra; in quibus semen angulosum & nigrum. In hortis & colitur & singulis annis feritur.

EXIT etiam in agris frumentarijs, latiori solo, sylvestris: qui folijs, floribus, siliquis, semine, satiuo similis, humilior tamen; in singulis etiam ramulis flores pauciores, & colore tantum ceruleo.

FLORET vterque aestiuis mensibus; & diutissimè hortensis.

APPELLATUR à Germanis *Bitter sporn*: à nostris *Ridder sporen*/ hoc est, equitis calcar, & Italicè *Sperone de caualliere*: à Gallis *pied d'alouette*, id est,



Per Al
 Confol
 latas
 Iam
 ferem
 acum,
 cum
 sed ad
 exempl
 à l'el
 qui fib
 Dolph
 heret,
 eile fat
 nism
 famili
 na, rep
 famili
 celest
 aut ad
 enim al
 tamen v
 De
 deactiv
 puer p
 puer, d
 nio e
 de infer
 eque
 in p
 num
 vna

Pes Alauda: Latine flos equestris, & flos regius: à nonnullis Consolida Regalis, qui hanc stirpem inter consolidas appellatas referunt. Valerius Cordus calcatrippam nominat: sed Ioannes Ruellius calcatrepam siue chaucetrepam, in spinosarum stirpium numero cenfer. Videtur etiam esse Delphinium, cuius apud Dioscoridem lib. 3. descriptio occurrit, cum quo convenire potest, si τὸ δελφινοειδὲς non ad folia, sed ad flores contrahatur. Quo modo in vetustis quibusdam exemplaribus legi, memini me olim audivisse ex Gerardo à Veltvvijck Caroli V. Imp. apud Turcorum Imp. legati, qui sibi Constantinopoli visum exemplar referebat, quod Delphinio, non folia, sed flores Delphinorum specie esse haberet. Quae lectio si vera est, florem Regium, Delphinium esse satis euidèter commonstrat. Nam flores quidem & potissimum prius quàm completi sunt, speciem quandam ac similitudinem eorum Delphinorum exhibent, quos recurva, repandag₃ figura, veteres pictura, & nobilium aliquot familiarum auita insignia, exprimunt: qua etiam imagine caelestis Delphin representatur. Neque refert quòd spurium aut adulterinum de Delphinio caput existimetur, tamen si enim alterius cuiusdam & non Dioscoridis sit; est alicuius tamen veterum, ex quo Dioscoridis libris acceffit.

DESCRIBITVR autem Delphinium his verbis: Delphinium.

Δελφίνιον κλώνες ἀνίστι δισπιθάμους ἢ καὶ μείζονας ἀπὸ μιᾶς ῥίζας, περὶ οὓς φυλλάρια ἐπισχισμένα, λεπτὰ ἐπιμήκη, δελφινοειδῆ, ὅθεν καὶ ἀνόμασται, ἀνδρὸς δὲ ὅμοιον λευκοῖς ἐμπόρφυρον. σπέρμα ἐν λοβοῖς κέγχρω ἐμφορές. Deinde inferius & alterū Delphinium. Δελφίνιον ἕτερον καὶ αὐτὸ ἐμφορές τῷ ὄρῳ αὐτοῦ. τοῖς δὲ φύλλοις καὶ τοῖς κλωνίοις ἰσχυρότερον πολλῶ. Quorum verborū hic est sensus: Delphinium furculos emittit duorum dodrantum, aut maiores ab una radice: circa quos folia fissa, tenuia, oblonga, Delphini

specie : vnde & nomen accepit : flos similis Leucoio purpureus : semen in siliquis milio proximum . Delphinium alterum, etiam ipsum simile superiori, sed folijs & ramis gracilius multo.

HARVM duarum descriptionum prior, voce Δελφινίου ad florem relata, mutanda, & hunc in modum legendenda veniet. Delphinium surculos ab vna radice emittit duorum dodrantum, aut maiores : circa quos folia fissa, tenuia, oblonga : flos similis Leucoio, purpureus, Delphini specie ; vnde & nomen accepit : semen in siliquis milio proximum.

ATQVE hoc modo descriptione se habente erit satius flos Regius similis primo Delphinio : syluestris verò secundo. Sunt verò Delphinio & nomenclaturæ quædam aliæ, sed quarum plurimæ pro nobis habentur, vt διαχυσίς, διάχυτος, παράλυσίς, κάμαρος, ὑάκινθος, νήσιον, νηπειάδειον, σώσανδρον, κρόνιον : & apud Latinos, Bucinus siue Bucinum, & Bucinus minor.

SED vt ad florem regium reuertamur, non desunt, qui & ipsum Cuminum syluestre alterum Dioscoridis esse velint, quæ Matthioli est sententia, & veritati multum consona. Cum eius siquidem descriptione similitudinis tantum, quantum quæ plurimum habet. Est etenim folijs tenuibus, satiuo cumino satis similibus, & à singulis floribus cornicula in sublime erigit : semen deinde Melanthij profert : quale syluestre Cuminum alterum esse Dioscorides tradidit ; ipsum his verbis delineans. ἔστι καὶ ἕτερον γένος ἀγρίου κυμίνου. ἐμφερές τῷ ἡμέρῳ, ἐξ ἐκάστου δ' ἀνδρὸς ἀφίσι κεράτια μετέωρα, ἐν οἷς ἔστι σπέρμα ὁμοίον μελανθίῳ, id est, Est & alterum genus syluestris Cumini, satiuo simile, ex singulis floribus cornicula sublimia proferens, in quibus semen Melanthio simile.

Cuminum
syluestre
alterum.

DE CALENDVLA SIVE CALTHA. 57

Et esse potest, ut idem sit Cuminum sylvestre alterum, & pariter Delphinium; præsertim Delphini descriptione accessoria, & ex aliquo alio auctore in Dioscoridis exemplar translata. Crebrò siquidem eadem stirpes, alijs nominibus, à diuersis scriptoribus appellantur.


CÆTERVM sylvestris alterius Cumini semen potum, ad serpentium morsus remedium est optimum: auxiliatur & ijs, qui vrina stillicidio laborant, calculosis, & his, qui sanguinis grumos mingunt: sed his Apj semen seruefactum postea bibendum est: auctor Dioscorides. Delphini verò semen potum in vino à scorpione ictos, ut nullum aliud, auxiliatur. Aiunt scorpiones apposita herba resolui, ignauosq; ac torpidos fieri; semota vero, sese recolligere.

DE CALENDVLA SIVE CALTHA.

CAP. XVII.

CALENDVLÆ folia dilutè virent, oblonga, aliquantulum lata, mollia, nonnihil lanuginosa: caules foliosi, striati, fungosa intus medulla, in plures alas diuisi: flores in summo pulchri, rotundi, multiplices, cum grauitate quadam aliquantulum odorati, diluti croci aurius purioris colore, in quorum medio multa breuia, simul compressa, lutea vel subnigra stamina; semen à singulis floribus numerosum, recuruum: radices fibrosæ. In hortis & cultis prouenit: circa Monspelium etiam sua spontis, Gesnero teste. Ab Aprili aut Maio mense in hyemem vsque floret: qua etiam clementi flos eius emicat.

CALENDVLAM recentior ætas appellat; quòd ferè singulis mensium Calendis florere conspiciatur. Germani Ringelblumen; Belgæ Bourtbloemen; ab auri emulo floris colore. Galli Soucie & Soulsie. In Hetruria, inquit



DE
 Martio
 quia sub
 tropica
 mare cre
 nem &
 tem aut
 agloga
 Mollis
 Columell
 Can
 P. U
 grauer
 que vi d
 colore lat
 C. a
 du est,
 & aridus
 versu pe
 esse. E
 cundus e
 H. e
 cum qu
 tatem ei
 clare sum
 dentium
 puluerem
 ciam qu
 Est
 nero cog
 matica;
 pium pra

Matthiolus, Fior rancio . Sunt qui Solsequium vocitent ; quia sub vesperam flos contrahatur : non est tamen Heliotropium , multo etiam minus Scorpioides , vt plerique temere crediderunt : sed veterum potius est Caltha . Vergilius etenim & Columella Caltham florem esse ostendunt , luteum aut flauum colore . Et Vergilius quidem in Georgicis *ægloga secunda* , sic scribens :

Mollia luteola pingit Vacinia Caltha.

Columella verò in hortis libro decimo, his verbis:

Candida Leucoia & flauentia lumina Caltha.

PLINIVS autem lib. 21. cap. 6. Caltham etiam grauiter odoratam esse ait . qualis in totum Calendula est , quæ vt diximus , cum grauitate quadam odorata , & auri colore luteo splendet .

CÆTERVM facultate flos quidem Calendula calidus est , secundo propemodum ordine ; præsertim resiccatus & aridus : creditur cor corroborare , venenis resistere , & aduersus pestilentes febres , quocunque modo sumptus , efficax esse . Fuchsius ex vino potum menses ciere , & suffitum secundas educere , scriptum reliquit .

HERBÆ autem folia calidiora sunt , acrimoniam enim quandam ferendam habent , sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exerit , ratione cuius in olerè sumpta , aluum mouent & leniunt . Fuchsius succum dentium dolores sedare scribit , si os eo colluatur . Alij ad idem puluerem foliorum cum xylino dentibus admovent . Sunt etiam qui herbam acetarijs admisceant .

EST verò & alia præter hanc Caltha , Alpina à Ges-
nero cognominata ; folijs plantaginis , radice acri & aromaticæ ; flore Caltha aureo : nascitur copiose in summis Alpium pratis .

² Caltha Alpina.

INTER Calthas numerandus etiam videtur flos cognomento Aphricanus. Huius dua sunt species; vna minor, humilis, ramulis cubitalibus, per terram plurima parte stratis: altera maior, procera & erecta, ad tres vel amplius cubitus assurgens.

FOLIA vtrique sunt secundum caules striatos multa, oblonga, ex multis singularibus per ambitus crenatis, coniuncta; tanacetii folijs propemodum similia; qua cribri modo, soli aut lumini opposita, perforata cernuntur: flores in summis ramorum surculis ex longis calycibus ampli, rotundi, ex octo aut decem foliolis congesti, inferius luteis, superiori verò parte in fuluo rubentibus, & obscure rubens villosum holosericum amulantibus; inter qua media exeunt stamina lutea: semen nigrum, forma oblongum & tenue: pro radicibus fibræ. Est vtraque species, cum folijs, tum floribus grauitè odorata. Virtusque etiam flores, sed maioris frequentius, subinde multiplicantur; quorum foliola ab vtraque parte vt plurimum lutea. Apud Belgas, Germanos & alibi, in hortis colitur, & singulis annis seritur. In Aphrica plerisque locis sponte prouenit: vnde primum in has regiones inuectus: quando videlicet D. Carolus V. Roma. Imp. apud Tunetum celebri potitus esset victoria: ex quo illi & Aphricano aut Tunetenfi cognomen. Minor Iunio, deinde & reliqua æstatis parte: maior Augusto demum mense flores edit.

BRABANTI Flandriq; vulgo Thunis bloemen nuncupant. Germani Indianisch blumen & India-nisch negelin' id est, florem aut caryophyllum Indicum: vnde & Gallis Oeilletz d'Inde. Cordus Tanacetum Perunianum



Petilius
flos.

ruianū appellat : à similitudine videlicet tanaceti & Peru-
America prouincia , ex qua primum in Europam illatus , à
Germanis creditus est . Gesnerus Caltham nominat Aphri-
canam , & Punica lingua Pedua , ait , vocatur . Sunt qui ve-
lint Plinij Petilium esse florem . Sed Petilius flos est autum-
nalis , circa vepres nascens , tantum colore commendatus ,
qui est Rosa syluestris : folijs paruis quinis ; calyce paruo ,
versicolore , luteum semen includente . Mirum est in eo flore ,
inflecti cacumen , & non nisi retorto folia nasci . Plinius
lib. 21. cap. 8.

ANDREAS Lacuna, Othounam herbam esse, suspi-
catus fuit , cum cuius tamen descriptione , haud per omnia
flos iste conuenit : nisi sorte squalidior , & paucioribus folijs ,
Eruca similioribus , manifestiusq; perforatis in Aphrica ,
quàm in Europa nascatur . In hac etenim amplius , multifo-
lius , folijs Tanaceto , quàm Eruca similioribus , ijsq; non
verè perforatis , sed quæ talia lumini opposita tantummodo
apparent , gignitur .

ET non rarò quidem euenit , vt ex feruenti , calida sic-
caq; regione ; & sterili , aut inculto , & aprico solo , in hu-
midius cultiusq; , vbique calum clementius , translata stir-
pes luxurient . Nam soli caliq; mutatio , ad stirpium mu-
tationem plurimum habet momenti ; & maxime acceden-
te cultura mangonio . Qua tamen an tantum potuerit , vt
florem hunc totum penè transformauerit , expendendum
relinquimus .

Othonna.

EST autem Othonna, Troglodytica quedam herba , in
eo Arabia tractu nascens , qui ad Aegyptum spectat : ἔχει
δὲ, Dioscorides ait , τὰ φύλλα ἐν ὧ μὲν ἐμφερῆ , πολὺ τριτὰ
ὥσπερ σπυρίονα , ἡραρά , ὀλιγοφυλλὰ . ἀνθὸς δὲ φέρεται κρό-
κινον , πλατύφυλλον , ὃθεν ἔδοξαν ἀνέμῳ νῦν αὐτὸ τινεὶ ἔϊδος
ἵναί : hoc est , folia habet Eruca similia ; foraminosa , veluti à
tineis

zineis erosa : squalida : paucifolia : florem fert crocinum ,
latifolium : quare quidam Anemones speciem esse puta-
uerunt.

GALENVS lib. 4. de simpl. medic. facult. Lycopersii ^{Lycopersium.}
cuiusdam herba meminit , cuius succum Centurio quidam
ex Barbarica circa Aegyptiū regione comportauerat , odore
adeo graui, adeoq; inameno, vt ne gustare quidem ipse au-
sus fuerit Galenus, sed lethalem esse conijceret: vtebatur au-
tem eo Centurio ille ad vrgentes articulorum dolores : atq;
ipsis etiam laborantibus refrigerandi facultate pollere visus
est. Est autem, Galenus ait, colore sublauro : odore tam gra-
ui, quam Cicuta : nisi quod leuem quandam instar aroma-
tum odoris adferat gratiam. Nomen herbae ex qua succus
hic exprimitur, Lycopersium esse dicebat. Quali autem pra-
terea sit forma, Galenus non addidit: ideoq; etiam an Lycop-
ersium flos Aphricanus sit, definiri absolute non potest. Vi-
detur tamen illi, si non idem, simillimus. folia etenim, &
praesertim flores graui admodum & ingrato praeclata sunt
odore : qualitateq; venenosa, Cicuta proxima. Cuiusmodi
autem eius expressus & resiccatus succus, nondum quidem
obseruasse nos confitemur : verosimile tamen est, ex floribus
haud alterius, quam flauī aut sublutei coloris, & graueo-
lentem futurum.

VENENOSA autem & refrigerandi potentia, flo-
rem Aphricanum donatum esse, odor ingratus, caput ag-
grauans, Cicuta similis, qualis Lycopersii succo, ostendit:
deinde & experimētis nonnullis constat. Memini etenim in
puero, qui flores mandere inceperat, labia & os inflata me-
vidisse; sicuti crebro ijs accidit, qui Cicuta fistulis ludentes
aut modulantes, intra labia eas aliquandiu continuerunt.
Feli etiam flores cum calycibus, recenti caseo permistos olim
dedimus; quae mox valde inflata, & paulo post mortua fuit.

Mures

64 DE CARYOPHYLLEIS FLORIBVS.


Mures quoque qui semen arrosant, mortui feruntur reperi. Quæ omnia venenosam & deleteriam huius herbe facultatem ostendunt: & non audiendos esse eos, qui hanc Tanacetum vel Arthemisiam speciem, aut innoxiam stirpem fore autumant.

DE CARYOPHYLLEIS FLORIBVS. CAP. XIX.

CARYOPHYLLEORVM florum species quidem sunt complures, armerijs nuncupatis in horum numero repositis; ijs autem relictis duæ præcipuè: vna maior, altera minor.

MAIORI caules laues, teretes, cubitales sunt aut altiores, geniculati: folia è singulis geniculis bina, oblonga, dura, angusta, per extremum acuminata, colore quasi caesia: flores speciosi, ex longis, teretibus, denticulatis calycibus, & è senis vt plurimum, qui simplices sunt; ex pluribus verò multiplices, ijsq; lentè simbriatis commissi; odore admodum suauis & odoratos Indicos caryophyllos referentes; colore aliàs in diluta purpura, aliàs in saturata rubentes, subinde candidi aut ex candido purpurascens, interdum versicolores; in quorū medio staminei emicant gemini apices candidi: semen in vasculis oblongis paruum & nigrum: radices fibrosæ. Habentur in hortis; sed speciosissimi ferè in fictilibus vasis. Seruntur frequentius auulsis exiguis cum folijs surculis; seminibus rarius. Nam è semine nati, ad agrestem naturam redeunt, floresq; minores, minusq; odorati, & simplices; etiam si prius multiplices, redduntur. Adiguntur subinde surculis cum plantantur fissis Caryophylli; quo illorum odorem flores alliciant, & iucundam eorum suauitatem naribus abundantius representent. Viuax est planta, & multis

CARYOPHYLLEVS FLOS MAIOR. 65



66 DE CARYOPHYLLEIS FLORIBVS.

& multis durat annis, si hybernis mensibus, à frigoris iniuria tuta, in cellis vinarijs aut alijs similibus locis tepidis asseruetur. Floret diutissimè, tota quidem æstate & Autumno: in cellis etiam interdum, fauente loci tepore, hyeme tametsi rigida.

CARYOPHYLLEVM florem, ab odore Caryophyllorum recentiores nominant: Germanis *Regelblumen* / *Brasblumen*: Italis *Garofoli*: Gallis *Oeilletz*, *Ouilletz*. Belgis *Binoesselbloemen* & *Brossels bloem* / & Latine à plerisque *Ocellus*, *Ocellus Damascenus*, *Ocellus Barbaricus*, & *Barbarica* nuncupatur. Sunt etiam, qui *Betonica*, aut *Vetonica* siue *Vettonica* appellent, altilem aut coronariam cognomento; (Matthiolus *Vettonicum* coronarium dicere maluit) ad differentiam videlicet alterius *Betonica*, quæ Græcis κέστρον καὶ ψυχότροπον dicitur; atque hinc etiam herbam tunicam dictam, hanc esse plerique existimant: sed Bernardus Gordonius herbam tunicam Dioscoridis *Polemonium* esse tradidit. Turnerus *Caryophyllèu Cantabricam* facit, quam Plinius lib. 25. cap. 8. in Hispania inuentam scribit, per Diui Augusti tempora, à Cantabrica Cantabris repertam. Nascitur vbique, ait, caule iunceo, pedali; in quo sunt flosculi oblongi, velut calathi: in his semen perquam minutum. Leonhartus verò Fuchsius, *Vetonicam* siue *Betonica* alteram esse voluit, quæ inter notha Dioscoridis descripta reperitur; & quidem his verbis: Βετλονική γεννᾶται ἐν χορτοκοπέοις καὶ ὄρειοις τόποις, καὶ καθαροῖς, καὶ ἡμέροις, περὶ τὰ γεννήματα. ἔχει δὲ τὴν μὲν ῥίζαν ὅλην ἐρύθραν, καὶ ἐνώδην. τὰ δὲ φύλλα πράσινα. καὶ τὸ μέσον τῶν φύλλων φοινικῶν. καὶ εἰς τὸ ὀρθοκάλαιον τριγώνια. καὶ ἐπ' αὐτῶν ἀνθὴ πορφύρεζοντα: id est, *Vettonica* nascitur in pratis & montanis locis, mundis item & cultis: radicem habet totam rubentem & odoratam: folia porracea, & me-

Cantabrica

Vettonica
altera.

dium

dium eorum puniceum, in recto calamo triangula, & in ipsis flores purpureos. Ioannes Ruellius Caryophylleum florem incognitum veteribus existimauit; cuius optimum iudicium videtur; nam certè Vettonicæ altera, aut Cantabricæ parum flos iste similis est. Mirum creditur, ait, ut tam celebris flos, tamq; iucundus, fuerit à veteribus silentio prætermisus: qui amplitudine, pulchritudine, varietate, Rosa non inferior videri potest.

ALTERA & minor Caryophylleorum species, priori² tenuibus caulibus folijsq; simillima est, virisq; tamen minoribus: flores etiam habet ex oblongis, paruis & teretibus calycibus similes, verum minores & per ambitum magis dissectos ac fimbriatos; colore candidos, aut è candore purpurascens. Apud Belgas in hortis nascitur; Gesnerus autem apud Germanos in pratis humidis etiam reperiri refert. Aestate flores emicant.

VETTONICAM altilem suæ coronariam minorem, aut alteram nonnulli nominant; Germani *Burwillen* aut *Hochmut*; atque hinc etiam à plerisque superba: *Nostri Bluymkens*; à flosculorum folijs fimbriatis & plumarum similitudine dissectis; & *Clepi Vinofflen* hoc est, Caryophylleum minorem appellant.


VSVS autem Caryophylleorum florum in medicina verè quidem nullus est, in coronis verò propè nimius; & præsertim floris altilis; qui etiam acetum iucundo sapore, & colore, auctore Ruellio, commendat. Fuchsius tamen, non modo ex floribus, quam conseruam vulgo appellant, verum & radices altilis ad pestis contagia à recentioribus commendari; sylvestris verò succum calculo atterendo ac educendo, nec non comitali morbo laborantibus vtilem credi, scriptum reliquit.

ARMERIORVM florum aliquot etiam species sunt foliorum ipsius stirpis, cum magnitudine, tum colore præcipuè differentes.

P R I M A species cauliculos habet rotundos, geniculatos, veluti Caryophyllei flores, circa inferiora genicula vt plurimum rubentes, cubito breuiores; folia plurima parte oblonga, sed aliquantulum, quàm maioris Caryophyllei latiora, colore herbaceo virentia; flosculos in summo cauliculorum paruulos exiguis Caryophylleis persimiles, verum minores, plures simul in quandam veluti umbellam congestos, particularim vt plurimum prodeuntes, & semper ferè cocci rubore splendentes, punctis interim candidis circa medium interdum variegatos, rarissimè candidos. Ornat hic flosculus Belgicorum hortorum areas: apud Italos & alibi locis incultis & aridis exit. Gesnerus circa Gryphij lacus ripas in Heluetia à se repertum scribit: prouenit & alicubi in Belgio locis desertis, iuxtaq; aruorum & pratorum margines ac scrobes, sed multo quam in hortis minor & tenuior. Maturè & Aprili sape mense aut Maio floret, Caryophylleos flores antecedens: plurima inde æstatis parte viger.

G A L L I Armoires & Armoiries appellant: Ruelius Armeros flores hinc nuncupat: Germani **Donder negele**/felt negele: Belgæ **keykens**/quasi dicas fasciculum. florū etenim fasciculos nostri propria lingua **keykens** nominant. Caryophylleorum florum species quadam syluestris videtur, quam ob causam & à recentiorum quibusdam **Vettonica** agrestis aut sylvestris dicitur: nec desunt qui tunicam herbam esse volunt: sed nihilo magis hic, quàm Caryophylleus cum Vettonica altera aut Polemonio conuenit.

A L T E



- 2 ALTERA Armeriorum species folia circum caules geniculatos, multo fert latiora, maiora & crebriora, nec non candidiora, Constantinopolitani floris folijs haud multum dissimilia: flores in umbella vna plures simul congesti, pulchri, rubentes, exiguis candidulis punctis ornati, prioribus Armerijs similes sunt. In petrosis collibus & asperis, sabulosis apricisq³ locis, apud Germanos & alias nationes nascitur; à Belgis in hortis seritur, vbi secundo anno cum alijs Caryophylleis aestate floret.

GERMANI Steinnegele vocāt, aliqui Scarlatam à rubeo floris colore coccū referente. Et sylvestris hic Caryophylleus est, veluti & præcedēs: vterq³ certè nulla cura eget: natura sua viuax; & hyemis iniuriā nō difficulter sustinet.

- 3 IAM & tertia quadam est Armeriorum florum species cauliculis rotundis, geniculatis, tactu glutinosis, pedis altitudine; folijs ex singulis geniculis binis oblongis angustis acuminatis, in virore candicantibus & quasi castis: floribus in umbella similiter pluribus simul congestis, pulchris, Armerijs similibus, verum minoribus & rubentis dilute purpurea colore: semine in oblongis vasculis pusillo: radicibus tenuibus ac fibrosis. Seritur in hortis. floret à Maio aut Iunio mense in Autumnum vsque, & eodem quo sata est anno.

SVNT qui velint Limonij aut Behen siue Been, vulgo nunc dicti, speciem aliquam esse, propter eam quam cum Behen rubentis floris, quod Matthiolus Limonij speciem facit, similitudinem habeat. Nam cauliculis geniculatis & folijs illi aliquantulum sed colore similior est. Caules tamen breviores & teneriores, foliaq³ minora; color verò lauitasq³ foliorum in vtriusq³ fere eadem. At nos hanc stirpem non Behen, aut Limonium, sed Armeriorum florum speciem aliquam esse autumamus, quam ob causam & terrum ei, inter eos locum fecimus.



E 4

4 PRÆTER hos verò & alia quadam est, vel Caryophylleorum vel Armeriorum species, omnino, vbiq; & apud Belgas quoque sylvestris: cauliculos habet dodrantales: folia è singulis geniculis bina, parua, acuminata: flores in cauliculorum summo singulos, per ambitum fimbriatos, Caryophylleis minoribus, & forma, & magnitudine satius similes, colore verò cocci diluto rubentes. Exit passim in pratis & locis riguis. Maio & Iunio mensibus flores potissimum conspiciuntur.


BELGÆ *Tracpenbloemkens* appellant, id est, Cornicis flores.

CÆTERVM Armeriorum omnium istorum flores, nec vllum quoque, aut in medicina, aut in cibatu vsu habent: sed coronarij sunt & hortos ac corollas exornant.

DE FLORE CONSTANTINOPOLITANO. CAP. XXI.

CONSTANTINOPOLITANO flori caules sunt è radice plures, bicubitales, tenues, geniculati, inanes: folia è singulis geniculis bina, oblonga, aliquantulum lata, acuminata, obscure virentia, nonnihil aspera & hirsuta; sicuti & caules: flores in latis umbellis, multi simul congesti, aspectu pulchri, ceterum inodori, colore floris *Calendula*, vel purpurei lilij, siue maturi mali anarantij corticis, subinde candidi: semen in oblongis acuminatis vasculis exiguum & subruffum: radices longæ, in plures tendes diuise, gustu aliquantulum acres. Belgis, peregrinus est flos: seritur in hortis. Iunio & Iulio altero à satione anno floret, deinde pluribus sequentibus alijs. Radice etenim constat viuaci: diuq; durat, hyemis & frigoris patiens.

2 EST & huius altera & minor species, cubitalis, aut paulo



paulo altior, rarioribus floribus, quæ primo anno flores proferunt: Gesnero teste.

NOSTRI vulgo Constantinopolitanum appellant florem: Germani verò florem Hierosolymorum: Aldrouandus Creticum cognominat. Sunt qui velint Lanariam nuncupatam Latinis radicem esse, quæ Græcis στρούδιον: Arabibus Condifi dicitur, quæ ad purgandas lanas, qui eas eluunt, olim utebantur; quos veritatem minus assecutos esse evidentiùs est, quàm ut refelli debeat. Neque enim spinosa aut aculeata huius floris stirps est, quale Struthion esse Theophrastus & Plinius referunt: radicem etiam non habet magnam; aut Oleæ folia, vti Struthio sunt.


Pothus
flos.

NON deerunt autem fortasse, & qui florem hunc Constantinopolitanum, πῆδον veteribus dictum florem esse suspicabuntur, quem Gaza Latine desiderium vocat: quorum sententiæ cur aduersetur, modo non habemus. Pothum enim florem Theophrastus, Plinius, & Athenæus, inter æstiuos reponunt, duorumque esse generum referunt: vnum hyacintho similem, alterum ἀρχοῦν non coloratum siue candidum. Constantinopolitanus autem, æstiuis mensibus floret, & colore vel hyacinthum scriptum, quem purpureum Liliū vocant, proximè refert, vel candidus est. Quæ magnam Constantinopolitani floris cum Potho similitudinem ostendunt.

CÆTERVM flos Constantinopolitanus, præter eam, quam in hortis & coronis gratiam assecutus est, nullum, quod sciamus, medicum usum habet: facultas eius ea de causâ incerta est.

DE SAPONARIA. CAP. XXII.

SAPONARIÆ, vulgo dictæ, caules sunt glabri, ternes, rotundi, geniculati, cubitales aut altiores: folia lata, venosa,



venosa, plantaginis latifolia folijs simillima, sed tamen minora, è singulis geniculis bina, ut plurimum, & præsertim radicibus viciniora, deorsum reflexa: flores in summo cauliculorum, & circa superiora genicula multi, odorati, colore aliàs pulchro roseo rubentes, aliàs dilutè purpurascens, aut candidi, qui ex teretibus & oblongis calycibus exeunt, ex quinque foliis commisi; in quorum medio exigua quadam stamina: radices crassæ, longæ, obliquè serpentes, quibus fibræ quadam adherent, veratri nigri radicibus similes. Apud Belgas in hortis colitur: alibi iuxta fluuios & torrentes, locis apricis, sponte nascitur. In hortis, diu durat, & vitæ est pertinacis. Iunio & Iulio floret.

SAPONARIAM vulgo nuncupant, ab abstergendi potentia, qua folia pollent: succum etenim quandam ex se remittunt, dum confricantur, saponis ferè modo extergentem. Ruellius tamen & aliam quandam saponalem describit. Nonnulli herbam Tunicam appellant: non est tamen Vetonica coronaria, multo minus Polemonij aliqua species; quas pro Tunicis herbis haberi, Cap. de Caryophyllis scripsimus. Videri citius posset Alisma, siue Damasonium, nisi caulis ei crebro, non simplex, sed subinde in alas quasdam diuisus; & radices essent quàm veratri nigri crassiores: folia siquidem habet Alismatis descriptioni conuenientia, & globosam florum in summo caulium congeriem. Sed Alismatis tenuis est caulis & simplex; & radices similiter tennes: quæ differentiam Saponaria huius & Alismatis ostendunt.

Alisma.

DESCRIBITVR enim Alisma à Dioscoride hoc modo: Alisma, sunt qui Alceam, qui Damasonium, qui Acyron, qui Lyron nominant, folia Plantagini similia habet, angustiora tamen versus terram reflexa: caulis tenuis est, simplex, cubito altior, capitula habens, Thyrsi similis:



lis : flores tenues , candidi , sublutei ; radices veluti Vetratri nigri tenues , odorata , acres , subpingues : loca amat aquosa.

Idem Plinius iisdem penè verbis lib. 25. cap. 10. depingit : sed duo eius statuit genera ; vnum in aquosis , quod quidem à Dioscoride describitur ; alterum in sylvis proueniens , nigrius , ac maioribus folijs . folium etiam ei lacinosum esse ait , quod Dioscorides omisit ; & caulem capite Thyrsi , pro eo quod ille *ὑγροειδὴν* eum esse scribat ; qualis sit Thyrsoides caulis sic insinuans : nempe superiore parte & crassior & latior.

Thyrfus.

THYRSVS enim siue *ὑγρός* , virga , fax aut hasta est , frondibus aut hederis obrecta , cuius fastigium pluribus frondibus aut floribus stipatur , instar videlicet globi aut pilæ . Sic etenim in antiquissimis quæ Roma passim extant marmoribus depictum reperiri Thyrsum , testis est Melchior Guilandinus in epistola ad Langium ; summo videlicet cacumine globosum quiddam instar pilæ gestantem . Talem etiam Thyrsum esse , quarundam stirpium & descriptiones ostendunt . Acanthum enim herbam (Brancam vrsinam nominant) Dioscorides *κεφαλὴν ὑγροειδὴν* habere scribit ; huius autem caulis cum primum prodijt , priusquam integrè adoleuit , summa parte crassior est . Thymus etiam *ὑγροειδὴς* appellatur , qui in cauliculis globosum capitulum profert : vnde & *κεφαλῶτος* & capitatus cognominatur . *ὑγροειδὴν* item Orobanche dicitur , caulis cui superiori parte crassior est : Thyrsus , iam & ferula caulis nuncupatur , qui licet sensim extenuetur , summo tamen cacumine umbellam latam & rotundam florum primum , deinde seminum plenam Thyrsi modo promittit : vnde & *ῥάβδος* siue ferula , pro Thyrso subinde dicitur : atque hinc Bacchus , qui *ὑγροειδὴς* , etiam aliquando *ῥαβδικοειδὴς* appellatur à Thyrsi , qui

in eius

in eius orgijs olim quatiebantur. Quæ omnia Thyrsum virgam, baculum aut hastam esse ostendunt; globoso ex frondibus aut floribus cacumine: & *ὀφρύϊον* caulem dici, summa parte sphaeroidem aut latiore. Neque repugnat nobis in Saturnalium lib. 1. Macrobius, ubi Liberum patrem cum Thyrsum tenet, latens telum gerere scribit. Nam inde Thyrsum non in exacutum cacumen, sed potius in retusum & globosum apicem desinere colligitur: ex eo enim quod latens telum dicit, ostendit ita cacumen contextum, ut agnoscere non possit; quod quidem multis sit frondibus circum compositis. Verba Macrobij hæc sunt: Colitur apud Lacedæmonios simulachrum Liberi patris, hasta insigne, non Thyrsos: sed cum Thyrsum tenet, quid aliud quam latens telum geritur, cuius mucro hedera lambente protegitur? Et de Thyrsos hæc tenus.

QUANDO QUIDEM autem Alismatis siue Damasonij mentio incidit, non pratermittenda videbatur peregrina quadam planta, quam Damasonium nonnulli esse existimant, cuius iconem nobis communicavit Ioannes Vreccomius Bruxellensis, stirpium herbarumque diligentissimus cultor. Pingitur hæc caule singulari; folijs venosis & Plantaginis similibus; flore verò magno, quatuor foliorum, dilute rubente, è cuius medio, oui forma quiddam intus cavum eminet; radice crassa obliqua, à qua tenues fibræ dependent. Ferunt hanc in vico quodam supra Augustam reperiri, appellarique vulgo *Dapen Schoen* ac Latine Damasonium. Sed & hæc nihil, aut parum admodum, multò certè minus quam Saponaria, cum Alismate, siue Damasonio convenit.

Damasonium notum.

DEPINGIT & Alisma quoddam Matthiolus, sed tamen quod minus quam istud cum vero Alismate conveniat: neque enim ei folium Plantaginis modo nervosum; neque

caulis

caulis *bugosoides*; sed vnicum tantum florem proferens, qui à *bugosoides* differens esse videtur.


PORRO Saponaria, calida quidem & sicca est temperie, facultate autem abstergendi non exigua prædita.

DE AQUILEIA. CAP. XXIII.

AQUILEIA folia fert *Chelidonij maioris*, paulo tamen rotundiora per ambitum incisa, colore in virore carulea, quæ vulnerata nullum, multò minus luteum, succum reddunt: caulem verò cubitalem, tenuem, rubentem, & leniter hirsutum; cuius ala singulos proferunt flores, ex quinque dependentibus concavis veluti corniculis, & totidem intermedijs, sursum erectis parvis foliolis, qui simplices sunt, compositi (multiplices etenim ex pluribus corniculis commisti sunt) colore aliàs cerulei, aliàs in rubro purpurei, aliàs candidi vel ex candido purpurascens, subinde varij & ex caruleo candidoq; permixtis relucens; erumpentibus è medio staminibus, à quibus parvi apices dependent: siliqua post singulos flores quinq; surgunt, in quibus semen paruum, nigrum & splendens: radices subsunt crasse fibrosæ, quæ pluribus annis durant. In Belgij & Gallie hortos infertur: in Germania & alibi, in apricis collibus, syluosis montibus & pinguibus pratis sponte gignitur. Flores Maio & Iunio vigent.

RECENTIORES Aquileiam aut Aquilinam nuncupant: Germani *Agley* & *Ageley*; nostri *Akelepen*. Galli *Ancoiles*, ou *Ancolye*.

QUIBUS autem viribus prædita, nondum satis compertum; nullum siquidem alium vsum habet, quàm quoddam coronas & hortos exornet. *Tragus* tamen semen, drachma pondo cum croci obolo in vino, iocinoris obstructione & morbo



morbo regio laborantibus vtiliter dari scribit; sed eum qui assumpsit diligenter coopertum, sudare deinde oportere. Plarique ei Aegylopiis, alij Centaurij maioris vires, sed temerè & citra omnem rationem tribuunt.

DE ANTIRRHINO. CAP. XXIIII.

ANTIRRHINO caules sunt rotundi, glabri, fragiles, & ramosi: folia multa vt plurimum oblonga & acuminata, Linaria similia sed maiora; subinde breuiora latioraq; & Anagallidis similiora: flores secundum caules superiori parte ordine digesti, forma oblongi, anteriori parte latiores, dum conclusi, vt nascuntur, permanent rana ori quodammodo similes; aperti verò hiantis leonis vinctum referentes; colore roseo rubentes, aut candidi, vel ex candido dilute purpurascens, non raro etiam sublutei; eiu videlicet cuius folia sunt latiora & breuiora: quos deinde capitulum sequitur, oblongum, anteriore parte angustius & foraminosum, narium vituli, aut canini capitis similitudine; in quibus semen paruum & subnigricans: e radicibus non magnis fibra dependent. In hortis apud Belgas, Italos, Germanos, & alibi seritur. Maio mense, quod hyemem superauit, & reliqua deinde aestate, floret: serius verò & sub aestatis finem, eiusdem anni vere, satum. Hyemem autem, nisi clemens admodum fuerit, aut in cellis vinarijs repositum, absque iniuria in Belgio non sustinet.

GRÆCIS ἀντίρρινον ἢ ἀντίρριζον, si nō vitiosum Theophrasti exemplar, & ἀντίρρινον dicitur: Latinus similiter Antirrhinum. Auctore Galeno etiam βουκράκιον & λυχνία ἄγρια, siue Lychnis sylvestris, nominatur. Apuleius etiam ἀμέθυσον, τριήκισον, κυροκεφάλιον, Canis cerebrum, herbam siminiam, Venusiam minorem & Opalim gratam, appellat.



lari refert. Creditur quoque esse Leo herba, quam inter flores Columella lib. 10. refert. sic scribens:

Narcissig, comas, & hiantis saua Leonis

Ora feri.

Item & infra:

Oscitat & Leo.

Gesnerus tamen hunc Leonem, Aquileiam esse existimavit, quam ea de causa Leontostomium nuncupavit: sed hoc nominis Antirrhino magis convenire, quam Aquileia, nobis videtur. Nam illius hians flos, Leonis vultum citius, quam huius, refert.

EST VERO & alius Leo, qui ὄστρολεόν, & leguminum Leo dicitur, alio nomine Orobanche, de quo in Frumentorum historia egimus.

EST & alia Amethystos herba, cuius Plutarchus meminit, καμάκην videlicet: de qua alio loco, in Olerum videlicet agetur historia.

BELGÆ, Antirrhinum, Diant appellant.

CÆTERVM Antirrhini semen inutile in medicina, ut Galenus ait, est. Herba vero ipsa assimilis cum Bubonio facultatis, sed multo minoris.

NARRANT, inquit Dioscorides, appensum veneficij aduersari: & gratiam conciliare, si quis eo perunctus sit cum oleo liliorum, aut Cyprino.

APVLEIVS, radicis in aqua decoctum, sotu epiphorae oculorum, celeriter lenire refert.

DE ANTIRRHINO SYLVESTRI SIVE MINORI. CAP. XXV.

PRÆTER hortense Antirrhinon superiori capite descriptum, & aliud reperitur, tota sua natura sylvestre, quod satiuo & minus, & humilius est, & aliquantulum, sed tamen modicè hirsutum. Cauliculi huic quoque sunt tenues, ramosi:



ramosi: folia oblonga & angusta: flores autem non ad summum caulis, sed iuxta foliola ex ipsorum sinubus exeunt. Antirrhini similes, sed minores, colore rubro purpureo, in medio lutei. Capitula similiter minora & breviora, foraminosa, hominis caluariam propemodum referentia, in quibus semen minutum: radices subsunt tenues. Nasquitur multis Belgij & Germaniæ locis, circa margines, & in ipsis agris, iuxta vias, in hortis, & alibi. Et vno quidem loco procerius ac vegetius; alio brevius & tenerius reperitur. Iulio & Augusto floret, hyeme perit: æstiva enim est herba.

NOSTRI cleyn Diant appellant: Antirrhini autem haud dubiè species est sylvestris. Sunt qui velint Orontium esse, similitudine nominis inducti, cuius decocto Archigenes, apud Galenum κατὰ τόπους lib. 9. auriginosos lauandos consulit. Sed an verè ipsum sit, affirmari non potest, eius descriptione nusquam, nec nomine, alibi quàm hoc loco, extante. Quam etiam ob causam, Ianus Cornarius Orontij vocem deprauatam suspicatus est, & legendum esse, Organum; quod, Dioscoride auctore, in balneo auriginosis prodest.

Phyteuma. PLUS similitudinis Antirrhinum sylvestre cum Phyteuma. teumate habet, quod à Dioscoride, his verbis, lib. 4. describitur. φύτευμα φύλλα ἔχει ὅμοια στρουθίῳ, μικρότερα δὲ καρπὸν πολὺν τετραμήνον ῥίζαν μικράν, λεπτήν, ἐπιπόλαιον. id est, Phyteuma folia habet similia Struthio, sed minora: fructum multum, perforatum, radicem parua, tenuem, terra superficiei inhaerentem. Quæ descriptio Antirrhino sylvestri aptissimè & propriè conuenit. Nam quidem quod ad folia attinet, ea omnino habet Struthij minora: siquidem, vt Plinius ait, Struthium folio est Olea minori; sunt etenim eius folia oleaginis angustiora & minora.

nora. Fructum etiam siue καρπὸν copiosum habet, eumq³ perforatum; quando pro fructu totum illud capitulum, quo semen continetur accipitur, quod non raro, vti & ipsius Antirrhini capitulum, καρπὸς appellatur. De radicibus du- καρπὸς. bitari non potest, quia tales, cuiusmodi Phyteumati tribuuntur, sunt. Quibus de causis Antirrhinon istud sylvestre verum Phyteuma esse apparet. Matthiolus tamen non Antirrhinum istud, quod olim pro legitimo exhibuit, sed Campanulam pro Phyteumate depingit: de qua superius cap. 10. vbi & improbatæ sententiæ Matthiali, & nostri iudicii rationem indicauimus.


PORRO Antirrhinum istud sylvestre nullius quidem est vsus: si autem verum est Phyteuma, ad amores profuerit. Vt etenim auctor est Dioscorides, Phyteuma ad amatoria philtira commodum esse perhibetur.

DE LINARIIS. CAP. XXVI.

ANTIRRHINI species quoque quedam videntur, quas Linarias vulgo nominant.

QVARTVM vna cauliculos habet bicubitales, complures, rotundos, tenues: folia multa, angusta, oblonga, lini folijs similia: flores luteos secundum caules iuxta summum, anteriore quidem parte Antirrhini floribus similes, posteriore verò in caudam siue corniculum quoddam desinentes, floris Regij similitudine; quos sequitur capitulum rotundum, in quo semen nigrum: radix longa, tenuis & alba.

ALTERA species huic caule, folijs & floribus similis est: caulibus tamen ferè longioribus; folijs verò angustioribus; floribus paruis, multoq³ quàm alterius minoribus, in caruleo purpureis, nonnunquam etiam subcandidis aut subluteis; capitulis similiter exiguis, radicibus tenuibus & fibrosis.



Na
 margine
 gionibus
 V.
 is Vimal
 heaut o
 flachy.
 matu d
 fup, ex
 u Italia
 Belved
 E s
 fca tem
 Rho. ot
 ius prou
 deffe, qu
 D
 CA
 aliori, fl
 quaslam
 ta, molla
 bentia : p
 rum mod
 qui in ha
 coloris gr
 succum r
 retent
 mome
 tum, C

NASCITVR prior *Linaria* passim secus agrorum margines, & alijs locis; altera similibus, quibusdam in regionibus exit, sed inuentu rarior. Florent Iulio & Augusto.

VTRAQVE species, *Linaria* nostris dicitur, nonnullis *Vrinalis*. Germanis, *Lynkraut* / *flaschkraut* / *harnkraut* / *onser frauwē flaschz* / *waldr flaschz* / *krootten flaschz*. Belgis *wilt blas*; Gallis, *Lin sauage*. Existimatur à multis esse *Osyris*: sed *Osyris* ab hac differens est stirps, ex qua videlicet *αὐρίματα*, hoc est, scopas hac ætate, in Italia componunt: vt & olim Galeni seculo; quam vulgo *Belvedere* nuncupant.

EST autem *Linaria* calida quidem & aliquantulum sicca temperie, & aperiendi potentia pradita; nam, vt & *Rhizotomi* nostri temporis existimant, *vrinas* decoctum eius prouocat. Addunt multi, Regio morbo laborantibus prodesse; quod ab *Osyride* huc translatus est.

DE AMARANTO PURPUREO.

CAP. XXVII.

CAYLE *Amarantus purpureus* surgit cubitali, vel altiori, striato, iuxta radicem subinde rubente, leui, in alas quasdam diuiso; circa quem folia oblonga, lata, acuminata, mollia, glabra, colore virentia, aut in virore nonnihil rubentia: pro floribus exeunt spicae, aspectu gratissima, ceterum inodora, in purpura splendentes, coccum saturatum qui in holoserico villosio micat, referentes, ac quodammodo coloris gratia superantes; quæ in attritu similem ferè colore succum reddunt, & decerpta diutine pulchritudinem suam retinent, aliquot etiam annis non marcescentes; vnde & nomen inuenit: Semen maturatis spicis insidet paruum, nigrum, & multum splendens: Radices breues & fibrosæ.



D
Mirum
Alexand
postque
ar, & h
Auc
nostra a
chrysi, q
suo loco
Floam
de Flo
rum Ruo
cinem
erat.
Est
de crass
salsis fin
leri admo
sed prior
quinino e
Pr
Autem
quo in O
Re
de precip
in pectus
tribum
et solv
na sang
re, quor
piment
nulla pro
de vari

Mirum in eo, Plinius ait, gaudere decerpi, & letius renasci. Alexandrino palma est, qui decerptus asseruatur. Mirumq; postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit.

Ἀμαράντος quoniam non marcescat, Plinius appellat: nostra etas, Amarantum purpureum, ad differentiam Elichrysi, quod similiter ἐλικάριον dicitur, de quo inferius suo loco: Germanicè Samatblumen / dauilentschoon / Flozamor: Nostrate dialecto, Floutweelbloemen. Italicè Fior velluto. Gallicè Passe velours, Passuelutum Ruellius reddit, quo nomine holosericum villosum coccineum Galli nuncupant, cum quo de coloris principatu certat.

EST verò & alia huius species, caule multo proceriore & crassiore, quatuor aut quinque cubitorum vel altiore: folijs similiter maioribus; cui spicae sunt longiores, sed obsoleti admodum ruboris. Seritur vterq; Amarantus in hortis, sed prior frequentius. Alter enim Amarantus nullam vel omnino exiguam gratiam obtinet.

PROVENIUNT spicae Augusto mense, durant in Autumnum. Inspidum vtrumq; olus est, & Bliti species, de quo in Olerum historia, vbi illi sua reddentur vires.

RECENTIORVM plarique Amaranto purpureo, & precipuè primo, adstringendi cum frigiditate & siccitate potentiam, sanguinisq; omnem fluorem sistendi vires attribunt; quas tamen ei inesse nulla qualitas ostendit, praeter solum fortè colorem, quo spicae rubent. Nam rubra omnia sanguinem vndequaq; fluentem cohibere ac suppressere, quorundam est opinio; eo quòd quadam sanguinem suppressimentia, talia colore sint. Sed hac opinio vti vana est, ita nullis probabilibus rationibus innititur. Ex coloribus etenim de viribus simplicium & medicamentorum, certi nihil colligere

ligere licet: vt Galenus lib. de simpl. medica. faculta. primo & quarto dilucidè ostendit. Sunt siquidem pleraque rubra etiam calida & aperientia, vti Rubia rubicunda radix, quæ & sanguinem per vrinas & menses ducit. Qua de causa & perperam ratiocinantur, qui Amarantum purpureum, sanguinem suppressere, cæliacos & dysentericos adiuuare, ex solo colore iudicant.

DE ROSIS. CAP. XXVIII.

ROSARVM stirps tamen si fruticosa & spinosa sit, consentaneum tamen & decēs magis est, eam floribus iungere, quàm spinosis fruticibus sociare: principatum siquidem inter flores omnes Rosa facillè obtinet, eiusq; in coronis omnibus vsus propè nimius est; & vt ex Anacreonte Teio, Poëta Græco vetustissimo, Henricus Stephanus perquam eleganti carmine Latino reddidit:

Rosa, honor decusq; florum.

Rosa, cura amorq; Veris.

Rosa, calitum est voluptas.

Roseis puer Cytheres

Caput implicat coronis,

Charitum choros frequentans.

SUNT autem Rosa genere quidem permultæ, aut stirpis ipsius magnitudine, asperitate, leuitate, aut floris foliorum multitudine, paucitate, vel colore odoreq; differentes. Nonnulla siquidem procera & excelsa, alia breues & humiles: folia quibusdam quina, alijs duodena, viciatim aut plura. Theophrastus etiam ἐκαστὴν ἀφύλλαν, siue centifoliam quandam, circa Philippos exire refert: quam incolæ ex Pangeo transferentes serunt: & in Campania, Plinius. Colore item hæc quidem rubentes, illa verò candida: odorata etiam



etiam quàm plurima, absque odore nonnulla. Harum omnium quædam sativa & hortenses sunt; alia verò sylvestres.

RAMI aut potius virga omnibus dura, lignosa, mordacibus aculeis horrentes; & sylvestribus quidem spinosiores: folia aspera, per ambitum serrata, ex quinque aut septem ex vno nervo coherentibus: flores è cauliculis fastigii exeunt, primum herbaceo inclusi calyci, qui tumescens in virides alabastris fastigiatur, quibus paulatim debiscens flos panditur, in calycis sui medio, stamina quædam capillacea, luteosque complexus apices: semen in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt per maturitatem rubentibus, gignitur durum, lanugine inuolutum: radices dura, lignosa in diuersa tendunt.

¹ IN sativarum censu, vna proceritate caulium sue ramorum, reliquas superat: crassius enim & lignosius suis virgis ad 10. vel 12. pedes, aut etiam altius conscendit: flores candidi, odorati & multorum foliorum, quorum interiora minora; exteriora verò maiora & ampliora.

² PROXIMA magnitudine, virgas habet breviores, sed non minus asperas, Rosas odore suaves, sed ditute & pallide rubentes: Incarnatas Itali appellant.

³ TERTIA huic similis ramis & folijs est, sed subinde brevior, flore verò odoratissimo pulcherrimoque, saturato, & quodammodo puniceo rubore nitente; Rosarum omnium præstantissima, & ad medicamentâ omnis ferè generis utilisima.

⁴ QUARTA brevior est, virgis bicubitalibus aut altioribus, flore eleganter quidem rubente, sed minus quàm tertia, & quandoque simplici, quinque tantummodo foliorum; aliàs plurium: aliquando etiam multiplici; odore grato & perquàm iucundo.

QVINTA



5 QUINTA Rosarum hortensis species, ramis & virgis sylvestrem Caninam Rosam quodammodo refert. Rosas profert paruas plures simul coherentes, vt plurimum simplices, aliquando sed raro multiplices: odore admodum fragranti suauissimas, & moschum proximè referentes: vnde & Rosa Moschetta ab Herruscis appellantur.

6 SYLVESTRIVM ea quidem quæ Canina Rosa vulgo dicitur, & Belgio familiarissima est, aculeatis virgis, & asperis folijs, satiuus similis est; singulis tamen minoribus: flos simplex quinque folia non excedens, albicans, aut ex albido colore purpurascens. Adnascitur huius virgis aliquando pilula quedam hirsuta, echino Castanea quasi similis, at mollis, quam Spongiolam Rose nuncupant.

7 HVC similis est, & alia species, verum tamen aliquantulo minor, cuius virgæ subrubente cortice vestiuntur; flores pallide rubent, non in totum absque odore: Cinamomina Rosa à quibusdam dicitur.

8 INTER sylvestres etiam quedam lutei coloris Rosas fert.

9 EST & parua quedam humillima, virgis spinosissimis: folijs minimis, Rosis perquam exiguis, candidis & suauiter odoratis.

10 IAM & sylvestris quedam folijs reperitur odoratis: hæc proceritate sylvestres omnes sæpè superat. Virgas habet duras, crassas & lignosas: folia splendentia & pulchrè virentia, odore gratissima: Rosas verò paruulas quinquefolias, frequentissimè albicantes, raro purpurascens, exigui aut nullius odoris: fructum oblongum, colore subrubentem, nucleo parua Oliua, & Rosarum aliarum capitulis similem, sed minorem quàm hortensium, in quibus lanosi flocci atque inter eos semen conditum, paruum, & durum. Reperiuntur verò & circa huius tenues virgas, rotundæ, molles & hir-

& hirsuta spongiola, tales omnino, quales circa Caninæ Rosæ spinas nascuntur. Et totidem quidem Rosarum generis nostra ætas adinuenit.

SUNT verò & apud Plinium lib. 21. cap. 4. multa & plurima suis appellata cognominibus, sed non omnia in rubo, hoc est, spinoso frutice, nata: (nam & ex Maluis flores in Rosarum censu numerantur) quorum quedam cum nostris generibus conuenire, verisimile est; non tamen omnia. Genera eius, nostri, inquit fecere celeberrima, Prænestinam & Campanam. Addidere alij Milesiam, cuius sit ardentissimus colos, non excedentis duodena folia: Proximam ei Trachiniam minus rubentem: mox Alabandicam viliores, albicantibus folijs. Vilissimam verò plurimis; sed minutissimis, spineolam. Deinde paulo infra. Est & quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec vnquam excedens quinque folia, Viola magnitudine, odore nullo. Est & alia Gracula appellata, conuolutis foliorum paniculis, nec dehiscens nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimis folijs. Alia funditur è caule maluaceo, folia oleracea habens, Moscenton vocant. Atque inter has media magnitudine, Autumnalis, quam Coroneolam vocant. Omnes sine odore, præter Coroneolam, & in rubo natam.

SERVNTUR & plantantur Rosæ quidem mitiores & satiuæ apud Belgas, Germanos, Gallos, & alibi, in hortis. Syluestres multis locis sponte exeunt: & inter has quidem prima, passim circa scrobes, fossas, ad margines agrorum & pratorum; locis humidis prouenit. Lutea in Africa & Aegypto, quam plerique in hortis nunc habent, vii & Cinamominam. Minima spinosissima & asperrima, locis gignitur maritimis, frequens in Morinorum finibus, iuxta Icium portum, in arenosis maris aggeribus. Sed odorata syl- 10

uestris Rosa hortensis est, nec vsquam in Gallia aut Belgio, quod sciamus, sponte exit.

SERI autem Rosa, vti Plinius ait, nec pinguibus vult, nec argillofis, nec riguis, contenta raris, proprieq; rudera-
tum agrum amat: omnis, locis siccis quam humidis odora-
rior. Refert & cali temperies; quibusdam enim annis, mi-
nus odorata prouenit. Theophrastus odoris colorisq; prae-
stantiam locorum etiam ratione contingere affirmat: & odora-
tissimas Rosas, quae apud Cyrenen nascuntur; & proinde
vnguentum iucundissimum illic fieri.

NASCITVR verd Rosa ex semine: sed quoniam tar-
de perficitur, conciso caule seritur. Omnis recisione & vsti-
one proficit, floremq; melius profert; relictâ namq; excre-
scit & syluescit. Sapius eam transferre vtile est: sic enim pul-
chriorem Rosam effundi affirmant: Theophrastus & Plinius
auctores.

SERENDARVM autem Rosarum modum, Palla-
dius ostendit. Si indigus plantarum, ait, volueris ex paucis
virgulis habere copiosa rosaria, quaternorū digitorum sur-
culos gemmantes cum geniculis suis debebis excidere, & in
modum propaginis sternere, & stercore ac rigationibus ad-
iuuare. vbi anni aetatem compleuerint, pedis spacio inter se
transferre disinctos, atque ita solum, quod huic generi de-
putabis, implere.

FLORENT Rosae; quaedam citius, aliae serius, omnes
Maio aut initio Iunij mensis. Praecoces Cinamomina, &
alia quaedam syluestres: seriores satius sunt. Moschettæ
mense Augusto etiam secundo florent. Theophrastus, si au-
tumnus prolixior fuerit, Rosas etiam denno erumpere posse
testatur.

ROSA Græcis ῥόδον appellatur. Stirps verd ipsa Ro-
sarum ῥοδάνα, quae apud Latinos idem cum flore nomen
retinet.

retinet. Dicitur autem ῥόδον, ut Plutarchus ait, ὅτε ῥεύμα
 πρὸν τῆς ὀσμῆς ἐκίνοι, quoddam largū odoris effluviū emittat.

MEDIUM floris Rosarum, lutea videlicet stamina
 & apices, ἀνθος τῶν ῥόδων, & flos Rosa dicitur; officinis
 Anthera.

FOLIORVM ipsius floris partes candida, quibus caly-
 cybus inferuntur, ὀνυχες, & ungues appellantur.

CALYX vocatur, qui stamina & floris foliola com-
 plectitur ac continet.

ALABAstri verò sunt calycis partes laciniöse, co-
 num floris priusquam panditur complectentes; quae quin-
 que sunt; dua barbatula, dua imberbes, & quinta partim
 barbata, partim minime; cortices Rosarum à plarisque
 appellantur.

Κεφάλαι καὶ κεφάλια dicuntur capitula, in quibus se-
 men gignitur, quae scilicet floribus & calycibus subsunt.

VIRGAS stirpis Rosarum, Strabus Gallus in hortulo
 suo, Viburna nominat, sic scribens:

Viburnum

Iam nisi me fessum via longior indupediret,

Scrupeus atque noui tereretur carminis ordo,

Debueram Viburna Rosae pretiosa metallo

Paetoli, & niueis Arabum circumdare gemmis.

Vergilius tamen & Aurelius Nemesianus, viburnum fru-
 ticem aliquem sui generis innuunt, paruum, humilem, len-
 tum & obsequiosum. Ille quidem ecloga prima urbem
 commendans Romam:

Verum hac tantum alias inter caput extulit vrbes,

Quantum lenta solent inter Viburna Cupressi.

Nemesianus verò ecloga secunda, his carminibus:

Nos quoque te propter Donace donabimur vrbi,

Si modò coniferas inter Viburna Cupressos,

Aut inter Pinos Corylum frondescere fas est.

- 1 IN satiuarum Rosarum numero primam, vulgo Rosam albam; Belgæ, Witte Roosen: Germani weiß Rosen: Galli, blanche Rose appellant. Potest hæc Plinij spineola Rosa esse, si modò Campana Rosa non est.
- 2 ALTERA, quam incarnatam Rosam Italia nuncupat, Alabandica similis est: Germani, Liebfarbige Roosen.
- 3 TERTIA, Prouincialis Gallis dicitur: hanc, Milesiam esse, non temerè suspicari licet.
- 4 QUARTAM, Rosas Franchas Gallia, Plinius Trachiniam sortè aut Prænestinam dixerit.
- 5 QUINTA, Moschata, ab odore, vt diximus, moschi dicta, Coroneola esse potest. Coroneola enim autumnalis est Plinio. Damascenam autem & hanc nonnulli appellant: Itali Rosam moschettam: Galli, Roses musquées ou muscadelles: Belgæ, Musket Roosen.
- 6 SYLVESTRIS Rosa, Germanis wilder Rosen/heckrosen: Brabantis, wilde Roosen: Gallis, Roses sauvages: Plinio lib. 8. & 25. κυρόδος ἢ κυρόδα est, id est, Rosa Canina: nonnullis etiam Canina sentis.
 Quæ verò circa ramulos & virgas huius Cynorhodi hirsuta pilula reperiuntur, spongiola sylvestris Rosa aptissimè & propriissimè dicta sunt: Officinæ perperam Bedeguar appellarunt. Nam Bedeguar Arabibus Cardui species, quæ Græcis ἀνάρδα λευκή, hoc est, spina alba.
- 7 ALIÆ sylvestres Rosa, Cynorhodi etiam species quædam sunt; cum ea, quam Cancel rooskens/ id est, Cinamoninam Rosam Belgæ appellarūt; tum & lutea Africana; nec non minima, nostris Dupnrooskens/ hoc est, Duncensis Rosa dicta, ab arenosis sponte natis aggeribus mari oppositis, quos vulgo Duncen nominant.
- 10 EST verò & Cynorhodi suæ Canina Rosa, sed odorata species,

species, quam nostri Eglantier/aut Aglantier; Galli, Englenterium, Ruellio teste, nominant: qui & hanc syluestrem Rosam, Cynosbaton, siue Canirubum esse suspicantur. De quo Dioscorides his verbis: κυνόβατον, οὗ δὲ ὀξύανθον καλοῦσι. θάμνος ἐστὶ βέβητον πολλῶ μείζων, δένδρῳδης, φύλλα φέρει πολλῶ πλατύτερα μυρσίνης. ἀκάνθας δὲ περὶ ταῖς ῥάβδοις ἰσχυράς· ἄνθος λευκὸν· καρπὸν ἐπιμήκη, πυρρὴν ἐλαίαν εὐοκίαν, ἐν τῷ πεπαίνεισθαι πυρρὸν· τὰ δὲ ἐν τῷ ἐξηώδῃ. Id est, Cynosbatus, siue Canirubus, quem aliqui Oxycantham vocant, frutex est Rubo longè maior, arborescens, folia fert latiora myrto: spinas circa ramos robustas: florem candidum: fructum oblongum, nucleo Oliuæ similem, per maturitatem fulvum, interius lanuginosum.

ΕΧΤΑΤ & Cynosbati apud Theophrastum huiusmodi descriptio: τὸ δὲ κυνόβατον, τὸν καρπὸν ὑπέρευθρον ἔχει, καὶ παραπλήσιον τῷ τῆς ῥόας, ἔστι δὲ δένδρου καὶ θάμνου μεταξὺ καὶ παρόμοιον ταῖς ῥόαις, τὸ δὲ φύλλον ἀγλῶδες. (Exemplar vulgare ἀγλῶδες habet, sed Athenæus ex Theophrasto ἀγλῶδες rectius legit) hoc est; Cynosbaton fructum subrubentem habet, & malo Punico similem: est inter arborem & fruticem medium, veluti malus Punica: folium autem splendens.

CUM harum descriptionum utraque, non malè Canina Rosa odorata conuenire videtur. Nam frutex est Rubo maior, caudices siue virgas habet crassas lignosas, uti malus punica, vel alia lignosa & arborescens quadam stirps, aculeis & spinis duris munitas: folium eius non quidè integrum, sed vnam aliquod singulare, totius folij pars, Myrti folijs latius est, superioreq; parte laue & splendens: fructus nucleo oliuæ similis, qui vbi maturus est, colore est rubente, lanosos floccos & semen intus habens. Quæ omnia huius syluestris & odoratæ Rosæ, cum Cynobato similitudinem ostendunt.

Theophrasti locus restitutus.

Plinij lo-
cus emen-
datus.

EST verò & alius Cynosbatus, quem Plinius lib. 24. cap. 14. describit, quem alij Cynospaston, (Cornarius ex veteri exemplari Cynapauxin legit) alij Neuropaston vocant: foliū habet vestigio hominis simile. Fert & vnam nigram, in cuius acino neruum habet; vnde Neuropastos dicitur. Sed huic Cynosbato, syluestris odorata (si modò legitima & non corrupta est descriptio) nequaquam similis est, veluti neque Cappari, nec Smilaci aspera, quarum vtraque etiam Cynosbatos à nonnullis appellatur.

SED ad Rosas reuertamur; quarum florum foliola, quia ex diuersis partibus constant, dissimiles etiam facultates obtinent. Insunt etenim eis terrestres quædam & adstrigentes; alia humida & aquea: nonnulla spirituosæ & æreæ partes; quæ tamen in singulis non similiter se habent. In vno siquidem genere hæ: in alio illa excellent. Prædominantem autem omnes frigidam habent temperiem, proximam tamen temperiei mediæ, ex primò videlicet ordine refrigerantium.

SUPERANT humida, æreæ & spirituosæ partes, in candidis, dilutè rubentibus, nec non in Damascenis siue Moschatis: quas viribus præstantiores Matthiolus tradit; vtpote cuius etiam folia viginti, aluum subducant sumpta. Ex tribus his liquor, ea de causa, elicitur gratissimè ac suauissimè odoris, qui ferè ex alijs Rosis inodorus est.

VTILIS autem Rosarum hæc stillatitia aqua, cum ad cordis roborationem & spirituum reparationem, tum etiam ad omnia quæ clementer refrigerari postulant. tragematis, placentis, condimentis & alijs, quæ voluptatis excitanda gratia consiciuntur multis, eadem admixta, saporis gratiam conciliat: oculorum calidos dolores mitigat: somnum conciliat: quem & ipsæ virètes Rosæ, odore suo suauiter prouocant.

SVCCVS Rosarum præsertim dilutè rubentium, &

vi non-

ut nonnulli etiam aiunt, saturata purpura nitetium, aluum lenit & subducit.

Idem præstat earundem dilutum, & quod ex eo coquitur Drosatum siue Serapium; officina syrupum rosatum solutivum nuncupant, quod ex infuso siue diluto apparari debet, in quo pluries Rosarum virentium folia multa macerata sunt. Ad leniendam autem siue subducendam aluum utile, quando expurgatione alia potentiori, aut opus non est, aut vti non expedit. Nam præter ea quæ in intestinis herent excrementa, aut in proximis & primis venis cruda, pituitosa & subinde biliosa, alia non educit; si non alijs quibusdam potentioribus medicamentis permisceatur. Humectat autem & refrigerat Serapium istud: ideo etiam febrium ardentium calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat; sitim extinguit: debili autem & humido ventriculo parum utile, nam eum laxiorem debilioremque relinquit.

In rubentibus Rosis, quæ passim sunt vulgares, & alijs saturata purpureæ, quas Prouinciales appellant, plus est terreæ substantiæ, & resiccantis adstringentisque facultatis, non tamen absque humido quodam permixto; quod quidem ipsis adhuc virentibus inest: in resiccatis verò deperditum est. Succus hac de causa, & dilutum earum, ad aluum subducendam quoque facit; minus tamen quam aliarum prædictarum.

RESICCATÆ autem hæ Rosæ, humiditate iam absumpta, adstringunt & resiccant: refrigerant quoque, sed minus quam virentes: robur cordi conciliant, ac tremori, & palpitationi eius succurrunt: hepar, renes, & alia viscera debilia confirmant: ventriculum flaccidum, debilem & humidum, siccant & corroborant: fluorem muliebrem & superfluum menstruorum purgationem compescunt; sanguinis

unde quaque eruptiones sistunt: sudores reprimunt: aluum nimio fluore laxam, constringunt: antidoti omnibus vtiliter admiscuntur, & alijs quoque medicamentis, siue foris adhibendis, siue intra corpus assumendis, quibus adstringens ac corroborans aliquod vtiliter accedit.

QVOD ex ipsis sit Rhodomeli, vulneribus, vlceribus, eruptionibus, ac in vniuersum omnibus, quæ abstergi & reficcari possulant, longè vtilissimum est.

OLEVM calores omnes sedat, & inflammationes prohibet, aut iam incipientes mitigat.

FLORES Rosarum, lutea videlicet stamina & apices, reficcant similiter & adstringunt, & potentius quidem, quàm ipsarum Rosarum foliola. Idem possunt calyces & alabastris: sed cum his omnibus odor desit, minus vtilia sunt, humaneq; natura minus amica.

CAPITA Rosarum, Plinio auctore, sanguinem etiam & ventrem sistunt: vngues, epiphoris salubres sunt.

RADIX sylvestris Rosæ ad morsum Canis rabidi vnicum remedium, oraculo repertum: vti idem lib. 8. cap. 41. scribit.

SPONGIOLÆ, quæ in medijs eius spinis nascitur, cinere cum melle, Alopecias capitis expleri, idem ait, lib. 25. cap. 2.

FVCHSIVS, spongiolas & capitula sylvestris Rosæ, contra calculum & vrina difficultates valere affirmat; si in puluerem trita exhibeantur. Prodesse autem possunt non vt diuretica, aut calculum atterentia; sed veluti alia quedam adstringentia, debiles renes confirmantia: quæ calculosis non raro vtiliora sunt, quàm multa, præsertim potenter, diuretica. Nam talium diureticorum frequētiori aut nimio vsu, & renes multum debilitari & sæpe super calefieri contingit; & calculos non modò non comminui, atteri, aut ex-

pellī,

pellī, sed copiosiores & duriores frequenter generari. Quod etenim in sanguine tenue, aqueum & serosum est, segregant: quod vero crassius, cogunt, ac indurari diuretica fortiora faciunt: & similiter etiam alia, frequentiori usu.


DE CISTO. CAP. XXIX.

ROSARVM species & Cistus nonnullis videtur. Eius duo veteres genera fecere; marem & feminam, præter tertium Ledum dictum.

UTRQUE frutex est lignosus, multis alis ramosus; sed tamen humilis, nec admodum procerus, & virgis tenuibus: folia eis sunt lata, aliquantulum rugosa & lanuginosa, propemodum subalbicantia, hortensis aut alterius Salvia folijs modo quodam similia: flores in summo virgularum, veluti parvæ sylvestres Rosæ, fugaces tamen & citò pereuntes; colore mari quidem, in caruleo pene subrubentes, aut purpurei: feminæ verò candidi: capitula inde rotundiuscula, in quibus semen paruum: radices lignosæ, fissæ, in diversa tendentes.

EXIT subinde sub ipso frutice ad radices, Limodori Hypocistis quoddam genus, crassum, pingue, carnosum, succo plenum, sine folijs, ex multis veluti Hyosciami vtriculis, aut mali Punica cytinis totum constans: colore in vno genere πυρρόν siue ruffo: in altero candido, in quodam etiam χλωρόν, siue virenti, aut herbaceo: vt Dioscorides ait.

NASCITVR Cistus in Italia, Hispania, Narbonensi Gallia, ac in alijs multis calidioribus Europæ prouincijs, aridis & saxosis locis: & in vna quidem regione crebrioribus folijs, in alijs rarioribus, alibi candidioribus mollioribusq; in plarisque minus candidis, minusq; pilosis. Mu-



ratione
quoque
ad
a quibus
feri. E
quoniam
qui etiam
cum hy
das ro
FAC
strenu
tum: a
Falsa
gunt, q
cates, a
tates, su
illu, p
vires, q
ambusti
HY
remediu
tiones,
tus. Q
piscula
non seg
maia ad
rum quo

rationem enim aliquam, pro regionum diuersitate Cistus quoque recipit. Floret æstiuis mensibus.

Κίστον ἢ κίστον Græci appellant, nonnulli κίσταρον, alij κίσταρον. Latinis similiter Cistus, & Rosa siluatica dicitur, à quibusdam etiam Rosa Canina, vt Scribonius Largus refert. E radicibus exiens limodorum, ὑποκιστὶς vocatur; quoniam sub Cisto proueniat. A nonnullis ῥόδονδρον, aut ὀρόδονδρον. Ab alijs κόντιος, inter quos Paulus est Aegineta; qui etiam non illud, quod Cisto subnascitur, sed huius succum hypochistida appellat: vnde manasse potest hypoquistidos vox, qua officina succum hunc barbarè nominant.

FACULTATE porro Cistus, vt Galenus ait, non instrennuè desiccatur, secundi propemodum ordinis resiccantium: adeo verò frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps. Folia & prima germina trita tantum desiccant, adstringuntq; vt vlcera glutinare valeant. Flores magis sunt efficaces, adeo vt cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanent: cataplasmatibus modo illita, putredinosa ipsorum vlcerum iuuant. Dioscorides, ρομάς, id est, vlcera depascentia illitu cohibere, & cum cera ambustis, veteribusq; vlceribus mederi tradit.

HYPOCISTIS multo magis adstrictoria est, efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, vt sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, caliacos, dysentericosq; affectus. Quin si partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sanè stomachicis, hepaticisq; epithematis admiscetur; & ex viperis Theriaca inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret: Galenus.

CISTVS Ledon, frutex est parvus Cisto asimilis, sed folijs longioribus, nigrioribus, & glutinosis: flores parui exiguis rosis persimiles, colore candidi. Contrahunt folia pingue quoddam resinofum & odoratum, & tempore quidem, vt Dioscorides ait, vernali; sed, vt Petrus Bellonius, ἀντόπλιν, in medijs aestatis & Canicularium dierum ardentissimis feruoribus: quod non absque singulari cura & diligentia, nec minori industria, ab ipsis stirpibus nostra etate colligitur: non ex caprarum aut hircorum barbis vilisue depectitur, collectum colatur, & in massas formatum in medicina vsus reconditur. In Creta insula, eodem Bellonio teste, passum locus incultus Ledon exit: reperitur & in Cypro, Plinio auctore.

Λήδον ἢ λᾶδον ipse frutex dicitur, & Cisti species est. Pingue verò quod ex folijs colligitur λᾶδανον ἢ λήδαρον: Latini Græcas voces seruant: officina corruptè Lapdanum enunciant. Maxime probatur Dioscoridi odoratum, ὑπέρχλωρον, siue subuiride, facile mollescens, pingue, non arenosum, nec citò fragile, sed resinofum.

PRIMO excessu completo calidum est; Galenus inquit, habens etiam adstrictionis paululum: ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, pariterq; moderatè digerens, ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad vteri vitia conueniat, quandoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet: quocirca etiam defluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum prauum humoris resederit, id omne absumit; tum meatus quibus infixi sunt, contrahit.

VIM habet, Dioscorides ait, adstringentem, calfacientem,

tem, mollientem, aperientem: defluos capillos continet, cum vino, myrrha, & oleo myrtino admixtum: cicatrices pulchriores efficit cum vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eijcit: duritias vteri pectus immixtum curat. Medicamentis dolorem sopientibus, aduersus tussim facientibus, & malagmatis vtiliter admiscetur. Aluum sistit, cum vino vetere potum: & vinam cit.

REPERITVR porro Ledo similis quadam, sed minor Flos Solis. stirps, subinde, nisi pedamentis quibusdam fulciatur, quasi repens: cauliculi ei sunt numerosi tenues & graciles: folia oblonga, Ledi minora, carnosae, leniter hirsuta, quibus lentus inest succus: flores exigui, veluti paruula quadam Rosa, sed minores: pares forma & magnitudine Argentinae, siue Potentillae dictae, floribus; colore lutei aut candidi: radices tenues, lignosae, rufescentes. Nascitur asperis, siccis & apricis, tam campestribus quam montanis locis. Aestiuus mensibus floret.

TRAGVS Germanicè Heyden ylop & feld ylop appellat: plerique Latine Gratiam Dei. Est tamen & alia herba Gratiola à recentioribus dicta. Valerius Cordus Helianthemum & Solis florem nominat.

PLINIUS Helianthen tradit, in Temiscyra regione, Helianthe. & Cilicia montibus prouenire maritimis, folio Myrti. Hac cum adipe Leonino decocta, addito croco & Palneo vino perungi Magos, & Persarum Reges, ut fiat corpus aspectu iucundum: ideo eandem, Heliocalliden nominari. Quae si eadem cum isto Solis flore sit, an diuersa, nemo facile in tanta Plinij breuitate explicauerit. Matthiolus, Helianthemum siue Solis florem, à quibusdam Panaces Chiromum existimari refert, verum cum eo similitudinis habet nihil.

VVLNERA autem, eodem auctore, glutinat: sanguinem


nem manantem sistit: ad cruenta sputa, dysenteriam, mentium redundantiam utilis: oris & pudendorum ulcera vinum decoctionis eius ablutione sanat. In summa, agglutinat, cohibet, & corroborat. Quæ satis ostendunt cum Cisto, & præsertim Ledo, non modo forma, sed & viribus ac facultatibus conuenire. Proinde Cisti & Ledi, hyluestrem quandam speciem esse.

DE PÆONIA. CAP. XXXI.

1 PÆONIÆ tres sunt: mascula vna, femina duæ.

MASCULÆ Pæonia caules, & foliorum pediculi rubent: folia lata ex pluribus commissa, nucis iuglandis folijs ferè similia, nisi quod iuglandis ex septem aut nouem particularibus, simul ad vnum neruum aut pæxv, coherentibus constent; Pæonia verò, ex quinque solum, & subinde ex tribus tantum committantur: flores in summo caulium veluti magna Rosa in purpura rubent; staminibus in medio purpureis, ex quibus lutei dependent apices: siliquæ foris lanuginosæ, quæ per maturitatem sponte debiscunt; semen in his nigrum, rotundum, ochri ferè magnitudine; & grana quadam coccineo colore splendentia: radices subsunt longæ, crassæ, altè descendentes, subinde bifidæ, aut trifidæ, intus candidæ & odoratæ.

2 PRIORIS femina caules parum aut nihil rubent: folia incondita, hypselini, quod à Theophrasto Smyrnon appellatur, ferè modo laciniata, & singularia angustiora quàm maris, superna parte virentiora, inferiore albicantiora: flores vt mascula Pæonia, colore altàs pulchrè, aliàs dilutè rubètes: semen in siliquis Amygdalis similibus, etiam simile: radices verò differentes & aliæ: non vna etenim huic est radix, sed ab vno capite multæ descendunt glandulosæ radices,



radices, veri Asphodeli radicibus similes, sed multo crassiores & longiores; a quibus saepe alia dua aut tres procedunt, eiusdem omnino formæ.

3 ALTERA femina caules habet & folia similia, folia tamen minus incondita, & in virore candidiora, auersaq; parte etiam albidiora: flores minores, dilutius rubentes: radices quoque glandulosas, sed singulas multo longiores ac tenuiores. Hanc Plinius pro mare habuisse videtur: nam radices ei plures, & singula palmo longiores ac candida, quales mari ipse tribuit. Femina, inquit, existimatur, cuius radicibus seu balani longiores, circa octo aut sex adherent: mas plures habet, quoniam non vna radice nixus est, palmi altitudine, candidaq;. Posset verò & hac Peonia femina species altera, Dioscoridis quoque mascula existimari, si non folium mari nucis iuglandis, & radicem vnicam esse scripsisset. Nam mari suo talem ferè radicem tribuit, qualis est tertia Peonia vna aliqua, ab ipsis radicibus, quæ pluribus singularibus constant, auulsa. Sed tamen ex eo quod Peonia mari, folia βασιλική κερύρα, id est nuci regia similia esse prodiderit, & radicem vnā numero singulari, non septem aut octo, vti feminam habere ait, ostendit se non hanc tertiam, sed primam, marem appellauisse: quæ nempe nucis Iuglandis sue Regiæ, habet folia, & radice est vnica. Plinius etiam, femina folia Myrrham redolere ait: sed suspicio euident est, ἀντὶ τοῦ σμυρνίου, σμύρναν eum accepisse; aut pro σμυρνίῃ, Myrrham parum rectè reddidisse.

Plinij oscitantia.

NASCITVR Peonia, vt Dioscorides scriptum reliquit, in altis & præruptis montibus: Plinius verò, in opacis montibus, & alio loco in syluis, ait: in Creta & Sicilia montibus Apuleius: Gesnerus in Generoso dicto Heluetia monte reperiri, audiuerat: apud Belgas & alibi hac ætate in hortis habetur, & vulgatissima quidem, femina prior; altera deinde:



deinde : mascula rarissima est. Florent omnes mense Maio, semen Iulio ad maturitatem peruenit.

ΓΡΑΕCΙS παύνια ἢ γλυκύσιδν : & à nonnullis πεν-
τόβορον ; Latinis similiter, Paonia & dulcissida dicitur. Offi-
cinis Pionia ; Germanis Peonien blumen / Peonien
rosen / Bichtwurtz / Kunigblum / Pfingstrosenz
Belgis ferè, Pioenien : Flandris tamen, Pastbloemen.
Gallis, Piuoiné : Hispanis, Rosa del monte . Habet verò
& alia multa nomina, inter nothas voces reiecta, quae par-
tim etiam apud Apuleium reperiuntur, ut sunt : ὀροβόριον,
ὀροβάξ, αἰμαίωρον, παισιάδν, μιννογένειον, μήνιον, πανδι-
κέρματος, ἰδαῖος δάκτυλος, ἀγλαοφωτῖς, θεοδόνιον, σεληνιον,
σεληνόγονον, διχόμενιον, Rosa fatuina, herba casta. Meno-
genion autem, Menion, Selenion, Selenogonion, Dichome-
nion, ἀπὸ τῆς μῆνης, ἢ σελήνης, nomina deriuantur ; qua-
rum utraque vox Latinis Lunam significat . Lunaris verò
sive Lunaria Paonia appellari potest : quòd Comitiali mor-
bo laborantibus, quos Lunaticos plerique appellant, auxi-
lietur. Idei dactyli appellatio, femina conuenit, cuius glan-
dulosae radices dactylos ideos referunt. Sunt autem idei da-
ctyli, gemma quaedam forma humani pollicis, in Creta in-
sula nascentes. Aglaophotis, id est lucidè splendens, Paonia
dicitur, à granis cocci colore splendentibus.


Aglaopho-
tis.

ΑΓΛΑΟΦΟΤΙΔΕS autem duae, apud Aelianum
lib. 14. descriptae reperiuntur : vna marina, cap. 24. altera
terrestri, cap. 27.

¹ MARINA, fuci species est, quae in profundis nascitur
petris, magnitudine Myrica, fructu Papaueris, qui aestiuo
solis irio dehiscens, noctu igneum quandam, & veluti scin-
tillantem splendorem emittit.

² TERRESTREM, quae alio nomine Cynospastus di-
citur, per diem, ait, inter ceteras herbas delitescere, nec
vllò

PAEONIA FOEMINA ALTERA. 115



ullo modo agnoscī; nocte verò stella instar lucentem, & igneo splendore coruscantem, facile in conspectum venire.

ET hac quidem terrestris Aglaophotis siue Cynospastus, Paonia est; cuius etiam grana cocci colore rubentia, Apuleius ait, noctu lucere tanquam lucernam, & plurimum noctu à pastoribus inueniri & colligi.

APPELLATUR verò & hac Aglaophotis à Iosepho belli Iudaici scriptore, lib. 7. cap. 25: Baaras, à loco in quo reperitur. Quod, conferenti ea quæ de Aglaophotide terrestris, siue Cynospasto, Aelianus scribit, cum ijs quæ de Baara Iosephus, sit manifestum. Cynospastum etenim Aelianus ait, non absque periculo euelli, & eum, qui primum eius naturæ imperitus eam attingit, famiæ esse perijsse: itaq; signum ad eius radices noctu defigendum, canem verò ad alligandum famelicum, qui nidore obiectarum assatarum carniū motus, ad eas impetu factō, radicibus eam eruat. Ita etiam Iosephus, Baaram tradit circa vesperam, veluti iubare fulgere, accedentibus & euellere cupientibus facilem non esse; sed vel vrinam muliebrem, aut menstruum sanguinem super eum fundendum, aut circumfodiendam, & ad eam canem religandum, atque ita demum euelli posse.

VANISSIMA autem hac sunt omnia: nullo etenim negotio & citra omne periculum, quauis diei & noctis hora Paonia radix colligi & euelli potest. Quæ de causa & similiter vana sunt, quæ Theophrastus & Plinius, de Paonia tradi ferunt: præcipi, videlicet, ut noctu colligatur. Nam si interdiu quis fructum legat, à Pico martio visus oculis periclitaturum: si verò radicem secet, periculum esse ne sedes procidat.

MIRUM autem videri non debet huiusmodi nugas & vanissimas superstitiones, ac impijsimas ceremonias, subinde in antiquissimorum auctorum libris resperfas repe-

riri : fuerunt enim multa, illorum seculis, magna vanitate, ad ostentationem, ut Plinius verè testatur, ab Aegyptijs & alijs praestigatoribus efficta: quorum sectator olim quidam Andreas fuit medicus, quem Galenus ait, praestigiaturas ac mendacia in materiam medicam inuexisse: à cuius lectione, ea de causa, & aliorum similiter mendacium, abstinentium precipit.

PORRO Paeonia radix leuiter cum dulcedine, ut Galenus ait, adstringit: acrimonia cuiusdam subamara quoque particeps: temperamentum haud insigniter calidum obtinet, pauillo symmetro calidius: exiccatoria autem est & subtilium partium. Feminis à partu non purgatis, sicca, Dioscorides inquit, datur: menses cit Amygdala quantitate pota: in mulsâ, Galenus addit. Prodest auriginosis, renes & vesicam dolentibus: obstructum hepar & renes expurgat: ventris dolores sedat, & fluxiones sistit, in vino decocta & bibita. Pueris ex collo suspensam, aduersus Comitalem morbum efficacem esse, à Galeno certo & euidenti experimento compertum est. Estur etiam, inquit Plinius, contra malum mentis: sed in medendo quatuor drachmae satis sunt. Praefertur ad hac mascula Paeonia radix.


RUBRA grana, 10. aut 12. pota in vino austero, nigro, fluxum rubrum muliebrem sistunt: stomachicis qui rofiones sentiunt, esa profunt: à pueris comesta, aut in potu sumpta, calculi initia excutunt.

NIGRA grana, ipsa videlicet semina, 15. numero in potu sumpta, opitulantur suppressionibus nocturnis, quas ἐφιάλτας nominant, vterique strangulationibus & doloribus. Vtraque auxiliantur à serpente percussis, Plinio auctore.

CANDIDO siue albo Lilio, quod pulchritudine, nitore & vsu, reliquis præstat, folia sunt oblonga, lata, carnosâ, lauia, in herbaceo & diluto virore splendentia: caules duobus cubitis altiores, multis folijs sensim attenuatis compositi, qui inter folia exeunt: flores ad summum caulis pulchri, candidi, odorati, magni, ab angustijs in latitudinem se laxantes, calathi forma, senis constantes foliolis, oblongis, extrinsecus striatis, staminibus è medio emicantibus, à quibus lutei dependent apices: radix bulbosa, nucleis constans, & ex multis simul vnitis composita, succo lente & glutinoso plena, quo & folia & caules redundant. Seruntur Lilia passim in hortis. In Syria autem & Pisidia Pamphilia, vnguentis efficacissima nasci, Dioscorides inquit. Floret apud Germanos, Belgas, Gallos, Liliū, Iunio mense: Augusto folia exeunt, tota hyeme virentia: Vere, caulis erumpit.

STIRPS Liliorum à Grecis κρινώνεια dicitur: flos vero κρίνον & λείδιον: est tamen & Narcissus λείδιον: à nonnullis καλλείριον & κρινάνθεμον: A Latinis Liliū & Rosa Iunonis.

APPELLATUR autem Rosa Iunonis, quod ex lacte eius in terram delapso, natum feratur. Fingunt siquidem Poetae Herculem, quem ex Alcmena Iupiter sustulerat, admotum fuisse dormientis Iunonis vberibus, & post sucum, lac copiosum effluxisse, & vna eius parte calum persusum alia terra glebas: atque hinc Lilia nata: inde vero lacteum apparere in calo circum. Germani Liliū istud, vulgo weiß gilgen oder weiß lilgen appellat. Belgæ, Witte Lelien, Galli, Lys blanc.



LILIUM autem flos temperaturam mistam, vt Galenus ait, obtinet; partim ex tenui, partim ex terrena essentia.

RADIX foliaq; per se trita, desiccant & abstergunt, ac moderate digerunt.

FOLIA herbae, Dioscorides ait, imposita, auxiliantur à serpentibus ictis: eadem seruesacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus curandis apta sunt.

SUCCVS melle & aceto mixtus, in aëneo vase coctus, medicamentum efficitur veteribus vlceribus, & recentibus vulneribus vtile.

RADIX tosta, & cum rosaceo trita, ambusta sanat; vterū molliet, menses mouet: vlcera ad cicatricem perducit. Cum melle verò eadem trita, neruorum vulnerationes & luxationes sanat; vitiligines & lepras expurgat; sursures & manantia capitis vlcera abstergit; faciem purgat & erugat. Cum aceto autem & hyosciami folijs, ac farina triticea trita, testium inflammationes mitigat. Propter clauos pedum, in vino, Plinius ait, radices Lilij decoquuntur, tri-duoq; non soluuntur: cum adipe aut oleo decocta, pilos adustis reddunt. E mulso pota, inuilem sanguinem cum aluo trahunt: Lienī, & ruptis, & vulsis prosunt.

RECENTIORES, Lilij radices coctas, cataplasmatibus summa cū vtilitate admiscēt, abscessus maturantibus & ad suppurationē perducētibus. Eadem etiā, in oris collutionibus ad idem faciētibus, vtiliter decoquūtur. Nam omnes abscessus maturant, & suppurari faciūt, & dolorem simul sedant.

SEMEN, Dioscorides ait, potum, serpentium moribus aduersatur; Cataplasma ex semine & folijs, erysipelatis imponitur.


FIT ex floribus oleum aut vnguentum, quod Lirinum aut Susinum appellatur, molliendis neruis aptum, priuatiq; ad vteri durities vtile.

DE LILIIS PURPUREIS, HYACINTHO
SCRIPTO, ET COMOSANDALO.
CAP. XXXIII.

PURPUREORVM Liliorū duo genera sunt: maius
vnum; alterum minus. Maiori purpureo lilio, caules sunt
proceri, longi, subinde altiores quā lilij albi: folia tamen
nigriora & angustiora, circa caulem multa, sed ante eius
exortum nulla: flores summo caule copiosi, 10. 12. aut plu-
res, ad vsque 18. & 20. ac vltra, supra inuicem incerto or-
dine digesti, lilij alterius forma & magnitudine, colore verd
rubro ad croceum inclinante; multis, exiguis, nigris quasi
punctulis, literarum quarundam veluti rudimentis respersi:
radices, bulbi magni sunt, ex multis quoque nucleis, vt lilij
candidi; sed maiores.

IN Italia, in aruis inter segetes circa messem; in mon-
tibus etiam ac conuallibus, Lilium istud, Matthiolo teste,
emicat. Belgæ in hortis ferunt. Floret paulo ante candidum
lilium, post purpureum minus, vnà cum Rosis.

MATTHIOLVS Lilium sylvestre in Italia appella-
ri, & Hemerocallida esse ait. Sed ἡμεροκάλδης, vt auctor
Dioscorides, in singulis apophysibus, tres aut quatuor flores
profert, colorem habentes ἰσχυρῶς ὀχρᾶν, id est valde lu-
teum. Ἀπόφυες, autem siue ἀποφύαι, ramulares adnascen-
tiæ, siue appendices dicuntur. Ochra color, melino similis &
cirrino, a malo Citrio nomen habenti: Lilium autem istud,
ramulares adnascentiis nullas habet; & flores in caule non
modo tres aut quatuor, sed non raro 18. aut 20. ac coloris
non lutei, sed purpurei crocei. Quibus de causis non quidem
Hemerocallis, sed Lilium illud esse apparet, quod capite de
Lilio, τὸς πορπὸς, siue purpureum, reperiri, ex relatu, Diosco-
rides scribit; quodq; rubens Plinius, & Græci, eo auctore,



apud
in An
tum
lides fl
bens,
Heme
latome
perium
& Hen
monem

A
multo
similit
res è su
diciis
loris qu
gru &
paulo
suprag
manos
May
L
quod a

O
Hyacin
sanguis
ludens
in scrip
Exce
De
Pur

αρίων vocant, florem verò Cynorhodon : & laudatissimum in Antiochia & Laodicea Syria, mox in Phaselide, quartum locum in Italia nascens. Nisi fortassis duæ Hemerocallides flores sint : vna quidem apophyses habens ; alia non habens, & ea quidem purpurea : ita etenim & Lilium istud Hemerocallis fuerit, & præsertim πορφυρεὺς : qua appellatione Hemerocallida etiam dictam, inter nothas voces reperitur. Sed verisimile est Hemerocallida non esse ; est enim & Hemerocallis quadam, flore purpureo, cui πορφυρεὺς nomen propriè conuenit.

ALTERVM & minus purpureum Lilium, caule est multo breuiori, cubitali videlicet tantum aut minori : folijs similiter nigricantibus & angustioribus ac minoribus. Flores è summo caulis pariter erumpunt, singuli tamen suis pediculis, modò breuioribus, modò longioribus insidentes ; coloris quoque purpurei crocei, notulus similiter quibusdam nigris & perquam exiguis ornati ; Lilij etiam diuisura, sed paulo minores : pro radicibus & minores bulbi sunt, infra supraque, quos fibra adherent. Vnà cum alijs Lilij apud Germanos, Belgas & alibi, colitur in hortis. Floret sub finem Maij, reliqua Lilia antecedens.

LILIVM etiam est purpureum, & αρίων πορφυρον, quod ad differentiam præcedentis, minus cognominatur.

OVIDIVS lib. Metamorph. 10. huius generis Lilium, Hyacinthum appellat, ab Hyacintho adolescente, ex cuius sanguine hunc florem natum fingit, quando cum Apolline ludens perisset, cui Apollinem gemitus sui notas & literas inscripisse ait, sic scribens :


Ecce cruor, qui susus humo signauerat herbas,

Desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro.

Flos oritur, formamque capit, quam lilia, si non

Purpureus color his, argenteus esset in illis.

Non



Non satis hoc Phæbo est, (is enim fuit auctor honoris)
 Ipse suos gemitus folijs inscribit, & ai ai
 Flos habet inscriptum, funestaq; litera ducta est.
 HVIVS Hyacinthi meminit etiam Theocritus in Epi-
 taphio Bionis, eidyllio. 19.

Nũ

Νῦν δ' ἀκινθε λαλεῖ τὰ σα γράμματα καὶ πλέον αἰ αἰ
 Λάμβανε τοῖς πετάλοισι.

COGNOMINATVR autem hic, à Poëtis Latinis
 nonnunquam ferrugineus, vt à Vergilio Georg. 4.

Et pinguem tadam, & ferrugineos Hyacinthos.

Similiter & à Columella, lib. x.

Syrpiculum ferrugineis cumulate Hyacinthis.

FERRUGINEVS verò hyacinthus dicitur, quòd ad
 similitudinem ferruginis rubeat. Est etenim ferrugo corru-
 ptela ferri, veluti aris arugo, quæ à colore subrubente rubi-
 go appellatur. Vnde & ferrugineus color, instar ferruginis Ferrugi-
neus color.
 rubens. Sunt qui velint hyacinthum non ex eo ferrugineum
 cognominari, quòd ferruginis modo subrubeat, sed quia lu-
 ctus notas folijs inscriptas habeat, ferrugineumq; eum quasi
 lugubrem & funestum appellari aiunt. Tradunt siquidem
 ferrugineum esse fuscum & subobscurum colorem; Vergi-
 liumq; cum ferrugineum nominat hyacinthum, ad fabu-
 lam eius alludere, quæ hyacinthum ex sanguine hyacinthi
 adolescentis natū fingit: ferrugineam siquidem ab eo etiam
 dici, Charontis funestam & luctuosam cymbam. Sed his
 Vergilius ipse contradicit, Bucolicòn ecloga tercia, vbi
 hyacinthum suauiter, id est non intense rubere scribit, his
 verbis:

Et me Phœbus amat, Phœbo sua semper apud me
 Munera sunt Lauri, & suaue rubens Hyacinthus.

OVIDIVS etiam loco superius adducto, eum pur-
 pureum esse manifestis verbis ostendit. Purpureus verò,
 omnis qui rubet color in floribus appellari consuevit.

RECENTIORVM plerique, hunc hyacinthum
 Poëticum appellant, ad differentiam nempe alterius, quem
 historicum Iodocus Vvillichius in commentarijs Georgicon
 Vergilij nominat. At nobis magis placet hunc scriptum hya-
 cinthum

cinthum dici : alterum verò , de quo inferius suo loco , non scriptum : in hoc etenim lugubres nota inscripta reperiuntur : in illo verò nulla sunt.

Comosandalus.


PAUSANIAS Corinthiacon lib. secundo, scriptum hyacinthum , aut ei simillimum florem Comosandalon ab Hermionensibus appellari, memoria prodidit, ritus referens, qui ab ipsis in honorem Chthonia dea, statis festis aguntur diebus. Pompæ agmen ducunt, inquit, sacrificuli, & qui annuos magistratus gerunt : sequuntur semina ac viri : ipsis etiam pueris solenne est, deam cum pompa deducere. Incedunt autem cum albis vestimentis, capitibus coronas ferentes, sunt ea corolla ex flore contexta, quem κομοσάνδαλον incola appellant. Hyacinthum ego illum existimo : est enim ei tum magnitudine, tum colore persimilis ; habet præterea easdem luctus indices literas. Hæc Pausanias.

PORRO purpureorum liliorum istorum, in medicina incognitus vsus est, & facultas incomperta : inter flores autem gratiam inuenire.

DE LILIO SYLVESTRI.

CAP. XXXIII.

SYLVESTRE Lilium caules promit bicubitales aut altiores, rotundos : folia longa, lata, acuminata, non supra inuicem incerto ordine disposita, sed caulem quibusdam locis, stellæ modo radiata, circundantia : flores è suis pediculis deorsum dependent, Lilij diuisura, sed minores, colore purpureo obsoleto, purpureisq; aliquot maculis splendentes, & staminibus eiusdem coloris in medio ; quorum foliola retrorsum reflexa in circulum aut orbem ferè recurvantur : radices bulbosæ veluti ex multis nucleis coniunctæ, aurei vel flauï coloris ; ex quibus fibræ dependent. Nasçitur lilium istud



istud complurimis Germania locis, in syluis & montibus, Fuchsio & Gesnero testibus. Belge cum alijs Lilijs in hortis habent. Floret sub finem Maij, aut Iunij initio, candida Lilia anreueruens.

GERMANI, Boldtrwurtz à flauo bulbi colore, & Heydnisch blumen appellant. Noſtri Helickens van Caluarien. Galli, Lys fauuage, hoc est, Lilium syluestre. Est tamen & aliud syluestre Lilium, alio nomine Hemerocallis, de qua sequenti capite. Matthiolus in Italia à Chymistis Martagon dici, ait.

- 2 AD hoc genus Lilij, referendum quoque videtur, quod Hemerocallidem alteram, Matthiolus nominat, & in Iapidia montibus reperiri refert. Pingitur istud ab eo, caule comoſo, & folijs multis, incondito ordine circa ipsum digestis: flore foliola ſua recuruante, Lilio syluestri simili: radicibus ex multis, veluti paruis bulbis conglomeratis.


VSV autem vtrumq; hoc Lilij genus, in medicina nullum habet.

DE LILIO NON BVLBOSO.

CAP. XXXV.

NON bulbosi Lilij duo reperiuntur genera, florum colore discreta. Vni, flos luteus: alteri, in rubro obſoletiori purpureus. In lutei genere flos vnus minor; alterius, paulo maior est: vterque tamen purpureo minor, qui maximus est & Lilio candido magnitudine ferè similis.

SUNT autem non bulboso Lilio, folia oblonga & angusta, Porri aut Aſphodeli folijs ſimilia: caulis cubito altior, rotundus, leuis, absque folijs, superius in apophyses, id est, ramulares eminentias, ſiue propagines, duas aut quatuor diuiſus: in quarum ſingulis flores tres aut quatuor, Lilium forma



forma & diuifura referentes : colore in vno quidem genere Ochra, vt diximus, luteo ; in alio rubro purpureo, cuius tamen medium floris, luteum est : post flores, crassa, triangulares gignuntur filiquæ ; in quibus semen nigrum & splendens, Paonia semini simile, sed minus. radices subsunt non bulbosæ, sed veluti Asphodeli lutei, multæ, oblongæ, coherentes ; & vni quidem, cui videlicet flores maiores aut purpurei, crassiores, nodosioresq̃ ; alteri verò minoris floris, tenuiores & longiores ; è quarum annexu fibra quedam crassiores serpunt, quibus non secus ac Asphodelus luteus, in plures plantas faciliè multiplicatur. Peregrinum Belgio istud Lilium est, & aliunde inuectum. Floret vnà cum Lilio purpureo maiori, vel paulo ante, Lilia candida precedens.

LILIVM luteum nonnulli appellant ; sed rectius non bulbosum Lilium nuncupatur : aliij Liliaginem, plerique Liliastrum : veteres autem Hemerocallida dixerunt. Reperiuntur autem apud ipsos Hemerocallides duæ ; vna frutex, alia flos est.

Hemerocallis frutex.

HEMEROCALLIS frutex ex genere est coronariorum & lignosorum, quæ minutis, tenuibusq̃ constant folijs : semine exit, radiceq̃ est lignosa : vt auctor Theophrastus lib. 6. de historia stirpium. Plinius lib. 21. cap. 10. hanc Hemerocallidem inter eas stirpes numerat, quæ solis folijs coronant.

Hemerocallis flos.

ALIA Hemerocallis, flos est, qui nocte tabescit, oriente verò Sole pullulat, Athenæo teste : quale istud non bulbosum Lilium ; præsertim quod purpureum & fugacissimum est, & vno tantum die viget ; matutino siquidem tempore exortum, vesperi flaccescit.

DIOSCORIDES Hemerocallida apophyses siue ramulares adnascencias habere scribit, & in singulis flores tres aut quatuor, ochra colore : caules non bulbosi Lilij ; in

propa-

propagines, siue ramulos distribuuntur; singuliq; flores tres aut quatuor promunt, & eos quidem, ochrea colore in vno genere. Iam & Porphyrathes, Hemerocallis nuncupata reperitur: hac autem appellatio purpurei floris non bulboso Lilio conuenit. Quae omnia non bulbosum Lilium, Hemerocallidem veram & legitimam esse, manifeste ostendunt. Tribuit Dioscorides Hemerocallidi, praeterea radicem bulbosam: innuit istud, apud Dioscoridem Hemerocallidis descriptionem deprauatam: vel enim superfluum scilicet, & veritati repugnantium adiectione, ampliatam, vel duorum Liliorum descriptiones, in vnam contractas; Hemerocallidis videlicet, & alicuius alterius Lilij, nisi fortassis & bulbosum aliquod sit Lilium, apophyses faciens, & vnus tantum diei florem luteum habens; quale tamen nondum constat alicubi repertum esse.

Dioscoridis descriptio suspecta.

HEMEROCALLIDIS autem descriptio, his verbis apud Dioscoridem traditur. ἡμεροκαλλὶς φύλλα ἔχει καὶ κνήκων ὁμοίαν κνήκων. χλωρὰ δὲ ὥσπερ πράσα. ἀνθὴ δὲ ἐν αὐτῷ καὶ ἑκάστην ἀπόφυσιν γ' ἢ δ'. τὴν σχίσιν τῷ κνήκῳ εἰκότα ὅταν ἀρξῇται χλαίνειν. τὴν δὲ χράν ἰσχυρῶς ἀχράν. ῥίζαν ὁμοίαν βολβῶ εὐμεγέθει. Id est, Hemerocallis folia habet & caulem Lilio similia, viridia vt Porrum: flores in ipso, iuxta singulas apophyses tres aut quatuor, diuisura Lilio similes, cum primum hiare caperint: colore valde ochrea, radicem similem bulbo magno.

DICITUR verò Hemerocallis & ἡμεροκατάλαχτον, κνήκων ἀγρίαν, κρινάνθεμον, πορφυρανθὲς, βόλβος ὁ ἀματινὸς, ἀντικάνθαρον, Lilium agreste & Lilium marinum. Et omnibus his nominibus Lilium non bulbosum nuncupari potest, excepta tantum bulbi hamatici appellatione, quae Lilio alicui bulboso magis conuenit.

CÆTERVM facultates Lilij non bulbosi incomper-
ta sunt,

ta sunt, cum nullius, hac aetate, in medicina aut cibaria sit usus.

DIOSCORIDES autem Hemerocallidis radicem tritam ait, & potam; aut cum melle & lana in pecto appositam, aquam & sanguinem ducere: folia trita imposita, mammarum ex partu, & oculorum inflammationes mitigare: sed & radicem & folia, ambustis vtiliter imponi.

DE LILIO CONVALLIVM.


CAP. XXXVI.

QVOD Lilium convallium recentior nuncupat aetate, folia duo aut tria promit, virentia, laevia, latiuscula, Lilij folijs similia, sed minora: caulem tenuem, palmarem; circa quem à medio sursum versus, flores parvi, rotundi, hiantes, per oras denticulati ac reflexi, albi & odorati, & fructus inde rotundi, rubentibus Asparagi baccis haud multum ab-similes, verum minores; semen in his durum & amaricans: radices tenues sunt, longae, aliquantulum geniculatae, ser-pentes.

IN sylvis & locis vmbrosis sponte exit. Floret circa Ca-lendas Maij mensis.


GERMANI, *Weyenblumlin* & *Weyenrpfz* inde nominant: Belgae, *Weyenbloemkens*: Galli etiam *Muguet*: est tamen & alia ab ipsis *Muguet* dicta, *Lap-paginis* videlicet species, à Plinio *Asperugo* nuncupata. *Ges-nerus* florem istum *Callionymum* appellari posse existimat, nostra aetate *Lilium convallium* vocat.

CALIDAE & sicca qualitatis flores & fructus par-ticipes sunt. Feruntur flores aduersus apoplexiam, nervo-rum resolutiones, vertiginem, morbum comitiale, ac alios eum cerebri frigida humidaq; intemperie morbos, auxilia-
res



res esse. Sunt etiam qui velint flores istos cor roborare, ac
cardiacis quoquo modo assumptos prodesse: oculorum item
caligines decocto aut succo eorum discuti.

EIVSDEM cum lilio isto generis esse putatur, quod
Vnifolium dicitur: folium huic vt plurimum in tenui pedi- Vnifolium
culo singulare & vnicum est, latum, neruosum & acumi-
natum, magnitudine ferè foliorum hederæ; circa caulicu-
lum



lum autem breuem tenuemq³ bina, eiusdem forma sed minora, supra quæ flores candiduli Lilij conuallij similes, at minores, & nullius aut exigui odoris: bacca sequuntur exigua, per maturitatem rubentes: radices tenues, obliqua, serpentesq³ fibrae sunt.

EXIT ijsdem & similibus, quibus Lilium conuallium locis: floretq³ eodem tempore aut paulo post.

VVLGO Finbladit nuncupant, id est Vnifolium siue μονόφυλλον.

TRA-

TRADITVR à quibusdam resiccatarum radicula-
rum pulvis, aduersus pestilentem bubonem efficax esse, si
statim initio ipsius mali, drachma pondo cum aceto, & vi-
no, aut aqua permixtis detur.

DE ASPHODELO. CAP. XXXVII.

ASPHODELI genus vnicum Dioscorides; Plinius
verò duo fieri genera, & Dionysium feminam ac marem
esse dixisse, refert. Posterior ætas duo triaue Asphodeli ge-
nera obseruauit; & præter bulbosum quidem, cuius Gale-
nus meminit.

PRIMUM genus, album quis dixerit: alterum verò, ¹
luteum.

FOLIA autem primus habet complura, oblonga, an-
gusta, Porri folijs similia, acuminata, caulem rotundum,
leuem, cubito longiorem; quem à medio sursum versus
multi quinque foliolorum flores patentes exornant, colore
candidi, aut ex valde diluto rubro modicè purpurascetes,
staminibus in medio; post quos capitula sequuntur orbicu-
lata: semen in his durum triangulum nigricantis obsoleti
coloris. radices ab vno capite complures exeunt, oblongæ,
inferiore sede crassiores, magnis glandibus quodammodo
similes, succosæ, cum amaritudine leni, sapore adstringenti.
In Gallia Prouincia, Italia, Hispania, & alijs locis, sponte
exit: apud Germanos & Belgas, non nisi satus prouenit.
Floret hic Maio & Iunio, ac particulatim quidem, ab imis
incipiens, aliquot postquam satus est annis.

HVIC similis floribus, folijs, & semine, alius quidem ²
Asphodelus est minor, cui non glandulosæ, sed fibrosæ sunt
radices. Floret protinus & primo anno, deinde intermori-
tur: Pseudo Asphodelus quidam non abs re esse videtur.



An
 Latini
 Cat
 Antier
 primari
 Me
 diebus;
 Malua
 ces alul
 bulbofo
 complu
 tar; qu
 cibum a
 infuua
 Nic
 On
 Stult
 Neq
 Cæ
 pote, vi
 res; & t
 vino: fa
 in cibo
 de acbma
 ha. & ra
 pascuaria
 matione
 cusa cur
 auxiliari
 Svo
 eruo, ill
 fimal dec

ASPHODELV *autem* Græcis quidem ἀσφοδέλος, Latinis Albucum siue Albucus, & hastula regia dicitur. Caulis cum floribus ἀνθερόν. Plinius caulem floriferum Anthericon; radicem verò, id est bulbos, Asphodelum nominari refert.

MEMINIT huius Asphodeli Hesiodus in Operibus & diebus, ubi stultos ait ignorare quàm magnum bonum sit in Malua & Asphodelo. Nam huius præcipuè Asphodeli radices edules sunt. Galenus tamen non de hoc Asphodelo, sed de bulbo eum scripsisse opinatur; cuius tamen bulbos non nisi compluribus elixationibus esculentos reddi, ipsemet testatur; quales, non est verisimile Hesiodum commendasse; qui cibum aliquem paratu facilem per Maluam & Asphodelum insinuasse videtur. Verba eius sunt:

Νῆπιαι οὐδ' ἴσασιν ὅσον πλεον ἡμῖν πάντες,

Οὐδ' ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μεγ' ὄνειαρ. Id est, Stulti neque sciunt, quanto plus dimidium sit toto,

Neque quam magnum in Malua & Asphodelo bonum.

CÆTERVM Asphodeli, vt Dioscorides tradit, radices pota, vrinam & menses ciunt; sanant etiam lateris dolores, & tusses & rupta conuulsq; drachmæ pondo pota ex vino: facit ad vomitiones magis idoneos, tali magnitudine in cibo sumpta: datur vtiliter à serpente demorsis trium drachmarum pondo; sed imponere morfibz oportet, & folia, & radices & flores in vino cōtrita: sordida item & depascentia vlcera; mammarum etiam ac testium inflammationes, phymataq; & furunculos in fece vini radix decocta curat: sed recentibus inflammationibus cum polenta auxiliatur.

Succvs radices addito vetere vino dulci, myrrha & croco, illinendis perquàm vtile oculis fit medicamentum, si simul decoquantur. Ad purulentas aures idem per se & cum

thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolores sopit.

VSTÆ radicis cinis Alopecius impositus ad pilum reducit.

OLEVM in excauatis radicibus ad ignem decoctum, exulceratis pernionibus & ambustis illitu prodest: & in aures infusum earum doloribus auxiliatur. Vitiliginem albam, luteo antea in sole perfrictam, illita radix exterit.

SEMEM & flores præcipuè, aduersus Scolopendras & Scorpiones excellens sunt remedium, in vino pota.

DE ASPHODELO LVTEO.

CAP. XXXVIII.

PRÆTER Asphodelum superiori capite descriptum, & alius est luteus cognomento; folia cui sunt oblonga, angusta, striata, in virore quasi cerulea, longiora & angustiora quàm primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo, à medio sursum versus, plurimi; alterius satis similes, caterùm colore lutei, staminibus in medio: capitula succedunt rotunda, in quibus semen: radices similiter complures, sed singule oblonga & tenues, multo quàm primi & tenuiores & longiores, colore luteola, supra quas fibra quadam laterales exeunt, per quas in plures alias stirps ipsa facillè multiplicatur. Peregrinus & hic Asphodelus Belgio est, nec alibi quàm in hortis reperitur. Flores similiter Maio aut Iunio mense; folia eius pleraque hyeme, si non admodum rigida fuerit, virent; Vere noua exeunt.

RECENTIORES Asphodelum luteum à florum colore luteo appellant; à Dionysio femina dictus esse videri potest; & Plinij alter.

PORRO quis huius Asphodeli vel in cibatu, vel in medicamentis vsus sit, exploratum nondum est.



BULBOSVS *Asphodelus* folia habet porracea, sed tamen angustiora & breuiora quàm primi *Asphodeli*; caulem rectum, rotundum, floribus similiter multis circum vestitum, rarioribus tamen, primi *Asphodeli* floribus haud multum dissimiles, ex sex paruis acuminatis foliis, & aliquot in medio staminibus compositi: capitula quoque triangularia, sed oblongiora, in quibus semen: radix subest bulbosa magnitudine esculenti bulbi, aut maior. Apud Belgas non nisi hortensis est. Floret eodem, quo primus, tempore, aut serius paulo.

ASPHODELI speciem esse caulis *Antherico* similis ostendit; qua de causa & eum *Asphodelum* esse apparet, cuius Galenus lib. de alimentorum facultatibus secundo, meminit his verbis:

RADIX *Asphodeli*, & magnitudine, & figura, & amarore *Scilla* radici quodammodo est similis: si tamen vt *Lupini* paretur, maximam partem sui amaroris deponit; inq; eo à *Scilla* discrepat. Nam *Scilla* qualitas difficillimè eluitur. *Hesiodus* certè *Asphodelum* laudat cùm sic ait: Nec quanta in *Malua* & *Albuco* sint bona, norunt. Equidem nò ui quosdam rusticos, qui grassante fame, vix tandem compluribus elixationibus, macerationibus in aqua dulci, esculentam ipsam reddiderunt. Porro hac quoque radix, quemadmodum & *Dracontij* facultatem habet tenuandi atque aperiendi. Proinde quidam pro summo remedio ipsius *Asparagum* ictero laborantibus exhibèt. De eodem verò *Asphodelo*, & lib. de simplicium medicamentorum facultatibus idem scribit. Radices etenim *Asphodeli* viribus *Aro*, *Arifaro*, & *Dracontio* similes esse ait, quales certè huius, non primi




primi illius sunt. Verba Galeni, hoc loco, de Asphodelo, hæc sunt: Et huius radix utilis est, sicut Ari, Arisari, & Dracontij, nempe extergentis facultatis. Vsta autem cinis calidior, & exiccantior, subtiliorq; ac digerere potentior efficitur, ac proinde & Alopecias sanat.

DE IRIDE. CAP. XL.

IRIDIS species floris colore differentes, complures esse Dioscorides innuit. Flores siquidem, ait, varij aut candidi, aut lutei, aut nigri, aut purpurei, aut cyanei. Quam coloris diuersitatem, non in vno flore, vti Andreas Lacuna existimauit, sed in diuersis reperiri αὐτάπτης testis est Antonius Musa; qui à se conspectos in Illyrico, Iridis flores plerosque candidos, alios pallidos, nonnullos luteos, quosdam purpureos, plurimos ceruleos, in examine simplicium scribit.

FOLIA omnibus oblonga, ensis aut gladij similitudine: caules rotundi, laues, cubitales, nonnullis altiores; in quorum summo flores παρὰλλήλοις siue alterno ordine positi, terni quaterniue, odorati. Constant flores senis potissimum foliolis, quorum tria deorsum repanda arcus modo reflectuntur, alia tria sursum & contra se mutuo curuantur. Color candida per totum quidē florem candidus est; lutea, luteus; cerulea siue nigra in saturata cerulea purpura nitet, μελανίον siue Viola nigra colorem referens; purpurea verò in caruleo purpureus, sed eius tamē qua Belgio vulgaris est, non in omnibus foliolis neque ab omni parte similis; sursum etenim reflexa, pallidiora sunt & colore dilutior, praesertim vnus, cuius hæc pallidissima & ad aqua κυανέον colorem accedunt; deorsum curuata inferiore parte pallent; superiore verò pulcherrimū purpurea siue nigra Viola dilutū colorem proximē exprimunt; intermixtis interim lineis candidis, qua



qua ab ipso solij exortu ac veluti base, tum & ab ipsa flaua fimbria exorientia, gratiam coloris mixturam & varietatem efficiunt. Oritur fimbria ab ipsa inferiorum foliolorum in singulis floribus parte, qua calyci inhaerent, & inde sursum ad medium producitur, multis, tenuibus, breuibus, luteolis veluti pilis concreta, humani ferè supercilij, aut Erucæ hirsutæ similitudine. Præter sex autem hæc, quæ propriè folia, sunt & tria alia oblonga, angustæ foliola, extrema summæq; parte bifida, quæ fimbriam illam quodammodo contegunt: sub his singula stamina. Radices Iridi subiacent longæ, solidæ, nodosæ, ac veluti geniculatæ, digitali aut ampliori crassitudine, subinde in plures propagines, ipsis ex lateribus adnascentes distributæ, & summa terra hærentes, intus candidæ: quibus adhuc recentibus & nondum resiccatis, nonnihil inest feruentioris saporis, qui tamen non statim, sed paulo post quàm mansæ sunt, deprehenditur: tunc etenim fauces & lingua radicem impetens, igneæ qualitatis vestigium, ac τρυπώτερον τι, quod non facile eluitur, ipsis imprimit: sicca verò gratiori sunt odore, & qualitate gustabili minus acri.

NASCITVR Iris in Illyrico, Macedonia, Africa, & in complurimis Europæ prouincijs. In Belgio, purpurea familiarissima est, & non modo in hortis, sed & quibusdam palustribus locis sponte exit, præsertim cuius flores dilutionem purpuram, & aquæ cyaneum colorem referunt: Candida, hortensis tantum est; Lutea in paucorum hortis colitur à paucis annis primum in cognitionem deducta: Cæruleam odoratissimi floris in Hispania plerisque locis sponte exire accepimus.

OPTIMA Iris apud Illyricos prouenit, & melior quàm in Macedonia, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magisq; ad Septentrionem sita; vt Theophrastus ait.

ait. Plinius Illyricam reliquis quoque præfert, & quidem non in maritimis, sed in palustribus (exemplaria, fere syluestribus, minus rectè habent) Drylonis, & Narona-natam: quam etiam Nicander in Theriacis commendat, sic scribens:

Plinij locus restitutus.

Ἰρις δ' ἢν ἐθρεῖε Δριλῶν καὶ Νάρονος ὄχθῃ. Id est,

Iridem quam aluit Drylon & Naronis ripa.

SUNT autem hi fluuij Ptolomæo in Dalmatia prouincia Illyrico vicina. Nicandri verò scholiastes, Drylonem fluuium esse ait Illyriorum & Narorum, qui Illyricos & Liburnos segregat; vbi Cadmus & Harmonia habitauerunt, in serpentes transformati.

DIOSCORIDES inter Illyricas & Macedonicas præstantissimam esse ait, quæ radice est densa, minuta, frangi contumace, subruffo colore, multum odorata, gustu feruido, odore integro, non situm redolens, & sternutamentum dum tunditur mouens.

PROXIMA bonitate, Plinio auctore, Macedonica est, quæ apud Galenum lib. 7. κατὰ γένν in acopo quodam Asclepiadis recipitur, cum tamen in alijs compositionibus Illyrica fere admisceatur.

TERTIO loco Africana est, quam Galenus lib. primo de antidotis, multo inferiorem Illyrica testatur. Nam si, inquit, conseras eam quæ ex magna Libya Romam copiosissima adfertur, tantum ab Illyrica abest, quantum mortuum corpus à viuo.

QUÆ in frigidioribus reperiuntur regionibus, deteriores ac viribus infirmiores sunt. Theophrastus has omnino absque odore esse existimauit. In Trachia, inquit, caterisq; frigidioribus locis, ac minus coctura idoneis, odore penitus caret: quod tamen non absolute verum est. Nam & Belgica Iris resiccata, non omnino absque odore est, licet tamen

K

odore,

odore, quàm Italica inferior; quæ hac ætate in Germania
& alibi, reliquis præfertur, & Florentina cognominatur.

IRIDIS flores mense Maio prodeunt: solia ferè semper
virent: radices diuturnæ, vix vlla hyemis iniuria offenduntur; nisi fortè candidæ, cuius nimio hyemis rigore, subinde radices intermoriuntur.

IRIS Græcis ipis appellatur: Athenæus & Theophrastus lepis legunt, quasi consecratrix, quo nomine etiam Latinis dicitur: nonnullis radix Marica, vel potius radix Naronica, à Narone fluvio, circa quem optima & copiosissima, ut diximus, nascitur. Item *ῥαυμας*, celestis, ab arcu celesti, & ab eadem occasione *ῥαυμας*, admirabilis; *ῥαυμας* enim arcum celestem Poëta aliquando vocant: Nominatur & *ῥαυμας* aut *ῥαυμας*, καθαίρων purgans, ὀτρυνόν. Philinus Iridis flores *λύκος*, id est, Lupos vocari tradit, quod deorsum arcus modo curvata, labiorum Lupi speciem quandam reddant. Germanis, *Bilgen* / *Schwertel* / *Nostri*, *Lisch ouer Zee*. Gallis, *Flambe*. Italis, *Giglio* & *Iride*, *Iris* nominatur.

1 IRIDIS species flore candido olim in officinis gignendi casu Græco ignotus nuncupabatur: Germani, *Wiolwurtz* / *weisz Wiolwurtz*: *Nostri*, *wit Lisch*: Galli, *Flambe* blanche appellant. Hanc multi reliquis præferunt, & odoratiorem eius radicem affirmant.

2 ALIA Iridis species flore in cæruleo purpureo, Iridis nomenclaturam retinet: plerisque tamen Liliæ, & in Apulia Spatula, ut Franciscanæ familie fratres Angelus Palea & Barptolomæus ab urbe veterum scribunt: Itali, *Giglio azurro*, & *Giglio celeste*. Germani, *blauw Bilgen* / *blauw Schwertel* / *himmel Schwertel*: *Brabanti*, *blauw Lisch ouer Zee*. Huius speciem, quæ flore est diluore, plerique sylvestrem Iridem nominant; ad dfferen-

tiam

ziam candida, cum alterius hortensis. Sunt tamen & aliæ apud veteres sylvestres Irides, Xyris videlicet, & Ephemeron non lethale. Aloisius Anguillara Iridem hanc à Palladio Hyacinthum vocari existimat: alius Hyacintho, Iridis ac Gladioli nomen tributū dixerit. Verba Palladij sunt, lib. 1. de Apum castris, titulo 37. Herbas nutriat, Origanū, Thymum, Serpyllum, Satureiam, Melissophyllum, Violas agrestes, Asphodillum, Citraginem, Amaracum, Hyacinthum, qui Iris vel gladiolus dicitur, similitudine foliorum, &c.

PORRO Iridis radices recentes, & adhuc succo plene, impensè calida sunt, ad quartum ferè caliditatis gradum peruenientes. Succus earum non modò bilem, sed potissimum aquosos humores potenter educit, & hydropicos insigniter purgat, cum lactis sero, aut alio liquore, qui caliditatem eius nonnihil contemperet, epotus.

ARIDÆ in secundo sunt ordine intenso calefacientium & resiccantium: crassos & lentos humores, qui agrè ac difficulter educuntur, attenuant: respirationis difficultati, tussi veteri, & omnibus thoracis vitijs, quæ hinc oriuntur, multum in eclegmate profunt. Auxiliantur etiam lie-nosis, conuulsis, à serpentibus demorsis, persfrictionibus, rigoribus, & his quibus genitura profluit, cum aceto, inquit Dioscorides, pota: cum vino menses ducunt. Decoctum ad infessus muliebres vtile est, emollit etenim & locos aperit: ad coxendicū verò dolores, infusum: fistulas ac sinus carne implet, instar collyrij cum melle subdita, factus extrahunt: strumas & veteres duritias molliunt, cocta & imposita: arida vlcera replent: cum melle repargant, & nudata ossa carne operiunt. Profunt capitis doloribus cum aceto & rosaceo imposita: lentes & ephelides abstergunt, cum Veratro albo & duplo melle superposita. Admiscentur pesis & magmatibus: in vniuersum multi vsu.

DE IRIDE MINORI, SIVE TENVI-
FOLIA. CAP. XLI.

PRÆTER Irides superiore capite descriptas, repe-
riuntur & alia quadam Irides, de quibus deinceps agen-
dum. harum vna minor, & tenuifolia non temerè appel-
latur.

EST hac alijs similis, sed minor ac tenuior: folia habet
breuiora, angustiora, nigrioraq³, aut casti quasi coloris, qua
confricata, grauiusculum reddunt odorem, Spatula foetida
propemodum persimilem, sed tamen minus graeolentem:
caules similiter breuiiores, saepe vix cubitales; in quo flores
bini, terniue, alterni, colore caruleo saturato, forma aliarum
Iridum propemodum similes, nisi quòd ipsius foliola singula
angustiora sint, & superiora contra se mutuo non adeo re-
curuentur, sed ferè erecta consistant: inferiora verò ac deor-
sum reflexa simbriam non habeant, sed solam lineam lu-
team; qua tamen parte calyci proxima, nonnihil hirsuta
est: radices quoque obliquæ, nodosæ, & sibi inuicem impli-
citiæ, & quandoque quàm aliarum densiores, longas, mul-
tasq³ fibras inferius demittentes, foris ruffæ, intus subcan-
didæ aut subluteæ, gustu feruido, vti aliarum.

NASCITVR in Germania in apricis planisq³ pratis,
frutetosis ac humentibus campis, teste Valerio Cordo, &
non procul, vt Gesnerus ait, Tiguro. Apud Belgas non nisi
in hortis prouenit. Floret eodem quo alia ferè tempore.

IRIDEM minorem & tenuifoliam, vt diximus, ap-
pellant. Videtur nonnullis Plinij Rhizotomos, quòd radice
videlicet sit subruffa, breui, densaq³. Sed Rhizotomos Illyri-
ca est species, & quidem præstantior, Plinio auctore; hac
verò contra, alijs odore & potentia inferior, nec in Illyride,
sed in Germania reperitur. Proinde non Illyrica aut Rhi-
zotomos,

zotomos, sed sui generis Germanica & tenuifolia quædam Iris, quæ Spatula fœtida species haberi posset, si semen quod in siliquis gignitur, non vti aliarum Iridum planum, sed veluti Spatulæ fœtidæ rotundum esset. Plinij autem de Rhizotomo hæc sunt verba: Illyrica duorum generum est: Raphanitis à similitudine; & quæ melior Rhizotomos sub-russa.


CÆTERVM potentia huius radix vehementer calida feruensq; est; facultate & viribus alijs Iridibus non inferior: ad eadem, ad quæ illæ, ea propter, præsertim recentes, viles.

DE CHAMÆIRIDE. CAP. XLII.

CHAMÆIRIS inter Irides minima est, folia habet Gladiolo minora, angustiora, pinguiora: caulem palmi altitudine, folijs breviora: in quo flores non alterno ordine ac situ, vt in alijs, sed è summo cauliculi simul, singuli suis insidentes pediculis, erumpunt, odorati, & maturi pruni odore & aliquatenus colore, tenuifolia Iridis floribus minores, forma aliqui similes: foliola siquidem & huius floris angustiora sunt, & deorsum reflexa, fimbriam illam humani supercilij non habent. radices parvæ & obliquæ sunt, foris russæ, intus candidæ, duræ, gustuq; feruentes. Peregrina hæc Iris non modò Belgio aut Germaniæ, sed & Italiæ, vt fertur, est: & non nisi in hortis reperitur.

FLORET Maio mensè: folia hyeme pereunt, Vere erumpunt noua.

IRIDEM esse Illyricam Hermolaus existimauit Barbarus, cum eam olim in horto Felicis Sophie Patavij conspiceret; sed ab Illyricæ & legitima Iride eam differre, Antonius Musa in examine simplicium, satis ostendit. Nos



Chamæiridem nuncupauimus, antiqua destitutam appellatione; nisi fortè Iris sit Astragalites dicta, cui aliquatenus similis est. Nam veluti astragali siue tali, parua, nodosa, duraq; huius Iridis radícula sunt. Astragalatidis Iridis meminit Seranus apud Galenum κατὰ τότους lib. 7. & Aetius

Aëtius sermone 13. cap. 3. in emplastro venatorum.

FACULTATE autem & viribus, hæc quoque Iris
acris & impensè calida est, alijsq; Iridibus similis.

DE SPATVLA FOETIDA.

CAP. XLIII.

SPATVLA foetida, caule, folijsq; iridi similis; folia
tamen nigriora, grauem foedumq; odorem spirant, præfer-
tim si confricentur atque digitis atterantur: flores quoque
similes sed minores, purpurei sed sordidi & obsoleti coloris:
Cordus tamen cuiusdam saturata purpura arridere refert:
succedunt siliqua magna triangulares, quæ in tres dehiscen-
tes finduntur: semen in his rotundum ochri siue Erulie
magnitudine, rubens, splendens, quod resiccatum contrahi-
tur & nigrescit. Radices nouellis plantis rotundæ, & veluti
bulbi aut cepæ alicuius caput, ex qua crassiores fibrae depen-
dent: veteribus verò & multorum annorum plantis, multæ
sibi inuicem implicite, magnum veluti cespitem constituen-
tes, gustu feruidæ, vt & ipsum est semen. In Hetruria
& alijs Italia locis sponte exit; apud Belgas vix alijs locis
quàm in hortis reperitur. Florem edit Iulio & Augusto: se-
men Autumno maturatur.

PASSIM Spatulam foetidam appellant, pleriq; etiam
Iridem syluestrem: Germani, Wandtleuskraut à po-
tentia qua cimices enecat. Galli, Glayeul puant. Belgæ,
Wandtluscruyt. Rinckende lisch. Ruellius Sparganiū
existimat, sed nos pro Sparganio aliam exhibuimus ber-
bam, Sparganiū apud Dioscoridem descriptioni melius re-
spondentem: alijs Xyris esse videtur; quæ Fuchsi & Mat-
thioli aliorumq; constans est opinio, olimq; nobis placuit,
sed modo probari non potest. Si etenim diligenter Xyridis

152 DE XYRIDE EX DIOSCORIDE.

descriptio expendatur, parum cum ea Spatula foetida conuenireprehendetur. Nam folia Spatula foetida non latiora, sed quam vulgaris Iridis angustiora sunt: flos non è siliqua aliqua, multo minus triangulari, erumpit; sed nudus & nullo integumento prius quam debiscat contactus, idem aliquando purpureus, sed in medio nequaquam phœniceus: radices etiam non longæ & ruffæ, sed candidæ, & plurimā parte breues. Quæ omnia Spatulam foetidam à Xyrīde differre ostendunt. Xyrīdis siquidem folia latiora sunt quam Iridis; flos è siliqua erumpit, colore in medio phœniceus, & radices subruffæ, longæ, geniculatæ.

FACULTATE porro ac viribus Spatula foetida radices & semina calida sunt, ad tertium caliditatis gradum ac siccitatis pertingentes. Foliorum succus cimices enecat, parietibus ac lecticis illitus.

DE XYRIDE EX DIOSCORIDE.

CAP. XLI. II.

XYRIS Iridi similia habet folia, latiora verò & in summo acuminata; caulem è medio eorum cubitalem satiusq; crassum, in quo siliquæ triangulares, & ex ipsis flores purpurei medio eorum phœniceo: fructus in folliculis fabis, aut, ut Oribasii exemplar habet, Eruo similis, rotundus, rubens, acris: Radix geniculata, longæ, πυρρὰ siue ruffa.

Ἐυρίς Græcè & Latine dicitur, à nonnullis Xeris & Xyrīda, Galeno teste. Item ἰρίς ἄγρια siue sylvestris Iris, naxēs siue naxīos. Vulgo autem incognita stirps est.

TENVIVM partium, inquit Galenus, attractoris, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi, est facultatis cum radix, tum multo etiam amplius fructus; qui quidem & vrinam cieit, & lienes induratos sanare potest.

Dios-

DIOSCORIDES ait radicem contra capitis vulnera & fracturas facere, aculeos educere, & telum omne citra dolorem extrahere, admixta floris aris tertia parte, & Centaurij radice quinta, & melle: sanare & oedemata ac inflammationes cum aceto impositam: bibi ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, stillicidia vrinae, & diarrhoeas cum passo tritam: fructum per vrinam potenter mouere trioboli pondere ex vino bibitum: Lienem verò minuere cum aceto potum.


XYRIDIS radix, Plinio auctore, strumas vel panos vel inguina discutit. Precipitur, addit, vt sinistra manu lecta, ad hos vsus seruetur, colligentesq; dicant cuius hominis viriq; causa eximant.

DE PSEUDO IRIDE, SIVE SYLVE-
STRI IRIDE LVTEA.

CAP. XLV.

PSEUDO Iris folia quoque Iridis gerit, sed longiora & angustiora, dorso aliquantulum vtrinque extante: caules glabros, Iridis haud dissimiles, subinde bicubitales; atque in ijs flores complures, vti aliarum Iridum; nisi quòd horum superiora foliola omnino paruula sint, & eorum quae in veris Iridibus visuntur, quaedam veluti tantum rudimenta, ac prima lineamenta: siliquae crassae succedunt triangulares, in quibus semina multa simul compressa, ordine digesta, plana, cartilaginea, lentibus maiora: radices obliquae, longae, geniculatae, cirrosae, in propagines diuise, colore pallide rubentes, gustu adstringentes. Nascitur palustribus locis, humidis & riguis tractibus, Italia, Germania, Gallia, Belgioq; familiaris. Floret Maio & Iunio.

VVLGO, Germani, gel Schwertel & Drachen-



turt
balt
&
funt.
nre po
fider.
Iridos
cupare
FA
frigida
tris flu
quaque
Sunt et
fluere i

DE

Ac
vi Dis
di Simil
dentes
genicula
amaras
Acoron
ulane
fistulam
lib. 2. 5.
quis tras
pouider
longe, p

tourtz: Nostri, geel Litsch: Galli, Glayeul ou Flambe
baltarde. *Officina perperam olim Acoron appellauere:*
& maiori cum errore radicibus eius pro legitimo Acoro vsa
sunt. Nam non forma modo, quæ fortasse in aliquo conue-
nire potest, sed viribus potissimum, ab Acoro plurimum dis-
sidet. Plerique hac occasione Pseudo Acoron nominant: nos
Iridem luteam syluestrem, aut potius pseudo Iridem nun-
cupare maluimus, utpote Iridi quàm Acoro similiorem.

FACULTATEM habet radix huius adstringentem,
frigida & sicca secundo excessu; dysentericas & alias ven-
tris fluxiones cohibet: menses sistit, & sanguinem vade-
quaque manantem supprimit, in potu, aut aliter sumpta.
Sunt etiam qui solum gestantem eam, ab omni sanguinis
fluore tutum affirmant.

DE ACORO EX DIOSCORIDE, THEO-
PHRASTO, ET ALIIS.

CAP. XLVI.

ACORO cognatio & similitudo cum Iride est; solia,
ut Dioscorides ait, habet Iridis, sed angustiora, radices haud
dissimiles, sibi inuicem implicitas, non in rectum descen-
dentes, verum obliquas, & secundum terræ superficiem,
geniculis interceptas, subalbidas, gustu acres, (& modicè
amaras addit Galenus) odoris non iniucundi. Theophrastus
Acoron inter eas stirpes refert, quæ cum seminibus flores
edunt. Inuentu rarum Apuleius scribit, & non nisi cùm
flosculum produxerit, agnosci posse. Plinij de Acoro historia,
lib. 25. cap. 13. cum Dioscoride conueniret, nisi radices ni-
gras traderet, & minus venosas eas esse ac ruptu faciles su-
peradderet. Matthiolus Acoron folio depingit Iridis, radice
longa, obliqua, & in superficie geniculis distincta, quod pro
legi-

legitimo sibi ab Augerio à Bousbeeck Ferdinandi Imperatoris, apud Turcorum Imp. Oratoris missum memoria prodidit.

PROVENIT Acorum in Colchide, Galatia, & Creta insula. Optima, inquit Plinius, Acori radices Pontica; deinde Galatica, mox Cretica: sed prima in Colchide, iuxta Phasim amnem, & ubicunque in aquis: Matthiolus ad se missas, è Nicomedia quodam magna vastitudinis lacu collectas, refert. Est autem Nicomedia ciuitas Galatie, Colchidi vicina. Colchis verò Ponto Euxino vicina provincia.

PRÆSTAT, inquit Dioscorides, Acoron densum, candidum, non cariosum, plenum, odoratum. Plinius tamen Creticas candidiores Ponticis ait. Sunt autem ipso auctore, Cretica Ponticis minus probata.

Ακορος ἢ Ακορον, Græcis: Latinis Acorum dicitur. Nonnullis, teste Apuleio, Αποδοσίας, Venerea, radix nautica, singentiana, vnguentaria: Officina Europæ, magno cum errore, Calamum odoratum sine aromaticum appellarunt, pro Acoro pseudo Iridis radices, vt superiori capite ostendimus, perperam substituentes. Est verò & Acoros quibusdam Oxymirnes radix: ideoq; quidam hanc Ακορον ἄγριον vocare malunt, vt Plinius ait.

ACORI radix, auctore Galeno, in calfaciendo & resiccando tertij est ordinis. Decoctum eius, Dioscorides inquit, vrinas mouet: auxiliatur ad lateris, thoracis & hepatis dolores; item ad tormina, rupta & conuulsa: Lienem absorbit: prodest stillicidio vrina affectis, & à serpentibus demorsis: succus radices, qua oculorum claritati officiant, exerit. Miscetur etiam antidotis vtiliter hæc radix.

DE GLADIOLO. CAP. XLVII.


GLADIOLO folia sunt oblonga, angusta, striata, gladij modo mucronata, Iridis minora & angustiora: caulis laevis, teres, cubito longior; circa cuius summum flores sex aut septem distantes, in ordinem supra inuicem, ad vnam caulis partem digesti, ex sex foliis commissi, colore purpureo rubente splendentes: succedunt inde folliculi in rotunditate oblongi: semina in his tenuia, paleacea; radix gemini bulbi vno super alterum insidente, quorum superior Veris initio minor ac vegetior: inferior maior, sed flaccidior, qui paulo post perit, in plures subinde multiplicatus. Exin Gladiolus in pratis, in aruis inter segetes agro fecundo Italia pluribus locis. Cordus in frutetosis herbosisq; etiam nasci scribit. Et quibusdam locis maior ac procerior; alijs vero minor ac breuior reperitur. Floret Maio mense.

GRÆCIS ἔλιον, Latinis Gladiolus, & nonnullis ensis appellatur. Sunt qui φάσγανον, μαχαίρωνιον, μαχαίροφυλλον, ἀνὰ λόγιον, λιμνικὸν, ἄριον, Gladiolum segetalem, & linguam Ceruinam nominent. Plinius etiam Cypirum appellat, vt lib. 21. cap. 17. Bulborum generi, ait, quidam annumerant & Cypiri, hoc est, Gladioli radicem: dulcis ea est, & qua decocta panem etiam gratiorem faciat, ponderosoremq; simul subacta. Item cap. 18. Cypirus est Gladiolus, vt diximus. Sunt autem ea, quæ cap. 17. reperiuntur, ex Theophrasto de phasgano ad verbum translata. Phasganon autem idem cum Xyphio est: vnde Plinium perperam Gladiolo Cypiri nomen dedisse, eumq; hoc modo cum Cypiro confudisse euident est & manifestum.

Plinij error.

VALERIUS Cordus, Gladiolum Victorialem feminam nuncupat: alij Victorialem rotundam, & Germanicè, runde Seigwurtz / ad differentiam cuiusdam generis

Allij



Alij dunt
 & a Ger
 longa di
 testis ha
 C. &
 digerente
 possidet
 tam spica
 de melle
 di emplaj
 eodem au
 excitate
 rem puer
 infantib
 phrastu
 cem esse
 & immox

Sisy
 na, oblong
 hscult tre
 gues, & p
 deures
 delices foli
 fimbria m
 Gayum ver
 respondem
 quortione
 arctia me


Allij longa radice, quod in altissimis Alpium iugis reperitur, & à Germanis Seigwurtz/ Victoria radix, & Victorialis longa dicitur. Flores Gladioli Monacuccie ab Italis, vt testis Matthiolus, nominantur.

CÆTERVM radix Gladioli superior; attrahentem, digerentem, desiccantem etiam, vt Galenus ait, facultatem possidet. Dioscorides hanc cum vino, ait, & thure impostam spicula & aculeos extrahere, cum Lolij farina & hydromelite phigethla discutere, eamq; ob causam eiuscemodi emplastris addi: menses etiam appositam ducere. Ferunt, eodem auctore, superiorem cum vino sumptam, Venerem excitare: inferiorem verò steriles facere: quin & superiorem pueris enterocelici vtiliter ex aqua propinari. Plinius infantibus vrinam ciere, & vesica vitij illiniri addit. Theophrastus Phasgani, id est, Gladioli, radicem decoctam dulcem esse tradit, & tritam farina admixtam panem dulcem & innoxium reddere.

DE SISYNRICHIO.

CAP. XLVIII.

SISYNRICHIO folia sunt graminis bina aut terrena, oblonga & angusta: caulis rotundus, dodrantalis, in quo flosculi tres aut quatuor, pulchri, colore cerulei, verum fugaces, & paucis admodum horis vigentes, alternatim prodeuntes, forma quodammodo florum Iridis; ex nouem videlicet foliolis compositi: quorum tria deorsum reflexa, pro fimbria maculam habent plurima parte luteam; alia tria sursum versus aliquantulum eriguntur; tria verò reliqua respondentia ijs, quæ Iridis florum fimbriam contegunt, proportionem huic flosculo maiora & tenuiora sunt, sursumq; arrecta medium floris tenent, summa, extremaque parte diuisa:



dūja:
 tūda
 lo a
 qua m
 maior
 etenim
 rentia.
 ruit Me
 dūmo
 Hi
 nūces a
 dēter, q
 Plinio S
 fū lib.
 infra es
 beſcere.
 Quibus
 eſt oſter
 uellhas
 videatur
 paſſim eo

L. R.
 nū: Liri
 quibus ſe
 ſum Liri
 tūmale:
 M. A.
 ſimile: c
 ſynrichij ſp


diuisa: capitula inde succedunt oblonga, in quibus semen rotundum, paruum vti Rapi. radix bulbosa gemina, vno bulbo alteri superposito, sicuti Gladioli, sapore dulcis ac edulis, qua inuolucro quodam integitur reticulato: quod quidem maioribus spissius est; minoribus verò minus crassum: duo etenim huius genera esse videntur magnitudine sola differentia. In Lusitania & alibi apud Hispanos nascitur. Floruit Mechlinia Maio mense, in horto amplissimo & instructissimo D. Ioannis Brancionis viri generosissimi.

HISPANI Nozelhas, quasi nucas, siue paruas nucas appellant. Nobis Bulbi esculenti genus illud esse videtur, quod Græcè σισυρίχιον ἢ σισυρίχιον, & Latine à Plinio Sisynrichium appellatur. Scribit etenim Theophrastus lib. 7. Sisynrichij proprium esse, radicis quidem, quod infra est, augeri primum; Vere autem apparente hoc tabescere: quod verò supra est edule incrementum sumere. Quibus verbis geminam Sisynrichio radicem & edulem esse ostendit: vt hinc bulbum hunc, quem Hispani Nozelhas nominant, verum Sisynrichium esse colligendum videatur. Nam gemina, vt scripsimus, est; & in Hispanijs passim editur.

DE LIRIO. CAP. XLIX.

LIRII vox polysemos est, pluribus floribus communis: Lirium enim lilium est; & Narcissus lirium est, de quibus suis locis. Præter hæc verò & alia duo propriè dicta sunt Liria: vnum maius, Vere exiens: alterum minus, Autumnale; de quibus hoc capere agendum.

MAIUS Lirium folia habet Porro aut Asphodelo similia: caulem cubitalem: florem in summo Iridis aut Sisynrichij flori forma satis similem, sed maiorem quam Si-



fonic
 reum
 locu
 risque
 Fluri
 dilige
 L
 asper
 Vere p
 cisso e
 Es
 robul
 res bier
 unprop
 poterit
 dem bu
 sacra ad
 Nonnul
 sententi
 ad Lirio
 Al
 dentia
 inter qu
 pures vi
 10. aut
 le & al
 dusa. R
 pna cum
 Lvs
 nome des
 bolla alt
 alterum L

Synrichy : colore aut totum luteum , aut caruleum purpureum cum lineis luteis , quæ in inferioribus foliolis fimbriæ loco sunt: Radicem bulbosam, oblongam, cepæ similem. Plerisque Hispania Betica & Lusitania locis sponte gignitur. Floruit Antuerpiæ in horto Petri Coldenbergij fidißimi ac diligentissimi Pharmacopœi, mense Iunio.

LV S I T A N O S Lirio nuncupare accepimus. Et certè *λεῖριον* illud esse omnino videtur, quod à Theophrasto lib. 6. Vere post Liliū exire traditur; & aliud à Lilio & Narcisso est.

EST autem fortasse & idem hic bulbus, Apulei Hierobulbus, cuius meminit cap. 21. Nam cum Iris apud veteres hieris nuncupetur, hic verò bulbus Iridis sit flore; non improprie Hierobulbus, quasi dicas Iris bulbosa nuncupari poterit: nisi quis velit *ιεροβόλον*, veluti magnum & grandem bulbum dictum. Magna siquidem & grandia, tepæ & sacra, ab antiquis cognominata fuisse, haud in ambiguo est. Nonnullis placet Hierobulbum Colchicum esse, quorum sententiam modo libentiùs referimus, quàm refellimus: sed ad Lirium reuertamur.

ALTERVM Lirium folia promit angusta & splendētia, Leucoij bulbosi hexaphylli folijs perquam similia, inter quæ caulis exit triuncialis aut quadrantalis, in quo flores vt Colchici Germanici, colore melini siue lutei, dies 10. aut 12. perdurantes, sed qui sub vesperam, vt Calendula & aliorum quorundam recludantur. radix subest bulbosa. Reperitur & in plerisque Hispania locis. Autumno vnà cum Colchico florem facit.

LV S I T A N I S, Cibollina Alboraña dicitur, nomine diminutiuo, ad differentiam Scillæ, quæ ab ipsis Cibolla alboraña nuncupatur. *λεῖριον ἑτερον*, id est, Lirium alterum Theophrasti esse videtur, quod lib. 6. vnà cum Cro-

co florem facere incipere: atque statim primis imbribus florere, scriptum reliquit.

DE viribus horum Liriorum nihil compertum habemus, aut ab alijs traditum accepimus.

DE CROCO. CAP. I.

INTER flores & Croci flos est: sunt huic folia oblonga perquam angusta: flores pulchri, colore carulei, Colchici floribus similes, sed magis saturata purpura nitentes, & in singulis stamina oblonga terna quaternaque, colore flammeo subrubentia, odore cum inaruerint forti, & caput implente; qua ceteris partibus preferuntur, colliguntur, & croci nomine vel sola veniunt: radix subest bulbosa, carnosae, copiosa, & riuax.

SERITUR Crocus in pluribus regnis & provincijs, ubi in agris segetis modo late viret: ut in Cilicia Cyrenis, in Sicilia, Italia, Pannonia, Germania, Gallia, Britannia. Gaudet, inquit Theophrastus, calcari pedibus: ideoq; iuxta semitas & fontes pulcherrimus exit. Seritur depositis radicibus.

OPTIMVS, inquit Dioscorides, Coryceus: secundum locum tener, qui iuxta Corycum versus Lyciam, & in Lyceia Olympo: deinde ex Aegibus Aetholia. Cyrenaicus & Centripinus omnium in Sicilia viribus minus pollent. Qui ab Aquila Vestinorum vrbe adfertur, primum sibi locum in Italia vendicare, Matthiolus ait: sed Aquilino tamen praestantior, qui circa Viennam Pannonia, siue, ut vulgo, Austria, nascitur. In Gallia nusquam vegetior quam in Agnensi agro, & Narbonensi, Ruellio teste. Probatur etiam, in Britannia insula meridionali parte, quam Angliam vocant, natus: ex altera vero & Septentrionali, quam Picti & Scoti tenent, reprobus est.

OPTI-

OPTIMVS autem vbicunque natus, qui pinguis-
simus, recens fragranti odore, colore rutilo. Pessimus squali-
dus & situm redolens.

CROCVS Autumno florere incipit, statim, vt Theo-
phrastus ait, primis imbribus, Vergiliarum occasu. Florem
edit ante folia, quæ mox subsequuntur, & hyeme tota vi-
rent, æstate nullibi conspicua.

GRÆCIS similiter κρόκος, Latinis etiam Crocum di-
citur: Mauritanis Zaffaran; atque inde in Italia, Zaffa-
rano: Germanis, Saffran/Gallis, Safran.

CÆTERVM Crocus paululum quid adstringens ob-
tinet, sed superat in eo calefaciens qualitas, vt tota eius
essentia secundi sit ordinis excalfacientium, primi exsic-
cantium: proinde & concoquendi vim quandam obtinet,
adiuuante in hoc paucula illi adstrictione, vt Galenus ait.
Sodam, id est, Cephalalgiam, inquit Auicenna, facit, & ca-
piti nocet: id quod non exiguo, sed nimio suo vsu efficere po-
test. Vigiliis siquidem copiosus inducit, quæ modum exce-
dentes capiti & sensibus obsunt. Moderatus autem Croci
vsus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnum &
torporem excutit, latitiam gignit. Corroborat quoque Cro-
cus cor, thoracis crudos humores ad concoctionem perdu-
cit, pulmones aperit, & ab obstructione expedit, & ad hac
tam efficax remedium, vt subiinde phibificis in summo vitæ
discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum
reducatur, & vitam ad aliquot dies proroget, scriptuli di-
midij, aut ad summum integri pondo, cum passo aut vino
Pramnio, vel alio dulci exhibitus: quo modo etiam datus,
grauissimas subitò irruentes, citra febrim dyssyncæas, statim
& momento temporis tollere, non semel à nobis compertum
est. Crapulam etiam arcere, hoc modo sumptum, Dioscori-
des refert. Laudatur ad hepatis & fellis obstructiones, nec

166 DE HYACINTHO NON SCRIPTO.


non ad Regium morbum; atque hinc bonum colorem Crocum efficere, Dioscorides scribit. Additur eodem auctore ad omnes, quæ interaneorum causa temperantur potiones: sed nostra ætate ad eas potissimum, quæ menses, fœtus & secundas educunt. Urinam cit: Venerem excitat: ad vulua & sedis cataplasmata additur, nec non ad emplastra & cerata, veteres tumores & dolores discutientia: inflammationes herispelatodes mitigat: compositionibus auricularibus vtiliter admiscetur. Oculos ab ecimatis & exanthematis cum lacte, aut fœniculi, Rosarum uel stillatitio liquore præseruat illitus, & humorum in eos influxiones reprimat.

DE HYACINTHO NON SCRIPTO. CAP. LI.

HYACINTHO folia sunt oblonga, angusta, lenia & splendentia, Porri folijs angustiora & minora: caulis folijs viduus, glaber, teres, cuius coma florum pondere & mole, cum primum dehiscere incipiunt, grauata, deorsum recuruatur: flores oblongi, teretes, concavi, in latius se pandunt, per oras reflexi, colore ut plurimum cerulei, subinde albicantes, aut candidi siue niuei, aliquando etiam Viola nigra dilutam purpuram referentes: semen in siliquis triangularibus paruum, rotundum: radix bulbosa, candida, perennis, lento succo, uti & tota herba, plena.

REPERITUR Hyacinthus iste in pluribus regionibus, & in nonnullis maior ac præcior: in alijs minor & magis serotinus. Is etenim quem Italia & Belgium, orientalem nominat; folia habet pinguiora & latiora, caules crassiores, flores patentiores maioresq;, ac citius prodeuntes. Germanicus & Belgicus singulis minor, flores tamen plures gignit, sed serius exit. Reperitur in Germania, ut

Cordus



Cordus ait, in apricis quibusdam tumulis: in Belgio verò etiam in aruis, & iuxta agrorum margines, fruticibus aut arboribus confitos: & præcipuè quidem prope Mechliniam urbem, ubi copiosus nascitur.

FLORET Aprili & Maio mense, orientalis etiam Maritimo.

TERTIUS DIOSCORIDIUS Græci, Latini similiter Hyacinthum, ut Dioscorides auctor, Vaccinium quoque appellant. Vaccinium autem etiam Viola dicitur nigra, ut superius scripsimus. Cognominatur autem hic Hyacinthus non scriptus, ad differentiam nempe alterius superius descripti, qui luctus notas inscriptas habet.

DIOSCORIDES hunc Hyacinthum citra adiectionem nominat: nam alterum Hyacinthum Lilij purpurei nomine complexus videtur. Meminit huius Columella lib. 10. diversitatem coloris, quæ in floribus, uno versiculo complexus:

Nec non vel niveos vel cæruleos Hyacinthos.

Belgæ Hyacinthum istum Græcam appellationem retinentes Hyacinthen appellant. Ruellius, Gallis, Vaciet dici, auctor est. Sunt verò & alia multa huiusmodi Hyacinthorum species, ut recentiores indicant, de quibus capite sequenti.

HUIUS porro Hyacinthi radix ordinis est primi in desiccando: secundi verò completi, aut tertiij incipientis in refrigerando.

SEMEN leuiter extergit & adstringit ordine quidem tertio quadantenus exsiccans, ceterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis, auctore Galeno.

RADIX, inquit Dioscorides, cum vino albo pueris imposita, diu impuberes seruare creditur: aluum sistit: potæ urinam ducit, & à Phalangio commorsus opitulatur.

SEMEN

SEMEN contra serpentes auxiliatur: cum vino potum
Regium morbum expurgat.


DE ALIIS RECENTIORVM SPVRIIS
HYACINTHIS. CAP. LII.

DVOS Hyacinthos superioribus capitibus descripsimus;
vnum Lilij effigie scriptum: alterum paruum non scriptum.
Præter verò hos & alij multi, recentiorū iudicio sunt Hy-
acinthi. Nam omnes ferè anonymos flores è bulbis exeuntes,
aut Hyacinthos aut Narcissos iudicant; maiores siquidem
Narcissos, minores verò Hyacinthos.

INTER Hyacinthos itaque neotericos, primus folia
habet angusta quasi rotunda, bene virentia, per terram plu-
xima parte strata: cauliculos inter ea rotundos, glabros,
palmo longiores, in quorum summo flosculi parui, rotundi,
cavi, hiantes, colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato:
post quos siliqua membranosa triangulares, in quibus se-
men paruum nigrum: radix subest bulbosa. Peregrinus no-
bis hic bulbus est, neque vsquam in Belgio sua sponte exit: in
hortis satus facillè comprehendit, & in plures bulbos citò
multiplicatur. Folia ante Hyemem exeunt: cauliculi primo
Vere: flores Martio.

HYACINTHV M Fuchsius appellat, & alteram eius
speciem facit. Nobis bulbus quidam esculentus esse videtur.
Sunt autem esculenti bulbi complura genera, ut Plinius &
Theophrastus tradunt.

ET genera quidem, inquit Plinius, Græci hac fecere:
Bulbinen, Setanion, Pythion, Acrocorion (nonnulli Acro-
corodon legunt) Aegilopa, Sisyrrichion. Quæ & Theophra-
stus, sed tamen non omnia lib. 7. cap. 13. refert. Sunt au-
tem quorum ipse meminit, λευκίδιον, & βοδάλιον, & ὁ πικτιών




d. ule
 scribet
 porri
 genus
 richio
 Acgilop
 suffici
 Theophr
 Acrocon
 numero
 fonte vi
 breuitat
 iste Acro
 stre est
 nomen
 Alho in
 Hy
 cinthus,
 porri foli
 bus, ma
 eodem qu
 sorio dep
 nullus res
 sed nudat
 ptione ex
 uersum i
 ro esse ce
 Qui
 bet longa
 de doctri
 que circa
 rui vero j

ἡ νύξ, ἡ τρώπον τίνα τὸ σισυρίχιον. Leucoion inferius describetur. Bulbinen, Plinius ait, Gracos appellare herbam Bulbine. porraceis folijs, rubicundo bulbo. Setanium, cepa quoddam genus est, ut Theophrastus & Plinius testantur. De Sisynrichio iam ante scripsimus. Pytion, Cyix, Acroscorodon, Aegilops, cuiusmodi bulbi sint, nondum certò reperire licuit: suspicandū videtur Κόινα & Acroscorodon idem esse. Apud Theophrastum enim νύξ πυτιώνα: apud Plinium eundem Acroscorodon ordine succedit. Ex horum autem bulborum numero aliquem esse, hoc Hyacinti vulgo dicti genus verisimile videtur; sed quis tamen sit, propter nimiam veterum breuitatem explicari nequit. Si coniectura vti licet, bulbus iste Acroscorodon est: si non, Acroscorodon alij genus sylvestre est. Nam folia, alij quandam similitudinem habent: nomen autem Acroscorodon similitudinem aliquam cum Allio indicat.

HVC autem similis est & alter quidam spurius Hyacinthus, folijs similiter per terram stratis, sed latioribus & porri folijs similioribus, caule crassiore, floribus candicantibus, maioribus quam alterius. Reperitur in hortis. Floret eodem quo prior tempore. Matthiolus hunc pro bulbo vomitorio depingere videtur, nullis interim notis eum describens; nullis testimonijs aut rationibus sententiam suam adstruens; sed nudam qualemcunque imaginem cum nominis inscriptione exhibens. Nos bulbū vomitorium ab isto planè diuersum infra descripsimus: & hunc ex esculentorum numero esse censemus.

QVI tertius est inter neotericos Hyacinthos, folia habet longa, pingua, aliquantulum lata; caules longos, subinde dodrante altiores: flores à medio sursum versus, vndeque circa caulem multos, paruos, cauos, primum purpurei; vbi verò flaccescunt, obsoleti coloris, (reperiuntur & candidi)



D
 didi
 ruffam,
 Germ
 & in fil
 Hy
 fua, Tra
 flueftre
 pellat, al
 Non eft
 quoddam
 enim Bu
 Videtur
 gnomina
 fum bull
 (parium
 quorum
 Scille &
 & illoru
 Sy
 Martio
 lo, ab im
 radice be
 cet. Ne
 fe, affri
 al cogni
 N
 di Orien
 pote memo
 Qu
 filig efi
 lualo bre
 fennia v


didi) cacumine comofo: radicem, vti aliorum, bulbosam, sub-
ruffam, ac fubpurpurei coloris. Reperitur, Fuchfio teſte, in
Germania nemoribus: vt autem Matthiolus, inter ſegetes
& in fyluis. Aprili aut Maio floret.

HYACINTHI ſpeciem, & quidem primam, Fuch-
ſius, Tragus & Matthiolus faciunt: nonnulli Hyacinthum
fylueſtrem nuncupant. Germani alicubi *Breunling* ap-
pellat, alibi *Bonds knoblauch*; id eſt, Allium Caninum.
Non eſt tamen Allij aliqua ſpecies, ſed bulbi eſculenti genus
quoddam, veluti Bulbina; cui certè ſimillimus eſt. Bulbo
enim Bulbina rubet, & Porri folia Plinio auctore habet.
Videtur autem hac ex Africa bulbus eſſe, quem Afrum co-
gnominant. Huic ſiquidem Dioſcoridis *ρυψών*, id eſt, ruſ-
ſum bulbum eſſe ait. Sunt autem qui velint hunc tertium
ſpurium Hyacinthum Scilla aut Pancratij ſpeciem eſſe:
quorum iudicium ea propter à nobis non probatur, quòd
Scilla & Pancratij bulbi grandes ſint, huius autem paruus,
& illorum comparatione exiguus.

SVCCEDIT huic quartus ex ſpurijſ Hyacinthus à 4
Matthiolo depictus, folijs oblongis ac latis: caule longiuſcu-
lo, ab imo ferè vſque ad ſummum ſoſculis circumueſtito:
radice bulbosa: quantum quidem ex eius icone colligere li-
cet. Neque enim qualis & huiusmodi ab ipſo nuncupatus
ſit, aſcripſit, ſed ſolam imaginem exhibuit: quaſi illa ſatis
ad cognitionem eius eſſe poſſet.


NUNCUPAT autem eum Orientalem alterum; &
ab Orientali ac legitimo Hyacintho, cuius antecedente ca-
pite meminimus, ſecundum facit.

QVINTVS appellatus Hyacinthus, qui ſerotinus eſt, 5
folijs eſt anguſtis, paruulis, & minoribus, quàm primi: cau-
liculis breuib; tres aut quatuor digitos altis; ſoſculis in
ſummo raris, caruleis; ſtaminibus in medio exiguis: ſemine
in ſili-



in filiquis triangularibus exiguo : radice parua & bulbosa.
Nascitur Gallia quibusdam prouincijs, vt iuxta Patiflorum
Luteriam. Floret exitu aestatis Augusto aut Septembri.

AUTVMNALEM Hyacinthum ea de causa & se-
 10:11-



rotinunt nominant : neque aliud eius nomen cognitum habemus.


6 PRÆTER hos & aliū quendam pro Hyacintho bulbum Leonhartus describit Fuchsius, folijs modò binis, modò ternis, latiusculis, Porri minoribus : floribus circa cauliculi summum sparsis, multum & radiantis stellæ ferè similitudine parentibus, colore cæruleis aut candidis : quos succedunt capitula rotunda, ochri magnitudine, in quibus semen milio simile : radice bulbosa, rotunda. Reperitur plerisque Germaniæ locis, lato, pingui, sed inculto solo. Martio, quandoque etiam Februario flos exit.

GERMANI blo Mertzzenblumen & blo Hornungs blumen appellant. Fuchsius pro Hyacinthi specie depinxit. Plerique Hyacinthum stellatum ab ipsa floris effigie vocant. Existimauimus aliquando Satyrium esse, verum hæc modò opinio displicet. Satyrio enim caulis est cubitalis ; folia Liliij, bulbis mali magnitudine : bulbo verdè isti, folia paruula, angusta, bulbus exiguus, & cauliculus breuis.

CÆTERVM quod ad vsum attinet horum spuriorum Hyacinthorum, nostris quidem aut in cibatu, aut in medicamentis nullus est ; proinde & vires ac facultates eorundem inexplorate : soli flosculi in hortis gratiam inueniènt.

DE BVLBO LEVCANTHEMO, SIVE ORNITHOGALO. CAP. LIII.

LEVCANTHEMO bulbo folia multa sunt & angusta, graminis minora : caulis inter hæc exit dodrante minor, rotundus, glaber, absque folijs : flores in summo dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei viroris, intus candidi, ex sex foliolis commisti, exiguis lilijs, præsertim prius quàm adaperiuntur similes ; qui Sole quidem splendente patent,



M

tent, noctu verò & cum aër nubilus etiam interdiu reclusi permanent: capitula succedunt triangularia, Cachryos semini similia, in quibus semen exiguum: radix bulbosa, lento succo plena, sapore ut plurimum insipida & aquea, cum obscura tamen quadam acredine. Reperitur in agris frumentarijs, apud Brabantos locis compluribus. Maio mense flores edit.

Ornithogalon
Matthioli.

IN Belgio, *Welt ayeuyt* appellatur, à Græcis *ὄρνιθος γαρύ*, quod à Plinio Ornithogale dicitur. Matthiolus alium omnino bulbum pro Ornithogalo depingit, caule videlicet foliosum, à nostro hoc Ornithogalo, quod Dioscoridis legitimum est, ea de causa differentem.

Ornithogalon
Ruellij.

DESCRIBIT porro & aliud Ornithogalon Ruellius lib. 2. cap. 77. quod à rusticis in Suesionum agris eruitur: radice, inquit, bulbaceam speciem præ se ferente; è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor adnatis in cacumine: folijs, in capillamenta quadam extenuatis: floribus exiguis, foris herbaceis, intus lacteo candore candicantibus, qui simul coaceruati, veluti panicula quadam compacti callo squamatim coherentes, in pilulam extuberant, nucamentum pineæ nucis representantem: radix in orbem ferè collecta est, cortice pullo, candidissima intus carne, pulpa uè perquam odorata. Vere vel æstate cum fronde virescit: hyeme vel autumno cum exarantur agri, radicitus velluntur: diu seruari potest: & ubi annonæ premit inopia, plebis rusticæ famem & ieiunia Castanearum more satiat, nec aliud humo genitum promptius in cibos cedit, cum frugum penuria gliscit. Mirè suis expetitur: rura ex agris sponte natum gratiorem cibum non norunt: lautiores etiam mensas ditiorum non reformidat. Pueris non incognitæ radices, qui propter astantes cum aratro terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos vomere, colligunt, multo Castaneis suauis-

frutiores: quibus & crudis, & in cineribus incoctis vescuntur. Suesbionensis ager, Churlos vocare consuevit: Hactenus Churli. Ruellius.

AT nobis huiusmodi radix, non Ornithogalon, sed Bulbocastanon quoddam esse videtur. Radix enim est bulbi forma, sapore Castanea; quale Bulbocastanon esse, nomen ipsum satis indicat.

DESCRIPSIMVS tamen nos in historijs stirpium vulgari lingua editis, aliud & huic dissimile Bolbocastanon; solijs videlicet Apij tenuioribus ac minoribus, ad Anethi accedentibus: caule tenui, dodrantali: floribus in umbellis candidis: semine paruo, odorato: radice rotunda, & quando inaruit rugosa, foris nigra, intus candida, sapore inter Pastinacam & Castaneam medio; quod in Zelandia, Hollandia, ac etiam Britannia agris frumentarijs reperitur, & Alexandri Tralliani Βολβοκασάνον sive ἀγρίον κασάνον simillimum est. Sed ad Ornithogalon excurrens reuertatur sermo.

DIOSCORIDES Ornithogali fructum, ait, vna cum pane coqui, vt Melanthium: radicem verò bulbosam, & crudam, & coctam edi.

DE BULBO SYLVESTRI.

CAP. LIIII.

BVIBO superiori capite descripto, non multum absimilis videtur, quem Leonhartus Fuchsius, & Hieronymus Tragus, sylvestrem agnominant: sunt tamen huic folia pauciora, & vnicum aut duo tantum, angusta & porracea: caulis brevis, tener, rotundus, dodrantalis, aliquot in summo adnatis, in quibus flosculi stellatim radiati, bulbi Leucanthemi minores, colore ex herbaceo in luteum elanguescentes;

tes; staminibus in medio capillaceis; capitula semen feren-
tia triangularia; radix bulbosa, lenti succi, nullius odoris,
sapore aliquantulum, sed perobscure Cepam referens. In
Germania locis umbrosis ad margines pratorum exire ser-
tur. Martio ac Aprili floret. fructumq; perficit.

GERMANI *Feldzwibel* / *ackerzwibel* appel-
lant; quasi dicas Cepam agrariam. Ex sylvestrium & spon-
te nascentium bulborum est numero. Quo nomine à vete-
ribus nuncupatum fuerit non constat.


FACULTATES autem huius incognita sunt. Hie-
ronymus tamen Tragus, ex bulbo sub cineribus cocto, cum
melle cataplasma, vlceribus depascentibus vtiliter imponi
refert.

DE NARCISSO. CAP. IV.

NARCISSI genera, Dioscoride auctore, duo sunt.
Vtriusque flos albus est: sed vnius medio purpureus; alte-
rius luteus.

I MEDIO purpureus folia habet virentia oblonga, Porri
folijs similia: caulem angulosum, absque folijs, dodrante aut
pede altiore, & in summo florem è membrana erumpen-
tem, ut plurimum vnicum, subinde geminum, mediocriter
amplum, odoratum, ex sex candidis foliolis congestum, in
quorum medio brevis calyx est circinata rotunditatis, pur-
purei per oras coloris, intra quem stamina brevia, cum api-
cibus subluteolis: capitula inde angulosa: semen in his ni-
grum: radix bulbosa Cepas similis, quæ nucleos ex se demit-
tens in multos facile bulbos multiplicatur. Reperiuntur au-
tem huius generis tres, forma, colore, aut odore nequa-
quam; sed floreendi tempore differentes; magnitudine etiam
nonnihil, sed parum, dissidentes. Maiores medij; praecoces
& serius prodeuntes minores sunt.

ALTER



2 ALTER Narcissus medio luteus, folia habet longiora, latiora, & aliquantulum minus virentia: caules proceriores, crassiores, & in singulis flores tres aut quatuor, prioribus similes, sed medio luteo; semen & radicem bulbosam similia.

3 HVIVS generis & alius quidam tertius Narcissus est, folijs non modo quàm primus, verùm etiam quàm Asphodelus, latioribus longioribusq; floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus, candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multo tamen quàm Narcissi lutei sylvestris brevior: radix similis est & bulbosa.

4 IAM & quartus quidam est Narcissus antedictis forma similis, sed per totum florem & medio quoque candidus.

5 SVNT & Narcissi multiplicibus floribus, cum primum alterius generis, folijs & bulbis alijs haud dissimiles. Ita varia semper natura, & ad stirpium herbarumq; genera multiplicanda fecunda; tum ad ea permutanda prona; praesertim si cultus mangonio adiuuetur, vel in alium locum stirpes transferantur. Hac etenim plurimum posse ad stirpium mutationem, & alibi scripsimus.

EXEUNT qui medio purpurei sunt plerisque Galliae locis, & apud Heduos ac Sequanos, in pratis. Dioscorides in montibus potissimum nasci tradit. Theocritus in pratis Narcissum gigni testis est, Eidyllio 20. ubi Europam cum suis prata ingressam, bene spirantem Narcissum carpsisse, canit his versibus:

Αἰ δ' ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἐσήμερον ἀνθεμόεντας,

Ἀλλ' ἐπ' ἀλλήλοισι τότ' ἀνθεσι θυμὸν ἔτερπον,


Τῶν ἢ μὲν νάρκισσον ἐϋπνοον, ἢ δὲ υἰάκινθον: Id est,

Florida sed postquàm venère in prata puella,

His illa: hac alijs se floribus oblectabant,

Narcisso illa quidem bene olente, atq; illa Hyacintho.

FLO-



FLORENT in Belgij hortis , prioris generis praecoces Narcissi , initio Aprilis : medijs sub finem , seriores Maio mense : medio lutei eodem ferè quo primi generis medijs , tempore.

GRÆCI huiusmodi flores *Napulaσous*, Latini similiter Narcissos nuncupant. Belgæ, *Narcissen* & *Spaensche Jenetten*. Germani, *Narcissen roßlin*. Dictum autem Narcissum Plutarchus in Symposiis , quasi nervos hebetantem , & torpidas facientem grauitates , refert. Quapropter & Sophocles magnorum subterraneorum deorum coronamentum eum vocat , quod scilicet defuncti & morte torpidi , torpido flore merito coronarentur . Appellatur autem Narcissus etiam *λεῖγιον*, & Apuleio teste, *ἀνδρος, βολεός ἐμετικός, αὐτογενές*. Lirium autem Theophrastus eum appellat, cui latius est herba folium, & flos melinus longior, qualis vtrique tertius est ; quem & ait sponte germinare : qua de causa *αὐτογενές*, id est , à seipso genitus , vel per se nascens , dici potest. Sunt verò & alia Liria sui generis , de quibus supra scripsimus : & Liliū quoq; Lirium est. Iulius Pollux , Homerum Lirij appellatione , complecti omne florum genus , auctor est . *Ανδρος* autem Narcissus propriè montanus est , eo quòd ab aquis remotus proueniat . *Βολβοῦ ἐμετικόν* nomen ab effectū habet : Dioscoride siquidem auctore Narcissus etiam vomitum concitat . Est tamen & alius bulbos vomitorius propriè dictus , de quo capite subsequente.

DE priore horum Narcissorum videtur scripsisse Theophrastus lib. 7. vbi Narcissum ter florere , vti Scillam refert ; & tria quoque arandi tempora , vti illam demonstrare . nam Scilla quidem caulem florum ternos exortus ostendere ait : Narcissum autem caulem non habere alterum , iuxta eum qui floris est , fieri autem non potest , vt ex eodem caule

ter

ter floreat. proinde tres differentes bulbos esse consequitur, qui tribus temporibus floreant, vti Narcissum medio purpureum facere iam scripsimus. Hunc etenim ter florentem existimare possunt, qui omnes tres vno eodemq³ loco reperiunt, & differentes bulbos esse non animaduertunt. Idem verò & hic Narcissus medio purpureus ille est, quem Plinius lib. 21. cap. 19. purpurei floris esse scribit. Narcissi duo genera, inquit, medici in vsum recipiunt: vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Nam purpurei floris Narcissum nuncupat, cui medium purpureum, vt eiusdem lib. cap. 5. seipsum explicans ostendit. Huius alterum, ait, genus flore candido, calyce purpureo. Calycem autem dicit, quod in medio flore, circuli instar, & stamina ac apices continet. De hoc etiam Narcisso Vergilius in Bucolicis ecloga quinta:

Pro molli Viola, pro purpureo Narcisso,

Carduus & spinis surgit Paliurus acutis.

SECUNDI verò & potissimum tertij Narcissi, Ouidius tertio Metamorphoseon lib. meminit: vbi Narcissi formosi adolescentis mutationem in florem sui nominis describit, hoc carmine:

Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem

Inueniunt, folijs medium cingentibus albis.

DE tertio etiam scripsit Theophrastus lib. 6. De alio siquidem hoc loco, quàm lib. 7. agit. Libro siquidem 7. folium ei tribuit angustum, quale vtrique primus habet: sexto verò latius quàm Asphodeli, vti tertij est: quod diuersis locis, de differentibus Narcissis eum scripsisse, conuincit. Scribit autem Theophrastus lib. 6. Narcissi florem esse luteum, siue melini coloris, quod de medio floris calyce accipiendum esse, Ouidij testimonio iam ostendimus. Exemplaria penè omnia μέλαινα τῇ χροιᾷ habent, quod Hermolao & Martello occasionem dedit, vt Narcissi florem nigrum esse exi-

Theophrasti
locus
emendatus

stimauerint. Sed pro μέλας reponendum est κίλινος. Est autem Melinus color, idem qui ochra siue luteus.

PVTATVR autē & hic Narcissus ferotinus à Theophrasto haberi, & Autumno demum florere, propterea quod in ijs quæ extant exemplaribus, huius descriptionem mox subsequantur hæc verba: μετὰ γὰρ ἀκτοῦ ὄσων ἡ ἀνθοῖς, καὶ περὶ ἰονμπερίαν, id est, post Arcturum productio floris est, & circa æquinoctium. Verum ad Narcissi historiam hæc non faciunt: inter Narcissi siquidem descriptionem & verba ista, defectus ac hiatus est. Nec spectant etiam ad Croci, uti Conradus Gesnerus in appendice scribit, quam Germania suis hortis subiecit: sed ad Lirij alterius historiam pertinent, quod eodem libro, paulo inferius Theophrastus vnā cum Croco τοῖς πρώτοις ὕδασι, hoc est, primis imbribus, siue Autumno, florere ait; ut diligenter vtrumque locum expendentibus manifestum statim fiet.

Ac totidem quidem, quos propriè Narcissos dici opinamur, obseruare nobis contigit. Sunt tamen & alij quidam lutei appellati Narcissi, de quibus in mox sequentibus capitibus.

MVLTORVM etiam Matthiolus icones exhibet; quos tamen excepto primo, non Narcissos, sed omnino alterius generis flores esse iudicamus. Nam quos secundo, tertio, & octauo locis depingit, Scillarum aut bulborum litto-
ralium species videntur; quales, & alibi & in Narbonensi Gallia, plerisque locis sponte exeunt. Quartus similis illi bulbo, quem Marcellus Vergilius cap. de Narcisso in commentarijs suis his verbis describit:

Narcissus
Marcelli
Vergilij.

Nos in Apenninis montibus his nostris, frequentem vidimus florem Augusto & Septembri mensibus florentem, figura Liliij, dodranti altitudine, folijs qualia in Narcisso describuntur, singulari caule, iisdemq; alijs omnibus, excepto


cepto colore, qui nec candidus, nec purpureus, ut Plinius docet, sit, sed inter candidum & luteum colorem, nullius aut exigui odoris; vidimus & in mitioribus collibus enatum, sed non tam speciosum & magis albicantem. Quintum Gesnerus & passim omnes Tulipam vocant. Sextus & septimus Leucoia sunt bulbosa, flores à Narcissis multum differentes, de quibus infra.

CÆTERVM Narcissi radix, ut Galenus ait, usque aded exiccandi facultate pollet, ut & maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones usque, quæ circa tendones accidunt: habet verò quiddam absterforium & attractorium. Eadem, auctore Dioscoride, siue estur, siue bibitur, vomitus mouet: prodest ambustis ab igne cum melle trita: præcisos quoque nervos agglutinat imposita: luxatis item malleolis diuturnisq; articulorum doloribus trita cum melle, & imposita subuenit: expurgat ephelin & alphum cum vrtica semine & aceto, at cum eruo & melle vlcera sordes expurgat, & abscessus qui agrè maturantur rumpit: educit & aculeos infixos cum Lolij farina & melle.

DE NARCISSEO LVTEO IUNCIFOLIO,
SIVE BVIBO VOMITORIO.

CAP. LVI.

HVIC Narcisso folia sunt oblonga, angusta, crassa interim propemodum rotunda, admodum lauia & flexibilia, iuncis cum lauore, tum colore, & quodammodo flexibilitate, nec non rotunditate similia; inter quæ medius exit caulis; in summo cuius, flosculi tres aut quatuor, vel plures, odorati, Narcissis forma similes, verum minores & colore per totum florem lutei: radix bulbosa, candida, tenui nigra



membr
 floris.
 P
 lent, lo
 dicere p
 bus von
 calligi p
 vxi ta
 id ad f
 Bulbus
 multo lo
 circa qu
 cisso In
 quam al
 te inuic
 tag, mu
 membr
 Q
 praelus
 conit at
 aut si de
 mutum f

DE

LVI

finita pr
 aque in
 eorum ca
 lire per io

membrana integitur. Nascitur plerisque Hispania locis sua sponte. In Belgio Aprili mense florem promit.


HISPANI à similitudine, quam folia cum iuncis habent, Ionquillas nuncupant: nos Narcissum Iuncifolium dicere possemus. Dioscoridis est Βολβός ἐμετικός, siue bulbus vomitorius. Id quod ex ipsa bulbi vomitorij descriptione colligi potest; qua sic habet: Βολβός ὁ καλούμενος ἐμετικός ἔχει τὰ φύλλα ἱμαντῶδέστερα, καὶ πολλὰ μακρότερα τοῦ ἐδωδίου ῥίζαν ἐοικῶσαν βολβῷ, περὶ δὲ φλοιὸς μέλας. Id est, Bulbus nuncupatus vomitorius folia habet flexibilia & multo longiora quam esculentus; radicem bulbo similem, circa quam membrana est nigra. Quae descriptio huic Narcisso Iuncifolio simillima est: folia ei siquidem sunt multo quam alicuius bulbi ἱμαντῶδέστερα siue flexibilia, utpote iuncea propemodum lentoris; & perquam longa, longiora quàm esculenti bulbi; & radix in tenui nigra membranula reconditur.

QUIBUS autem facultatibus Narcissus Iuncifolius praeclatus sit, nullo recentiorum experimento aut testimonio constat. Dioscorides verò bulbi vomitorij radicem si edatur, aut si decoctum eius bibatur, vesicae malis auxiliari, & vomitum facere, memoria prodidit.

DE NARCISSEO LUTEO SYLVESTRI,
SIVE PSEVDONARCISSEO.

CAP. LVII.

LUTEVS Narcissus sylvestris, folia Porri aut Narcissi similia promit, sed breviora ac minora: caules dodrantales, atque in singulis flores singulos Narcissi similes, sed medio eorum calyce longiore, oblongioris calathi similitudine, colore per totum luteo, absque odore: capitula rotunda, oblonga, in



ga, in quibus semen: radix bulbosa, vt aliorum Narcisso-
rum. Reperitur non paucis Belgij locis, circa margines
agrorum & veruactorum, humido praesertim solo, & in
siluis locisq; arboribus confitis: & similibus quoque cum in

Germa-

Germania, tum in Hispania: transfertur etiam in hortos. Floret Februario mense: Germani ea de causa *Beel Hornungs blumen* / id est, nostrate dialecto, *geel Sporkelbloemen* / nuncupant. Februarius enim Germanis *Hornungs mont* Belgis, *Sporkelle*.

APPELLANT vero & hunc *Narcissum Belga*, *geel Tydeloosen*: Latine autem vulgo *Narcissus luteus* & *Pseudo-Narcissus* dicitur.


CÆTERVM quod ad vires attinet, recentiorum quorundam experimento exploratum est, *Narcisi* huius lutei sylvestris radicum decoctum per alium lentos & pituitosos humores, nec non serosos expurgare; & his prodesse, qui crudorum copia grauantur humorum; semine anisi & zingiberis nonnihil additis, quæ ut minus noceat, minusq; molestum sit ventriculo, adiiciuntur.

DE LEVCOIO BVLBOSO.

CAP. LVIII.

LEVCOII bulbosi tria nobis obseruare genera contigit: vnum trifolium, alterum hexaphyllon, tertium polyanthemum cognominari potest.

PRIMUM folia ex singulis bulbis bina promit, oblonga, angusta, in virore albicantia, folijs *Pseudo-Narcisi* lutei colore proxima, inter quæ medius exit cauliculus palmaris, in cuius summo flos è vaginula oblonga erumpit, à tenui pediculo deorsum dependens, foliolis tribus constans maioribus candidis, intra quæ alia tria breuiora ac minora, pallide virentia, & aliquantulum striata; in medio floris stamina cum apicibus luteis: radix bulbosa est, foris obscura & eius cuius Castaneæ nucleus coloris, quæ facile in plures bulbos multiplicatur. Peregrinus Belgio flos, sed Italiae & alijs



alijs regionibus familiaris. Exit prematurè Februario mensè, reliquos omnes ferè flores antecedens.


LEVCOION videtur bulbosum Theophrasti, cuius meminit lib. 7. vbi bulbos recenset; & quod lib. 6. primum sese ostendere ait, & emicare vbi calum clementius est, statim etiam nondum hyeme exacta; vbi verò immitius postea. Nos ad differentiam sequentium, non inconcinne Trifolium bulbosum Triphyllon, & Violam bulbosam trifoliam, nuncupari posse existimauimus, à tribus nempe floris foliolis.

PROXIMO generi folia similiter sunt angusta, Porri & Pseudo-Narcissi similia, sed breuiora, virentiora, lauiora & magis resplendentia, versus terram aliquatenus reflexa: cauliculi tenuer, palmares, flores in singulis singuli, rarissimè gemini, deorsum quoque penduli, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis commissi, staminibus in medio cum luteolis apicibus: semen in rotundis capitulis paruum, rotundum, laue, & colore flauum: radix candida & bulbosa in plures faciliè propagatur. Plerisque Germaniæ superioris locis in vmbrosis & humidis syluis reperitur: apud Belgas hortorum areas exornat. Floret eodem quo superius tempore, aut non multo post.

GERMANI, Weiß Doornungs blumen: Nostri Witte Tydeloosen appellant.


LEVCOII bulbosi genus esse manifestum est; quod exaphyllum, non abs re, à sex floris foliolis cognominatur. Matthiolus cum istud, tum superius Narcissi speciem facit, vt cap. de Narcisso scriptum est.

TERTIVM Leucoion bulbosum caule & folijs secundo simile est, maius tamen ac procerius: florem in singulis cauliculis non vnicum, sed quinq; aut sex & particulatim quidem florentes, profert, alterius floribus forma & magni-



magnitudine per omnia similes. Est & hoc nobis hortense
tantum. Non primo Vere, cum alijs duobus, sed multo post;
Aprili videlicet demum mense, vna cum Narcissus floret.

VIOLA



N 2

VIOLÆ siue Leucoij bulbosi species haud dubiò quadam est; sed serotina.

AT de facultatibus horum Leucoiorum nihil quod adferamus habemus, cum à veteribus de ijs nihil reperiatur proditum, & à recentioribus nihil quoque obseruatum.


DE TVLIPA. CAP. LIX.


EX bulbosorum florum numero & Tulipa est flos peregrinus; cuius differentes sunt species: quadam maiores sunt, alia minores.

MAIORIBVS forma eadem satis omnibus est; folia eis bina aut terna, crassa, oblonga, lata, per oras subinde modicè reflexa, quæ cum primum erumpunt, modicè rubere videntur, adulta verò albicant: caulis inter ea exit pedalis aut paulo altior, cui vnicus flos insidet sursum spectans, è senis foliolis, patenti profundiori & aliquantulum angustioris oris cyathò, aut inuerso huius formæ pileo quodammodo similis; staminibus in medio croceis: color flori subinde luteus est, aliquando dilutè quasi purpureus, non raro rubet, medio tamen luteo, & quandoque etiam extremis foliorum; odor nullus; semen cartilaginosum, planum, in capitulis nascitur, quæ maturato semine in tres debiscunt partes. radix bulbosa est, Narcissi bulbus haud dissimilis. Differunt inter se magnitudine nonnihil flores; maior serè luteus, minor rubeus; medius qui purpureus.

MINORES Tulipa folijs sunt angustioribus, & serè porraceis; cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus & minus in latitudinem sese pandentibus: bulbis minoribus.

IN Trachia & Cappadocia Tulipa exit: Italia & Belgio peregrinus est flos. Minores alicubi in Gallia Narbonensi





nensi nasci feruntur . Aprili mense Tulipa^s florem Belgium videt.

TVRCICO & peregrino nomine Tulipam recentiores nuncupant , à Dalmatico pileo Tulipa dicto, cuius formam referre patens flos videtur . Quo nomine à veteribus hic flos dictus fuerit, non constat . Suspiciari quis posset, τυτιώνα esse , si edulis bulbus esset , & cogendo lacte efficax . Nam τυτιών quidem à Theophrasto inter edules bulbos re- τυτιών. fertur ; & herba est , qua lac cogitur , vt ait Hesychius . Conradus Gesnerus Tulipam Satyrium esse existimauit , & quidem Erythronium , quod videlicet flore vna species rubeat ; aut omnino Satyrj aliquam speciem . Cum quibus an conueniat , & quantum , ex subscriptis Satyrionum descriptionibus relinquimus diligentius considerandum .

DE viribus autem & facultatibus Tulipa nihil comperit habemus , aut à quoquam scriptum reperimus .

DE SATYRIIS EX DIOSCORIDE ET
ALIIS. CAP. LX.

PRÆTER Orchies dictos , quos etiam Satyria Plinius & Apuleius appellant , duo Satyrj genera Dioscorides esse tradit : vnum τριφύλλον siue trifolium , alterum cognomento ἐρυθρόν .

TRIFOLIUM folia fert tria deorsum reflexa, Lapathio aut Lilio similia , verum minora & rubentia : caulem ῥίζον, id est, tenuem siue nudum, cubitum longum ; florem Lilij specie, album : radicem bulbosam, vt malum, πυρρὰν siue fuluam, intus vt ouum candidam, gustu dulcem, & origratam . Idem Satyrium Plinius lib. 26. cap. 10. etiam, sed paulo aliter describit : Folia ei siquidem non Lapathi aut alterius Lilij, sed rubri Lilij esse ait , que multo angustiora

Plinij lo-
cus ani-
mauerit-
tur.

& minora sunt quàm candidi Lilij: & radices ei geminas, contrà planè quàm Dioscorides, facit. Verba Plinij sunt: Graci Satyrion folijs Lilij rubri minoribus, & tribus non amplius e terra exeuntibus tradunt: caule laui cubitali, nuda: radice gemina, cuius inferior pars & maior mares gignat; inferior ac minor feminas. Pertinent autem quod de gemina radice additur, ad Orchion, non verò Satyrj historiam. Radicem autè huius Satyrj Dioscorides ait oportere ex vino austero coctam ad opisthotonon bibi: & ei qui velit cum muliere concumbere hac utendum fore; fertur enim ipsam ad Venerem potentiam excitare.

- 2 ERYTHRONIVM Satyrium siue Erythraicum, semen habet lini semini simile, sed maius, robustum, splendens & lenè, quod & ipsum narratur Venerem excitare, vii Scincus: est radici cortex subtenuis & fulvus, interna verò pars candida, gustu ori grata & dulcis. Nascitur in soli expositis & montanis locis. Fertur ad Venerem incitare radix, etiam si manu teneatur: cum vino verò sumpta multo magis. Eadem ferè de Erythronio Plinius; nisi quod semen ei non lini, sed viticis maius ac lenius tribuat, & vires ei plures ex aliorum tamen relatu adscribat: arietibus scilicet quoque & hircis segnioribus in potu dari; & à Sarmatis, equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitu: quod vitium profedamum vocant.

SED postea quàm tam magnas Erythronio Satyrjo, ad venereas libidines incitandas, vires & Dioscorides & Plinius tradi scribant, suspicandum non temere videtur, Satyrium istud, herbam esse eam, quam Indum quendam attulisse Theophrastus lib. 9. ait; ad rem Veneream efficacissimam: potissimum cum nec huius, nec alterius Satyrj, Theophrastus vsquam meminerit. Si etenim Erythronio tam efficax vis est, ut etiam in manu sumptum libidinem excitare

queat;

queat; non multum ab Indi illius herba (si non eadem est) facultate differens esse oportet. Ad rem siquidem Veneream mirum in modum herba pollebat, quam Indus attulerat: nec enim solum edentibus, sed etiam tangentibus tantum, genitalibus vini dixere adeo vehementem fieri, ut quotiens vellet coire valerent; uti refert Theophrastus. Verum hanc ea de causa cum Erythronio eandem esse affirmari certò non potest, cum non raro dissimiles eiusdem aut similis facultatis stirpes reperiuntur. Coniecturam nostram indicauimus, iudicium exactius studiosis permittimus.


DE ORCHIIIS. CAP. LXI.

ORCHION multa & differentes reperiuntur species, quas veteres paucioribus quidem, nos quinque generibus comprehendendas putauimus. Primum genus Cynosorchin, siue canis testiculum: proximum testiculum Morionis: Tragorchin tertium: quartum Orchin Serapiam: quintum testiculum odoratum, siue testiculum pumilionem cum Cordo appellauimus.

CYNOSORCHIOS complures reperiuntur species. Cynosor-

PRIMA folia habet lata, pingua, lilij folijs propemodum similia; caulem pedalem aut altiore, angulosum; & in eo flores copiosos, spicatum digestos, colore rubentis dilute purpure, cucullo aut galea patenti similes, ex quibus parte inferiore laciniosum quiddam, canis aut alterius animalis quadrupedis exuuiò simile dependet, dilute & ipsum purpureasens, punctulis magis purpureis respersum: pro radicibus, præter fibras supra adherentes, gemini sunt bulbi veluti testiculi, forma aliquantulum oblongi; quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior.

ALTERA species folijs similiter lauibis oblongis & 2



latis est, sed quàm antecedentis minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulem amplectentibus, qui dodrantalis est: spica densa, breui, in qua flores multi; colore ex candore purpurascens, multis purpureis punctis & interiore parte obscurioribus copiosis exiguis lineis ornati; forma galeam aut hiantem cucullum quoque referentes, dependente ex singulis veluti animalculi quadrupedis, aut homunculi extensis brachijs & diuaticis cruribus absque capite corpusculo, eodem serè modo quo ex Saturni ore depingi solent dependentes pueruli: radices subsunt duæ globosæ, nuclei nucis myristicæ magnitudine; adherentibus ad annexum fibris aliquot crassis.

TERTIA Cynosorchios species, folia edit angustâ, 3
striata, plantaginis angustifoliæ folijs modo quodam similia: caulem dodrantalem: flores in breui densaq; spica copiosos; colore foris punico & obscuriorem purpuram referente, intus verò albicante; eiusdem cum superioris formæ, sed tamen minores; dependente quoque ex ipsis rudi ac informi exiguo quadrupedis veluti animantis rudimento: radices subsunt aliorum Orchion similes.

HVIC & alius floribus per omnia similis quidam Cynosorchis est, folijs tamen latioribus, & secundum referentibus, quem Cynosorchios speciem quartam non ineptè quis fecerit.

IAM & quinta quadam species reperitur, folijs vii secundus canis testiculus: caule pedali, spica longa, floribus colore herbaceo subuirentibus, ex quibus quod laciniæ simile dependet, oblongum est, & quasi quadrangulum. Ex horum numero primus vel secundus, vel vterque, Cynosorchis est à Dioscoride descriptus. Vterque enim horum folia habet lænia, Scilla mollioris siue Epimenidiæ folijs similia, quadamq; horum erecta caulem amplectentia: alia verò versus terram incli-

Cynofor-
chis Diof-
coridis.

*inclinata: caulem non raro altiorem dodrante: flores purpu-
rascentes: bulbos radicam oblongis oliuis similes; praesertim
qui primus est. Talem etenim Dioscorides Cynoforchin esse
scribit. Ορχις, ait, οἱ δὲ κυνὸς ὄρχιν καλοῦσι, φύλλα ἔχει
κατὰ γῆς ἐσφωμένα, περὶ τὸν καυλὸν καὶ τὸν πυθμένεα, σκίλην
μαλακὴν ὅμοια, στενώτερα δὲ καὶ λεῖα μακρότερα. καυλὸν
σπινθαμῆς τὸ μῆκος, ἐφ' οὗ ἀνθὶ πορφυροειδῆ ἔλκεται βολβοει-
δῆ, ἐπιμήκη, διπλὴν στενὴν ὡς ἐλαίας, τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ
κατωτέρω: καὶ τὴν μὲν πλήρη, τὴν δὲ μαλακὴν καὶ ῥυσσύν: hoc
est; Orchis quem Cynos orchin appellant, folia habet &
per terrā strata, & circum caulem ac spicam, Scilla mollis
similia, angustiora, mollia & minora: caulem dodrantis al-
titudine: in quo flores purpurascences: radicem bulbosam,
oblongam, geminam, angustam ut oliua; vnam superiorem,
alteram inferiorem, & vnam quidem plenam, alteram mol-
lem & rugosam.*

Dioscori-
dis locus
restitutus.

Scilla.

*IN qua descriptione deprauatè in Gracis exemplaribus
legitur ἐλαία μαλακὴ, pro σκίλη μαλακὴ; nulla siquidem
appellata est mollis olea, & olea folia multo & minora &
angustiora sunt, quàm Orchios. Inter Scillas autem qua-
dam est mollior & minus aspera. Nam species quidem Scil-
la, auctore Plinio, lib. 19. cap. 5. tres sunt: Vna mascula fo-
lijs candidioribus, altera femina nigrioribus, vtraque aspe-
rioribus, & tertia Epimenidia dicta, folijs minus asperis &
angustioribus. Hanc Dioscorides mollem Scillam appellat,
eiusq; folijs Cynoforchios mollia ac leuia folia, similia &
angustiora esse ait.*

*CONFIRMAT hanc lectionem Theophrastus de
historia stirpium lib. 9. vbi de Orchis scribens ait: ἔχει δὲ
φύλλον σκυλλῶδες, λειότερον δὲ καὶ ἑλαττον, hoc est, folium
habet Scylla simile, sed leuius ac minus. Et similiter Plinius
lib. 26. cap. 10. Quidam folio, ait, Scilla esse dicunt, leuiori
ac mi-*

ac minori. Est tamen in viroque auctore huius Orchios descriptio deprauata. Pro σκυλλῶδες siquidem, ut Marcellus legit, in nonnullis Theophrasti exemplaribus, quæ Gaza mala conuersionis occasionem dedere, perperam legitur σιλφῶδες. Sequitur deinde: τὸν δὲ καυλὸν ὁμοίωτατον ἀπίφ, ἥτοι ἀπύφφ, ἥτοι ἀκάνθῃ, quod penitus corruptum videtur. Apud Plinium legitur, caule spinoso, & similiter deprauate: Orchios siquidem caulis spinas non habet. Cornarius tamen hac Plinij lectione fretus, Theophrasti locum hoc modo putauit restituendum: τὸν δὲ καυλὸν ἀκανθῶδῃ, ὅρχιν δὲ ὁμοίωτατον ἀπίφ. Quomodo autem hæc Theophrasti & Plinij corrupta loca restitui debeant, ac emendari, diligentius expendendum relinquimus.

TESTICVLVS Morionis duplex est: mas videlicet & femina. Mari folia sunt quinque aut sex, longa, lata, leuia, lili folijs similia quidem, sed minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata; quorum vnum & subinde alterum caulem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis: flores in spica purpurei, circa vmbilicum albidiores, odorati, & aspectu grati, posterius corniculum habent propendens, simile ferè corniculo Regij floris; anterius verò cucullum auriculatum & cristatum Morionis referunt. Nam cuculli quidam & patens galea modo flosculus biat, & angusta foliola quæ à lateribus surgunt auriculas; quod verò è medio attollitur, cristam refert: radices gemini sunt globuli, nucleo nucis myristica similes, supra quos fibræ exeunt.

FEMINA folia habet similiter leuia, sed angustiora & aliquantulum venosa siue striata, Plantaginis angustifolia quodammodo similia: flores hiantes quoque, & veluti patentes cuculli, à tergo dependente singulis corniculo, sed foliolis, quæ crista aut auricularum modo adnascuntur non erectis,


Theophrasti & Plinij
loca corrupta.

Testiculus
Morionis
mas.

Testiculus
Morionis
femina.

Orchis mascula





erectis, sed ipsi floris cucullo ita incumbētibus, ut non facile obseruentur: gemini & his testiculis similes globuli, exeunt & supra annexum aliquot fibrae.

1 ET VNI quidem huius generis flores sunt purpurei Viola ferè nigra colore, in medio candidiores, punctis aliquot variegati; pluresq; densiori in spica; caulisq; quàm reliquorum longior.

2 ALTERI flores dilutè rubent; cauliculus breuior est, & folia aliquantulum minora.


3 TERTII, flores purpuram referunt exquisitè rubentem, & vermiculum colorem: densa huic brevisq; spica; flores minores: folia nonnihil striata, pleraque erecta & caulem circum amplexentia. Hunc testiculum sunt qui velint Satyrion esse Erythronion, sed parum isti attenderunt, Orchies à Satyrijs differre.

4 SUNT verò & huius generis minores testiculi, quibus cauliculus brevis est: folia paruula quina aut sena, vno aut altero circum cauliculum erecto; flores in spica breui, rari; colore nunc in ceruleo purpureo diluti, nunc candidi, quandoque rubentes, sed coloris obsoleti & odoris ingrati.

Tragorchis.

TRAGORCHIS folia similiter leuia, lata & longa, fert, liliaceis proxima, maiora quàm aliorum Orchion: caulem cubitalem saepe solijs nonnullis inferius implicitum: flores secundum caulem in longa veluti spica multos, fertidos & hircum olentes, quorum forma patenti quoque galea similis est, ex quibus tamen non exuuio simile, sed longa aliquantulum retorta veluti lacerta cum medio corpusculo cauda propendet, coloris eius cuius est caulis, purpureis aliquot punctulis circa annexum insignita: semen in valvulis oblongis & striatis gignitur perexiguum: testiculi subsunt grandes; fibra aliquot supra adherent. Testiculum leporis plerique appellant: nos ab odore, quo hircum dum in flore

TRAGORCHIS, TESTIC. HIRCI. 209



in flore est, refert, τερχορχiv & Hirci testiculum dicere maluimus.

Testiculus
Serapias.

TESTICVLI Serapiadis à nobis cognominati, tria obseruauimus genera: flos vnus papilionem, alterius fucum, tertij muscqm refert.

¹ PRIMVM itaque genus folia profert duo aut tria, lauia, latiuscula, at lilij folijs multo minora: caulem dodrantalem aut altiore; flores in eo raros, candidos, papilionibus expansis alis quodammodo similes; è foliolis scilicet tribus, vno superiore, duobus lateralibus alas referentibus; & longiori, tenui, veluti papilionis corpore, cauda propendente, melleum & dulcem liquorem continente, commisi; qui contorto aliquantulum pediculo, cauli adhaerent: globuli subsunt gemini candidi & rotundi, & supra eorum annexum fibra aliquot pro radicibus.


² ALTERVM & secundum genus quinis sensus constet folijs, venosis, aliquantulum latis, Plantaginis angustifoliae quadantenus similibus, sed minoribus, quibusdam terram versus reflexis, alijs circum caulem; qui palmaris aut dodrantalis est: floribus in summo quinque aut sex ex aliquot foliolis compositis, quorum inferius forma, & colore subnigro sordido fucum proximè referre videtur: testiculi subsunt vt alijs gemini. Reperiuntur huius species duae: vnus flos superiora foliola maiora, candidiora, & aliquantulum purpurascens habet: alterius omnino minora & subuirentia. Huius caulis breuior: illius altior.

³ TERTIVS testiculus Serapias folijs est minoribus, & paucioribus, cauleq; breuiori ac tenuiori quàm secundus, cui alioqui satis similis apparet: flores huic tres aut quatuor, ex tribus exiguis superioribus foliolis, & quarto inferiore oblongiore, colore in purpura tristi subnigro, nonnihil variegato, forma musca cuiusdam corpori similem: testiculi



sticuli veluti gemina parua pilulae sunt.

TRIA autem hac genera Serapiades nūcupauimus, propterea quòd eorum flores infecta quadam referūt fecunda & lasciua; tanquam à Serapide nomen habentia Alexandrinorum olim Deo, cuius excellens Canopi templū erat, vbi lasciuiis & cantibus & saltationibus colebatur: vt videre est apud Strabonem lib. 17. Fuchsius etiam ante nos, genus illud, quod flore fucum refert, Serapiada feminā fecit. Dioscorides item Orchin Serapiada describens, vnum istorum satis manifestē exprimit. Verba eius sunt: Ορχις ἑτερος, ὃν σεραπιάδα ἑτεροι καλοῦσιν, φύλλα ἔχει ἐοικότερα πρᾶσις ἐπιμήκη πλατύτερα καὶ λιπαρὰ, ἐπικαμπῶν ἐν ταῖς μεσχαλαῖς· καυλὸς σπιθαμιαῖα· ἀνθὴ δὲ ὑποπόρφυρα· ρίζα δὲ ὕπεστιν



Testiculus
Serapias
Dioscoridis.

ὀρχιδίους ὁμοία, id est, Orchis alter, quē Serapiada alij nominant, folia habet Marrubio similia, oblonga, sed latiora & pingua, per extrema recuruata; cauliculum dodrantalem; flores subpurpureos: radix subest paruis testiculis similis.



lis. Cum qua descriptione si secundus no-
ster Serapias, praesertim qui maior est,
conferatur; conuenire omnino reperie-
tur. Foliū etenim ei Marrubij folio lon-
gius latiusq; & laue, quod reflectitur:
cauliculus dodrantalis: florum superiora
foliola, dilate in candore rubentem pur-
puram referunt: testiculi exigui sunt.
Meminit huius eiusdem & Plinius, sed
folia ei non Marrubij sed Porri tribuit,
quod & Dioscoridis interpretibus occa-
sionem praebuit, ut pro εοικότα πρᾶσις,
reddiderint, porro similia. Inter pauca,
inquit Plinius, mirabilis est Orchis her-
ba, siue Serapias, folijs Porri, caule pal-
meo, flore purpureo, gemina radice testi-
culis simili. Paulus Aegineta, Serapiada
etiam Triorchin nuncupari scribit, ve-
luti tres testes habentem. Vnde Fuchsius
Serapiadi tres affinxit bulbos. Plinius
tamen huic non nisi geminos bulbos tri-
buit: neq; nobis plures quam duos esse,
vel huic, vel illi quem Fuchsius depin-
git, vel alijs Orchijs, obseruare contigit.

QVINTVS testiculus odoratus siue Testiculus
pumilio nuncupatus, omnium folijs mi-
nimus est; ei siquidem foliola omnino
paruula sunt, eaq; venosa & Plantagi-
nis aliquatenus similia, sed minutis ac
paruulis eius folijs minora, virētia; cau-

lis tenuis est palmi altitudine, circa quem flosculi paruula
candidi, suauiter odorati, ordine digesti, ac spirā modo cau-

lem ambientes : bulbi subsunt gemini, parui, oblongi.


EXEUNT Orchies locis vi plurimum palustribus ac humentibus, in sylvis ac pratis : quidam pingui & argilloso solo, veluti *Tragorchis* dictus, qui solo pinguisimo gignitur : alij etiā macriori nascuntur. Odoratus, editis, incultis & aridis locis plurima parte reperitur.

MAYO & Iunio mensibus omnes florent, excepto odorato pumilione, qui Augusto demum aut Septembri flores promit.

OMNES à Græcis *Opχies*, & à Latinis testiculi nuncupantur. Germani *Knabenkraut* & *Standelkraut*: Belgæ, *Standelcruyt*: Galli, du *Satyriion* appellant, officinarum nomen retinentes. Officina siquidem *Orchies* *Satyria* nominant, & eorum bulbos, pro *Satyriorum* medicamentis ac compositionibus admiscunt. Præbuisse his occasionem videtur *Apuleius*, qui nullam inter *Orchies* & *Satyria* differentiam facit, sed utrumq; *Satyrium*, cum utroq; *Orchi*, canis videlicet dicto, &

Serapiade cognominato confundit. Græcis, inquit, dicitur *Satyriion*, alijs *Cynosorchis*, alijs *Entaticos*, *Panion*, *Serapion*; alijs *Orchis*. Galli, *Vram*: Itali, *Priapifcon*: alij *Orminalem*: alij testiculum leporinum nominant.

VIS autem *Cynosorchios* radicibus calida est & humida:



midia : caterum maior quidem multam videtur habere humiditatem excrementitiam , ac flatuosam , & ea propter epota Venerem excitat . Altera verò minor , e contra , vt sit eius temperamentum ad calidius & siccius vergens : itaque hac radix , tantum abest vt ad coitum stimulet , vt etiam planè contrà cohibeat ac reprimat : auctor Galenus . Et de radice , inquit , Dioscorides , narratur , maiorem si viri edant , mares generare ; minorem si femina , feminas . Addunt in Thessalia mulieres teneram cum lacte caprino bibendam dare , vt Venerem excitent : aridam verò ad inhibendum .

SERAPIADEM , Galenus ait , siccio rem facultatem obtinere , nec perinde ad Venerem accommodam esse .

NOSTRA etas omnium Orchium bulbis , ad Venerem excitandam vtitur : & pharmacopœi compositionibus eo facientibus indifferenter quosuis admiscunt : præstantiores tamen sunt Tragorchios bulbi . Assumendi autem non sunt ambo bulbi , sed durior , plenior , ac succi plus habens : flaccidior ac rugosior minus aut non idoneus est .

EST autem plenior , non semper qui maior , sed non raro minor : si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps deflo-ruerit , aut cum primùm caulis erumpit . Nec etenim succulentior , alterum magnitudine superat , prius quàm semen maturari cœperit . Nam cum alternis annis vnus bulbus intumescat , alter verò resideat ac pereat , fieri non potest vt durior ac succo plenior semper maior sit . Quando siquidem folia erumpunt , tunc demum vel non multo antè plenior crescere incipit , quo paulatim incrementum sumente alter flaccescit , rugasq; contrahit , donec maturato semine vna cum folijs & cauliculis subinde totus subsideat ac pereat ; eo qui interea creuit vegeto ac succi pleno .

DE SATYRIO BASILICO.
CAP. LXII.

QVOD recentior etas Satyrium basilicon nominat, non vnius est generis. Est etenim maius vnum; alterum minus: quoddam folio non maculato; aliud maculato.


1 MAIUS Satyrium basilicon, quod plerique maiorem appellant, folia habet oblonga, lata & leuia, lilij folijs minoribus, nullis aut omnino vix apparentibus maculis respersa: caules pedales vel altiores, non absque adnatis folijs: flores in summo spicatos, colore dilute purpureos; exiguis punctis saturata purpura respersos, forma testiculi Morionis maris; nisi quoddam ipsis crista desit: sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices geminae veluti palmae sunt, singulae in quatuor digitos distributae; quarum vna flaccidior & quasi fungosa: altera vegeta ac solida, paucis ab annexis exeuntibus fibris.

2 ALTERVM maius genus, quod feminam vocant, priori tamen minus, folia eiusdem formae promittit, sed minora & multis nigris maculis conspersa: flores cucullis similes, cristatos & hiantes, vti testiculi Morionis maris; colore nunc candidos, alias in purpura vel rubentes, vel dilute ad caeruleum inclinantes, semper magis purpureis punctulis ornatos ac variegatos: radices alterius similes.

3 MINVS genus, folijs est angustis, & vt Matthiolus inquit, croci, caule dodrantali iunceo, leuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus, Amaranti emulus, qui recens odorem quam suauissimum reddit: radicibus aliorum similibus, sed quae magnitudine ipsis cedant.

NASCUNTUR Satyria haec, locis vt plurimum humidentibus, palustribus, in pratis & in syluis. Florent Maio ac Iunio.

NOSTRA



05



N
item
ni
fi va
Cru
Galli
S
esse, &
Indan
simile
huius
ex In
reperi
M
nos A
Mesue
iudici
roen w
asser
vicent
sacced
Digiti
curm
digni
mista
dulced
dne. te
cor, ve
pincto
tore
Que o
curm

NOSTRA atas Satyria nuncupat Basilica siue regia: item & Palmas Christi. Est tamen & alia huius appellatio- nis herba, Ricinus videlicet; hunc etenim & Palmam Chri- sti vulgo plerique nuncupant. Germani Satyrion Basilicon, *Trutzblum* nominant: Belgæ, *Handekens* cruyt: Galli, *Satyrion royal*.

SUNT qui velint Buzeiden siue Buzidan Arabum esse, Sed Auicenna Buzeiden ait esse medicinam ligneam Indam. Et Serapio Buzeiden ait radices esse duras, albas, similes Behen albo, & medicinam esse Indiæ. Satyrj autem huius basilici radices nihil minus quàm ligneæ sunt, & non ex India petuntur, sed in omnibus Europæ prouincijs passim reperiuntur: tantum à Buzeiden absunt.

MATTHIOLVS Satyrium basilicum Digitos citri- nos Auicenna esse vult, & Monachos qui in compositiones Mesues commentaria edidere, dubitantes & penes lectorem iudicium relinquentes, ea de causa reprehendit. Nobis ta- men magis placet Monachorum hesitatio, quàm Matthioli assertio. Neque enim Satyrj huius radices duræ sunt, sed recentes quidem vegetæ ac succulentæ, & arefactæ omnino flaccidæ: nulla etiam omnino citrina aut puluerulenta est. Digiti autē citrini, auctore Auicenna, duri sunt, & quidam Digiti ci-
trini. citrini cum puluerulentia. Verba eius sunt: *Asabasa* siue digiti citrini quid est? Eius figura est sicut vola manus, com- mista ex citrinitate & albedine, & est dura, in qua est parū dulcedinis, & ex ea est citrina cum puluerulētia absq; albe- dine. Iam & Rhasis libro continentis vltimo, digitos hos cro- ceos, vt exēplaria habet, appellat; & esse gummi seu venam tinctorum ait. At basilici Satyrj radices nihil minus quàm croceæ sunt, & ad tingendum nequaquam vtilēs habentur. Quæ omnia Satyrium basilicū vulgo nuncupatū, à Digitis citrinis Auicenna & Rhasis differre, manifestè ostendunt.


AT Satyrj basilici radices, Orchion sapore & gustu referunt, proinde & facultatibus similes existimantur. Nicolaus autem Nicolaus cap. de curatione quartana, vim habere ait, & per superiorem, & per inferiorem ventrem purgandi; & aduersus quartanas febres inueteratas post purgationes, radices partem pollicis lōgitudine tusam, cum vina ante accessionem vtiliter exhiberi; hocq; remedio ter sumpto, Biliotum quendam post 44. aut 45. accessionem, à quartana fuisse liberatum.

DE PSEVDORCHI, SIVE BIFOLIO. CAP. LXIII.

AD Orchies recentior atas etiam refert, quod Bisfolium nominant, Orchion nothum & adulterinum quoddam genus. Folia habet non plura quàm duo, eaq; ad caulem sibi mutuo opposita, lata, neruosa, Plantaginis latifolia folijs similia, sed minora: caulem dodrantalem; flores secundum ipsum ordine digestos, testiculi Serapiæ tertij quodammodo similes; sed subutrides aut in viridi albicantes & angustiores, culicum formam proximè referentes: radices fibrosas in diuersa tendentes. Exit locis humidis ac palustribus. Floret vna cum Orchijs Maio ac Iunio.

NOSTRA atas Bisfolium appellat: Germani, Zuep-
blat; Nostri, Tweeblat. Putatur esse à Plinio appellata Ophris, quam ait herbam esse denticulato oleri similem, folijs duobus. Sed veram esse Ophrim asseri non potest, quam diu quale sit illud olus denticulatum, cui Ophris similis, ignoratur. Alijs videtur esse Alisma, sed & quàm parum cum Alismate conueniat, ex his qua superius cap. 22. scripta sunt, cuius promptum est colligere, vbi quale sit Alisma ostensum

Ophris.



222 DE TRAGOPO. ET SCORZONERA.

ostensum est. Nobis noua aliqua stirps esse videtur, veteribus præterita.

VTILEM autem hanc herbam recentiores ferunt, ad rupta & vulnera glutinanda.

DE TRAGOPOGONE ET SCORZONERA. CAP. LXIIII.


TRAGOPOGON folia habet oblonga, angusta, acuminata, croci folijs latiora & maiora. caulem rotundum, in plures diuisum; in summo calyces magnos, à quibus flores exeunt magni, multiplices, multorumq; foliorum, Dentis Leonis nuncupata vulgo herba, floribus & magnitudine similes; colore vel lutei, vel in purpureo punicantes, qui oriente Sole panduntur, meridie verò recluduntur; & per euntes in canescentes pappos abeunt; quibus semen subest, longum, subnigrum, acuminatum: radix candida est & longa. Tota herba vnà cum radice succum habet lacteum, qui vulnerata effluit. Nascitur sua sponte compluribus vtriusque Germania locis incultis & humidis, & præcipue quæ lutei est floris. Exit & in hortis procerior, amplior, floribusq; maioribus ac speciosioribus, præsertim purpurea. Floret Iunio & Iulio.


GRÆCIS τραγοπόγων, & κομήν nuncupatur. Latinis, Hirci barba, Coma. Germanis, Bocks bart. Belgis, Boexbaert / Josephs bloemen. Gallis, Barbe de bouc. Italis, Matthiolo teste, Salsifrica.

HERBA, vt Dioscorides ait, esui apta est, nostra ætate radix hybernis mensibus à plerisque, vnà cum acetarijs permixta editur.

Scorzoner-
ia.

Huius generis est quam Hispania Scurzoneram aut Scorzoneram appellat, folijs oblongis, subcandidis, carnosis,
acumi-





acum
tu: G
omni
go: ju
qua co
N
tidus,
in Ger
laci fia
Germa
H
Viperin
quod c
beatur
Germa
F
nibus r
rum me
desse i
morbo c
bilitate
radicis

C
per fre
ter flores
SV
legitima
causa vni

DE TRAGOP. ET SCORZONERA. 225

acuminatis, latioribus & per ambitus subinde parum sinuatis : caule *trundo*, pedali vel altiori; flore luteo multiplici omnino simili, qui etiam in pappos resolvitur: semine oblongo, subcandido, & minore: Radice longa, singulari, candida, quæ cortice obtegitur tenui & nigricante.

NASCITVR Scurzonera in Hispania plerisq; montibus, locis humentibus obscuris & vliginosis: reperitur & in Germania Thuringia ac Bohemia in sylvis ac montibus locis similibus. Apud Hispanos flos Maio mense prodit: in Germania verò seriùs, Iunio videlicet & Iulio.

HISPANI Scorzoneram appellant, quod Latine Viperinam siue Viperariam aut Serpentariã sonat; sic dicta, quod contra venena viperarum ac serpentum efficax habeatur. Nam Hispani Viperam Scurzo appellant. Apud Germanos & alias nationes nomen non inuenit.

FERVNT autem hanc pestis contagia arcere, & omnibus venenis resistere venenatorum, & præcipuè viperarum morsibus mederi, epoto vel radicis, vel herbe succo: prodesse item cardiacis, & syncope molestatis, nec non comitiali morbo obnoxijis & vertiginosis: radicem commanducatam hilaritatem facere, tristitiãq; omnem discutere: lacteum radicis succum oculis inditum, visum exacuere.

DE CHAMÆMELO VVLGARI.


CAP. LXV.

CHAMÆMELI flos tametsi coronarius non sit, propter frequentem tamen quem in medicina vsum habet, inter flores locum vendicauit.

SVNT autem Chamamelorũ complura genera. Vnum legitimum medicinae aptissimum, vulgaris vsus, quod ea de causa vulgare Chamamelum nuncupatur: alia deinde syl-

P

uestria



ne tri
De co

bitur
medio
luteu
fingula
fibrosa
Europ
menfe.

CA
mille
Galla, C
melum,
mediu
tar. Su
ria, &
tam aut
luteo, t
constat,
reus, inq

CH
de, sine
menelo
vulgaris
dicere lue
lunt. Tal
no sunt, q
- CHA
in primo
de & rar
dise per

uestria nullius aut exigui vsus: tertium hortense odoratum. De eo autem quod familiarissimum est, primum agemus.

SUNT huic cauliculi tenues in alas multas diuisi, cubitales: folia tenuia, dissecta, numerosa: flores in summo, medio lutei, forinsecus verò candidi; ambientibus videlicet luteum ipsius floris, multis exiguis candidis foliolis, quorum singula angusta sunt & forma oblonga: radices tenues & fibrosa. Exit passim in aruis vnà cum segete; & vniuersæ Europæ familiaris est. Colliguntur flores Iunio potissimum mense.

CAMOMILLAM officinæ nuncupant: vulgo Camille & Camomille bloemen. Germani, Chamill. Galli, Camomille. Veterum est χαμαίμελον siue Chamamelum, & Anthemidis genus, quod ab ipsis candidis, floris medium circulantibus orbem, foliolis, λευκάνθεμον dicitur. Sunt etenim Anthemidis, Dioscoride auctore, genera tria, & quidem floribus in medio luteis omnia, per ambitum autem & circumferentiam, vnum candidis, alterum luteis, tertium purpureis. Quod luteis per ambitum foliolis constat, χρυσάνθεμον nominatur: tertium autem purpureis, ἡριάνθεμον, quod scilicet vere floreant.

CHAMÆMELVM verò dicitur, quoniam flores μολῶ, siue mali odorem habeant, quem in vulgari vsus Chamamelo evidens & manifestum est sentire; ita vt vel hinc vulgari vsus Chamamelum, verum & legitimum esse conijcere liceat; quod & ipsa etiam facultates euidentius ostendunt. Tales siquidem vulgari Chamameli facultates omnino sunt, quales Chamamelo Galenus tribuit.

CHAMÆMELVM, Galenus ait, calfacit & desiccatur in primo ordine, & tenuium est partium; digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim habet. Item & alio loco: tenuitate Rose persimile est, calore ad olei vires magis accedens ho-

mini familiares & temperatas. Quapropter lassitudini, si quid aliud, cum primis confert, doloresq; sedat & mitigat: præterea tensa remittit & laxat: quæq; mediocriter dura sunt, emollit; quæq; constipata, rarefacit. Omnes autem has facultates nostro vulgari Chamamelo inesse, ipsa quotidiana commōstrat experientia. Nam moderatè quidem ipsum excalescit, parum resiccat, valde tenuium est partium, digerendi, relaxandiq; singulari, ac mirifica potentia præditum est, multi breuiter ad omnia vsus, quæ clementer calefieri, resolui, discuti ac leniri desiderant. Calculi & colicos dolores lenit: vrinam moderatè prouocat: tormina & rosiones ventris sedat: laterum dolores mulcet: duros tumores emollit, & crudos humores discutit. Idem præstat oleum ex floribus compositum, quod aduersus lassitudines omnes remedio est, & omnibus vtiliter admiscetur, quæ sopiendi alius cuius doloris causa adhibentur.

DE SYLVESTRIBVS CHAMÆMELIS, SIVE COTVLIS.
CAP. LXVI.

SYLVESTRIVM Chamamelorum, Cotulas quas passim nominant, tria sunt genera: vnum fœtidum, duo alia non fœtentia: quorum vni flos per circumferentiam candidus, alteri verò totus luteus.

CHAMÆMELVM syluestre fœtidum, siue Cotula fœtida, caules promit rotundos, virentes, fragiles & succulentos, in alas multas diuisos, crassiores & sæpenumero altiores quàm Chamameli: folia similiter ampliora, in virore nigricantia: flores forma & colore similes. Fœtet herba tota, grauemq; odorem spirat: vnde illi fœtida cognomen datum.



datum. Nascitur in arvis, iuxta semitas, & agrorum margines. Floret eodem quo Chamamelum tempore.

OFFICINÆ & Herbarij passim Cotulam fœtidam nuncupant; plerique Camomillam fœtidam. Germani, *Bröttendill*, *Hunz-dill*, *Hunz-blum*. Belgæ, *Dad-debloemen*, *Stinckende Camille*. Galli, *Espargoutte*: à nonnullis *κρυανθεύς*, ab alijs *κρυοτοτάρη*. Leonhartus Fuchsius *Parthenium* esse voluit. Sed *Parthenium* verum & legitimum est vulgo dicta *Matricaria*, quæ odore longè est grauiore, & sapore admodum amaro; folijs tenuibus & *Coriandri* similibus. *Cotula* autem fœtida minus grauius olet, & folijs *Coriandrum* non emulatur.

2 ALTERA *Cotula alba* non fœtida, quæ à plerisque etiam *Oculus bouis* dicitur, cauliculos edit complures, tenuiores, duriores, flexibilioresq; quàm *Cotula fœtida*; & circa eos folia tenuia, *Chamameli* folijs paulo longiora & candidiora: flores in medio luteos, per circumferetiam candidos, *Chamameli* & *Cotula fœtida* floribus similes, sed maiores, exigui aut nullius odoris: radices duras & lignosas non absque adnatis fibris, quæ aliquot annis permanentes vere regerminant. In arvis & agris frumentarijs vna cum *Chamamelo* reperitur. Aestiuis mensibus floret.

NOSTRA atas *Cotulam* non fœtidam appellat, & *Cotulam albam*, plerique *Oculum bouis* & *Bupthalmum*. Germani, *Kudil*, *Kundsaug*, *Kuang*: Belgæ, *Coedille*, *Loeoghe*. Et verum quidem esse *Bupthalmum* Leonharti Fuchsii sententia fuit. At nobis verum & legitimum solum esse videtur, quod infra sub *Bupthalmi* nomine describitur. Nam *Bupthalmum* quidem, vt *Dioscorides* auctor est, folia sunt *μαράθρεος* dñ; id est, fœniculi foliorum similitudinem habentia, & flos melinus. Huic verò folia non sunt fœniculi similia, neq; flos totus luteus siue melinus, sed plu-

rima

rima parte, per circumferentiam videlicet candidus; qui etiam vel solus Matthiolum mouit, vt Cotulam hanc albam, siue vulgare Buphtbalmum, verum & legitimum esse Buphtbalmum negauerit. Proinde non Buphtbalmum, quod hoc nomine a plerisque appellatur, sed Cotula & Chamæmeli sylvestris species quædam est. Plinius lib. 26. cap. 7. Melandrii herba meminit, in segete ac pratis nascentis, flore albo & odorato: an Melandrium autem istud Cotula non fetida sit, diligentius inquirendum; propter etenim Plinii breuitatem, nemo facile qualis herba Melandrium sit, asseruauerit.

TERTIA Cotula lutea cauliculis exit non paucis; folijs Cotula alba maioribus, crassioribus, candidioribusque: flores & medio & orbiculato ambitu, melini siue lutei sunt: radix dura, lignosa, diuturna. Nasitur in Germania & Gallia, iisdem ac similibus quibus Cotula alba locis: apud Belgas, hortensis est. Iunio ac Iulio florem promit.

GERMANI Streichblumen & Steinblumen appellant. Belgæ, Strijckbloemen. Fuchsius Anthemidis speciem, & Chamamelum Chrysanthemum facit: folio tamen parum, odore nullatenus Anthemidem siue Chamamelum Leucanthemum refert. Matthiolus pro legitimo Buphtbalmo depinxisse videtur: desideratur tamen in eo solum Marathroëides, quod Buphtbalmo esse Dioscorides testatur. Nos his de causis inter Cotulas & sylvestria Chamæmela potius reponendum duximus, quam aliterutrum temere asserere.

VSSUM autem hæ Cotula in medicamentis aut cibatu nullum habent, proinde earum facultates incognite. Videntur tamen omnes calida aliquantulum & sicca, Chamæmelo vulgaris vsus viribus quodammodo similes, sed longe tamen inferiores, imbecillioresque. Que fetida dicitur,

ad veteri morbos commendatur; sed ab ijs præsertim, qui Parthenium esse existimant, & Parthenij vires ad hanc transfulerunt. Est tamen non omnino Cotula hac inutilis; quando scetida omnia ex vtero strangulationibus profunt.

DE CHAMÆMELO ODORATO.

CAP. LXVII.


ODORATVM Chamamelum duorum est generum: vnum Leucanthemum, alterum Chrysanthemum cognominari potest.

¹ LEUCANTHEMO odorato Chamamelo, caules exeunt multi, non erecti, sed procumbentes & quasi per terram repentes: folia tenuia dissecta, vti Chamameli vulgaris, sed maiora virentioraq;: flos quoque similis, medio videlicet luteus, & per circumferentiam candidis foliolis cinctus: radix fibrosa, durabilis natura. Referunt folia & flores pergratum ac iucundum cum grauitate quadam odorem, aromatum odoribus persimilem, qui etiam in arida diutine permanet.

EST & huius generis quoddam, foliola medium floris ambientia densissime multiplicans, luteo in angustum orbem coacto; quod odore & forma præcedenti per omnia simile est.

² CHRYSANTHEMV M odoratum Chamamelum, cauliculos similiter profert tenues inualidos, & in terra prostratos: folia quoque tenuia, vti prioris, sed candidiora & paululum minora: pro flore, qui alijs omnibus Chamameli ac Cotularum generibus medius, luteus est orbiculus, nudus & nullis circumambientibus foliolis cinctus; radix similis. Et huius herba odorata quoque est, odore & facultate priori similis.

VTRVM-



VTRVM QVE in Belgio hortense est: faret Iulio & Augusto mensibus.


CHAMAEMELVM odoratum propriè appellatur: Tragus Chamamelum nobile nominat: Vulgus nostrum, Roomſche Camille, id est, Chamamelum Romanum. Quod flore candet, Leucanthemum; alterum Chrysanthemum dici potest. Sed tamen ea esse quæ à Dioscoride, Galeno, aut alijs veteribus in vsu recepta fuere, non omnino videtur asserendum: verisimilius est ab ipsis fuisse præterita aut incognita.

NAM facultas eorum multo intensior, quàm Chamamelo à Galeno tribuitur. Caliditate siquidem & siccitate qualitatem illam viuenti familiarem ac temperatam, quæ Chamamelo à Galeno tribuitur, quàmq; ipsum habere quotidianam ostendit experientia, multum excedunt: utpote secundo ordine calida & sicca. Cùm autem & ipsa substantia tenuitatem habeant coniunctam, digerendi ac rarefaciendi potentiam habent ampliorem: molliendi verò, doloresq; sedandi, aut mitigandi, remissiorem. Preinde vbi magis quàm vulgaris vsus Chamamelum potest, incalfacere aut rarefacere opus est, vtiliter adhiberi possunt: vti in balneis, quæ sudoris euocandi & rarefacienda cutis causa parantur, in quibus horum Chamamelorum vsus haud est negligendus. Nam & cutim nimis adstrictam rariorem faciunt, sudorem euocant, bonumque corpori odorem conciliant.

DE ERANTHEMO VULGARI.

CAP. LXVIII.

FLOS quem Eranthemum nuncupauimus, cauliculos proferet à radice complures, in alas subinde diuisos, striatos, virentes; folia tenuia Chamameli, aut potius Cotulae fortida simi-



da similia: flores non magnos, forma Ranunculi florum, pulchros minij colore rubentes; quos capitulum sequitur oblongum, ex multis collectum seminibus, rotundis, acuminatis, colore in virore subnigricantibus: radices fibrosas. Odorem herba herbaceum habet, aliquantulum grauem, sed minus quàm Cotula foetida, Chamameli verò odori nequaquam similem. Nasctur compluribus Europa prouincijs, in aruis vnà cum Zea, Tritico, aut alijs frumentis: Belge in hortis serunt. Aestiuus mensibus floret, Maio, Iunio & Iulio.

NOSTRI sua lingua, Buynettekens appellant: Germanorum nonnulli, Feldroszlin: multi hac atate ἐρανθέμων. Esse tamen tertium Anthemidis genus, quod propriè Eranthemum dicitur, nemo facile affirmauerit. Nam Eranthemo, si fides Dioscoridi, flos est forma Chamameli, in medio aureus vel luteus, orbiculato vero ambitu purpureus. Istud autem florem quidem habet purpureum, sed medium eius non est luteum: quod ipsum non esse Anthemidis speciem ostendit.

HIERONYMVS Tragus Asters Atticum, cuius flos medio luteus, & per circumferentiam caeruleus est, Eranthemam facit: Fuchsius verò Consolidam regalem, siue florem Regium, de quo superius egimus.

IN Asters Attico autem, quem Vergilius Amellum florem nominat, desideratur herba folium Chamamelo simile, & floris color: in flore Regio verò & color, & forma floris. Vtriusque huius flos caeruleus est: Eranthemi autem, roseo colore rubet, vt testis est Plinius, lib. 26. cap. 8. qua de causa & neutrum horum Eranthemum esse potest.

MATTHIOLVS Eranthemum istud praesens, Adonidis florem nuncupat, sed Adonidis flos Anemone esse creditur. Adonidis siquidem florem vento excuti Ouidius scribit,

bit, *Metamorph. lib. 10. in fine.* Venti autem flos *Anemone* est. Nam *Anemone* ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, id est, à vento nomen habet, ut *Plinius auctor est, lib. 21. cap. 23.* Flos, inquit, nunquam se aperit, nisi vento spirante: vnde & nomen accepit. Cum *Anemone* autem *Eranthemum* quod descripsimus non conuenire manifestum est.

CAETERVM *Eranthemum* istius nullus in medicina vsus; quantum autem gustabilis qualitas eius ostendit, aliquius caliditatis particeps est, sed tamen non magna.

DE BUPHTHALMO. CAP. LXIX.

STIRPI cui *Bupthalmi* nomen dedimus, cauliculi & radicibus exeunt tenues, tres, quatuor, aut plures, pedales vel altiores, circa quos folia, virentia tenuiter dissecta similitudine foliorum fœniculi, sed multo quàm illius minora: flores in summo cauliculorum magni, *Calendula* satis similes, colore luteo magis diluto, staminibus in medio luteis, post quos capitulum succedit, veluti suprâ descripti *Eranthemum*, ex multis seminibus simul congestis commissum: radices tenues sunt & fibrosæ, *Veratri nigri* radicibus similes. Nascitur sua sponte plerisque *Germaniæ* & *Bohemiæ* prouincijs, locis incultis; apud *Belgas* hortensis est. Maio aut Iunio floret.

DE huius autem stirpis nomenclatura, recentiorum variant sententiæ. Sunt qui velint *Veratri nigri* speciem esse; nonnulli *Confiliginem*; quidam *Sesamoides*: *Elleborastrum* alijs.

VERATRI autem nigri, duo apud veteres reperiuntur genera: vnum folio *Laurino*, fructu *Sesamaceo*: alterum folio *Platani*, semine *Cnici*. Veratrum nigrum.

PRIORIS meminit *Theophrastus lib. 9.* & ad hoc genus referenda sunt, quæ passim *Veratra nigra* appellantur,



tur, q
 ferim
 clous b
 her her
 quon
 Lamm
 que au
 instar p
 obimen
 tra mig
 coloris
 aliquat
 gaudant
 -Po
 lit lib.
 flores u
 remes r
 thalmar
 pignum
 Co
 teres no
 ram, &
 piasens
 Colum
 nalis, et
 quara
 & Bup
 curare,
 amia C
 lem, fit
 asenun
 Plinius l

zur, quorumq; folia ex pluribus oblongis collecta sunt: præfertim quod caulem non facit, floresq; ex ipsis promittit radicibus breuibus insidentes pediculis, initio candidos, tandem herbacei coloris. Huius etenim folia ex pluribus constant, quorum singularia dura, glabra & forma quodammodo Laurinis similia: semen in folliculis oblongis gignitur, quinque aut sex simul coniunctis Sesami modo: radices multe instar fibrarum, & nigrae sunt, quæ eximiam purgandi vim obtinent. Sunt tamen & huius generis, reliqua etiam Veratrum nigra, quæ caules proferunt, ac flores habent herbacei coloris; folia siquidem eorum singularia, etiam oblonga & aliquatenus prioris similia: fructus similes: radices ad purgandum efficaces, nigrae & uti alterius.

POSTERIUS Veratrum nigrum Dioscorides describit lib. 4. folia istud habet Platani, nigra; caulem filicis; flores in umbella: semen candicans, oblongum: radices tenues nigrae & fibrosas. Cum neutro autem horum Buphtthalmum istud, à nobis hoc loco descriptum, conuenire, notissimum est.

CONSILIGINIS herba qualis forma sit, apud veteres non reperitur. Plinius ait, sua ætate in Marſis inuentam, & pulmonum vitio, suum & omnis pecoris remedium præsens esse, vel traiecta tantum auricula: lib. 26. cap. 7. Columella lib. 6. cap. 5. In Marſis montibus plurimam nasci, etiam ait, omnique pecori maxime esse salutarem, & quæ ratione ac modo auricula inferi debeat, docet. Feruntur & Buphtthalmi nostri radices pecorum morbos quosdam curare, si per auriculam perforatam inserantur: sed ea de causa Consiliginem esse consequi non debet. Diuersas siquidem stirpes similis vel eiusdem facultatis reperiri non est alienum. Nam & nigri Veratri radices idem posse testatur Plinius lib. 25. cap. 5. Pecorum, inquit, & iumentorum pi-
tuitas

trititas sanat, surculo per aurem traiecto, & postera die eadem hora exempto. Quod & experimentis nostra etatis rusticorum compertissimum est: qui Veratri nigri vulgaris radicibus, pecorum suorum morbis medentur. Præstant simile & Veratri albi radices, ut Absyrtus, & post eum Hierocles scribit: qui tamen Veratri albi radículas non in aurem, sed sub pectoris cutim insigunt. Quo modo etiam Vegetius Renatus, Consilagine vititur, Veterinaria sua lib. 1. cap. 12. de cura morbi subcutanei: tamen si lib. 3. cap. 2. de Malleo, ipsas etiam auricula inserendas scribat. Quæ satis ostendunt, diuersas stirpes similes subinde habere facultates; & ea de causa nequaquam consequi, Buphthalmum nostrum esse Consiliginem, quod perinde ac Consiligo pecorum morbis medeatur. Quod si ex facultatibus coniectura facienda est, Consiligo erit Veratrum album. Nam Vegetius eo omnino modo Consilagine vititur, quo Veratro albo Absyrtus & Hierocles. Auget hanc suspensionem, quod Vegetius hanc curandi rationem à Græcis accepisse putetur. Quæ de causa, etiam plerisque nihil aliud, quam Veratrum album, Consiligo videtur. Quod si ita est, multum à Consilagine præfens Buphthalmum differens erit: Veratro siquidem albo nequaquam assimile est.

Idem verò, Sesamoides, siue primum, siue alterum, non esse, notius est quam refelli debeat.

HELLEBORASTRUM verò & hoc ipsum improprie nuncupatur: proprie etenim helleborastrum dici potest, quod hellebori siue Veratri speciem ac similitudinem habet: istud autem Buphthalmum Veratri nullam speciem habet.

QUIBUS omnibus de causis nullam harum appellationum huic stirpi cōuenire visum est, sed solum Buphthalmi nomen, cum cuius descriptione, quæ apud Dioscoridem extat, quia exquisitissime hæc stirps conuenit, proprium ac legiti-

legitimum Buphtalmum esse existimamus. Buphtalmum siquidem cauliculos, ut Dioscorides ait, emittit molles & tenues, folia $\mu\alpha\rho\alpha\theta\rho\omicron\iota\delta\eta$, id est, speciem ac similitudinem foliorum fœniculi referentia; florem melinum, Anthemide maiorem. qualis omnino præsens stirps est, quæ tenuitate & multiplici sectione foliorum, speciem illam foliorum fœniculi tam exquisitè exprimit, ut nulla alia, parui folij, melius possit: ita ut citra omnem dubitationem hæc stirps legitimum Buphtalmum esse videatur.

NOMINATUR autem Buphtalmū etiam Cachla, aut potius Caltha. Caltha autem est Calendula, quam flore Buphtalmum nostrum proximè referre diximus. Sunt verò & qui velint Buphtalmum idem cum Chrysanthemo esse, Dioscoridemq; separatim locis, sub diuersis nominibus eandem herbam tradidisse. Sed hi si paulo diligentius Dioscoridis verba expendissent, aliter sentirent. Licet etenim in multis vtriusque descriptiones conueniant, non abest tamen proprietas aliqua, quæ differentes esse stirpes ostendat. Folia Chrysanthemi $\pi\omicron\lambda\upsilon\sigma\chi\iota\delta\eta$, id est, in multas partes diuisa & dissecta traduntur: Buphtalmi verò $\mu\alpha\rho\alpha\theta\rho\omicron\iota\delta\eta$. Non omnia autem quæ laciniosa sunt, & in multas partes dissecta, fœniculi foliorum speciem habent. Iam florem proferre Chrysanthemum Dioscorides ait $\iota\sigma\chi\upsilon\rho\omega\varsigma \sigma\iota\lambda\omicron\rho\tau\alpha$, hoc est, multum relucens: Buphtalmi verò relucens esse non tradit, neque etiam eius quod à nobis pingitur, flos ita splendet, ut multum relucens dici queat, aut debeat. An hæc euidentem Buphtalmi & Chrysanthemi differentiam ostendunt, & legitimum esse à nobis depictum Buphtalmum confirmant? Sentiant qui velint aliter, nobis ita videtur; & qui Chrysanthemum idem cum Buphtalmo esse volunt, aliud Buphtalmum, si istud esse negent, requirant. Nam quod & ab alijs & à nobis pro Chrysanthemo

depingitur, legitimum Buphtalmū esse nequit : folia enim eius non sunt μαραθοροῖδῃ, qualia omnino legitimi Buphtalmi esse debent.

QVOD verò ad facultates attinet : Matthiolus ait, in Bohemia omnes medicos & pharmacopæos huius radicibus, pro Veratri nigri vti, priuatim ad pecorum morbos : sed in medicamentis radices huius ἀντεμελλόμενας radicem Veratri esse non affirmat. Memini ego obseruasse me olim, à quibusdam medicis, huius radices, in quantitate satis magna adiectas fuisse, decoctis ad purgationem per inferna preparatis, sed nihilo plus ea aluum mouisse, quàm si non addita fuissent. Quod mihi suspicionem mouit nulla purgandi potentia huius herbae radices donatas esse : & alia omnino facultate, quàm helleborum, per auriculas transmissas pecorum morbis mederi. Gentiana radices ora fistularum nimis angusta egregiè dilatant, idem possunt Aristolochia & Bryonia radices, ac spongiarum partes ; quæ tamen viribus alijs multū inter se differunt. Quamobrem licet Buphtalmi radices simile aliquid Veratro nigro queant, idcirco tamen non omnia quæ illud possunt. Spina, aculei, ramenta lignorum & similia, dolorem inferunt, inflammationem excitant, vicinarum partium humores alliciunt, si in partem aliquam adigantur. Partem aliquam ledi absque dolore non contingit : is transmissa aut imposita vulneri re quapiam intenditur. Fortasse etiam si quiduis aliud in auriculam perforatam imponeretur, idem qui huius stirpis radice immissa, effectus subsequeretur. Nos nihil hic affirmamus ; curiosi vt diligentius vires huius explorent viam aperimus.

DIOSCORIDES Buphtalmi, ait, flores cum cerato tritos cœdemata & duritias discutere ; & dici, si statim ab exitu à balneis bibatur, bonum colorem ad aliquod tem-

pus

pus Ictericis facere. Videntur autem hac ex cap. de Chrysanthemo huc translata ab his qui inter Buphtthalmum & Chrysanthemum differentiam nullam esse existimarunt: Non aliter quàm nonnulla ex Asteris Attici facultatibus, Viola nigra apud Plinium accessere: & Dolicho legumini, in Dioscoridis exemplaribus, quadam Smilacis levis: vt suis annotauimus locis. Quæ autem propria sint Buphtthalmi vires, nondum compertum habemus.

DE CHRYSANTHEMO.

CAP. LXX.

CHRYSANTHEMO caules sunt ramosi, laeues, folia oblonga, digiti ferè latitudine, dissecta & multifida: flores Anthemidis sed maiores, & non medio tantum umbilico, sed & orbiculato ambitu lutei & auri quodammodo fulgore splendentes, odore non insuauis: radices fibrosæ. Reperitur in aruis, in hortis inter olera, & alibi passim: & quibusdam quidem locis, folijs magis confectis, alijs minus. Iunio, Iulio & subinde Augusto floret.

A Germanis Sant Johans blum / & Benzblum appellatur: à nostris vulgo Wokelaer / & quandoq; Beel ganse bloemen. Græci ab aureo florum fulgore χρυσάνθεμον nuncupant. Est tamen & Chrysanthemum Anthemidis quadam species, vt suprâ scripsimus. Batrachion etiam Chrysanthemum dicitur, testis Democritus in Geoponicis. Item & Elichrysum Chrysanthemum est. Sed hæc Chrysanthema ab isto præsentī differunt. Nominant verò & istud Chrysanthemum plerique Buphtthalmum & Caltham; quæ eius Buphtthalmi propria nomina sunt, quod capite præcedenti descriptum est. Non desunt quoque qui



Bellu
tem

coride
maca
existu
rem in

For
pingui
ram pli
fuis ter
forma
orbicul
ai in co
se. No
humida

Hv
de flori
rum fol
neo orbi
cupet; e
quam e
narrat
men res
calycib
fuis fimi
quoque
GE

GE

Bellidis speciem faciant, & luteam Bellidem dicant. Est autem Bellis alterius generis herba.

CAVLES autem Chrysanthemi olerum modo, Dioscorides tradit, eduntur. Flores cum cerato triti, stertomata discutere dicuntur. Ipsa herba pota in balneis post exitum de folio, morbo Regio correptis, brevi bonum colorem inducit.

DE BELLIDE. CAP. LXXI.

FOLIA Bellis è radicibus promit multa, parua, leuia, ¹pinguia, in rotunditate oblonga, lenissimè crenata, per terram plurima parte strata; inter quæ flosculi exennt, singuli suis tenuibus insidentes pediculis, Chamameli florum penè forma, sed minores, medio eorum luteo, quod multa exigua orbiculariter cingunt foliola, candida aliquatenus rubentia, ac in candore veluti purpurascencia: radices subsunt fibrosa. Nascitur in pratis & similibus perinde palustribus ac humidis compluribus locis. Vernis mensibus floret.

HVIC similis est, & alia species, sed hortensis tantum, ²& floribus multiplicibus, speciosissimis, tam denso exiguum foliolorum contextu, ut vix ullo, aut nullo, apparente luteo orbiculo, vniuersum & ambitum & medium floris occupet; colore aliàs rubentibus, subinde candidis, nonnunquam ex utroque permixto varijs, raro herbaceis aut viuentibus; odoris nullius. Circundant hos quandoque, sed tamen non frequenter, alij parui, sub ipsis, aut ex ipsis florum calycibus exorti quini seniue vel plures flosculi, matricibus suis similes, sed tamen minores. Floret hæc Bellis Apriliquoque & Maio mensibus.

GERMANI *Maslieben* & *Masfelsen* nuncupant: Belgæ, *Madelieuen* / *Kersendonwen* / *Margrietem*;



Plinij lo-
cus corru-
ptus.

Galli, Pasquettes & Marguerites : Plinius Bellidem, eiusq; meminit lib. 26. cap. 5. Bellis, inquit, in pratis nascitur, flore albo aliquatenus rubente. Est & apud Plinium lib. 21. cap. 8. de Bellio locus, quem non adducimus, quod corruptus sit, & in eo restituendo hactenus frustra docti laborarint. Recentiores Bellidem etiam Consolidam nominant minorem; plerique herbam Margaritam; alij Primulam

mulam veris. Sunt tamen & alia nuncupata Primula veris, Phlomidum species, de quibus alias.


AD Bellidus genus referūt & nonnulli sylvestrem quandam, maiorem nuncupatam Bellidem: caules hac profert tenues cubitum altos aut longiores; folia circa eos oblonga, nonnihil serrata, digiti ferè latitudine: flores in summo cauliculorum per circumferētiā candidos, medio luteos, Chamaemeli Leucanthemi & Cotula alba similes, nullius odoris; radices fibrosas. Nascitur in pratis & secus margines agrorum locis non apricis.

BELLIDEM, vt diximus, maiorem appellant: Germani, Fuchsio auctore, *Wenzblum*, nonnulli etiam Consolidam mediam. Alia tamen & Consolida sunt media, vt Bugula & Brunella dicta, quarum vtraque pro mediij generis Consolida habetur.

CÆTERVM Bellidis minoris folia humectandi refrigerandiq; facultate donata sunt; & humectant quidem ordine secundo intenso, refrigerant verò eodem remisso. Dolores omnes, sed præsertim articulares ac podagricos, ex calido siccoq; humore, mitigant; cum butyro recenti & infuso trita, ac locis dolentibus imposita, potissimum additis Maluæ folijs. Eadem oleribus addita, facilem aluum faciunt, & in caufonide feбри, ac in intestinorum inflammationibus, magna vtilitate enematis admiscuntur.

DE ELICHRYSO. CAP. LXXII.

ELICHRYSON cauliculos promit graciles, virentes, lignosos, in alas quasdam subinde diuisos: folia confecta abrotani similia, aliquantulum candicantia: flores in summo cauliculorum in umbellis coherentes, luteo auri colore fulgentes, forma florum Tanacetii vel mediij orbiculi siue



disci florum Anthemidis ; qui prius quàm flaccescant de-
cerpti , speciem suam ac pulchritudinem diutine seruant.
Qua de causa & deorum simulachra eo coronari solere ; &
Ptolomæum Aegypti regem diligentissimè hoc seruasse, Pli-
nius tradit. Exit plerisq³ Italiae ac Hispania locis incultis, in
pratibus solo gracili, ac circa fluuiorum alueos. In Belgij hortis
florebat Augusto, aut Septembri mense: Theophrastus tamen
& Plinius Elichryson inter veris flores numerant.

DIOSCORIDES ἐλίχρυσον appellat, nonnulli etiam
χρυσάνθεμον, alij inter quos Galenus est, ἀμάραντον, pro-
pter floris diuturnitatem. Alius tamen & Amarantus est,
purpureus, de quo supra scriptum. Plinius hanc stirpem He-
lichryson nuncupat: Theophrastus similiter ἐλεῖοχρυσον,
Gaza Aureliam vertit.


FACULTATIS, inquit Galenus, est incidentis &
extenuantis. Prodest coma, Dioscoride auctore, è vino pota
contra vrinae difficultates, serpentium ictus, coxendicorum do-
lores, & ad rupta; menses etiam prouocat: sanguinis gru-
mos & in ventre, & in vesica cum vino mulso sumpta dis-
soluit: defluxiones à capite sistit, trium obolorum pondere
ex vino albo diluto ieiunis data: vestibus inserta incorru-
ptas eas conseruat. Theophrastus Elichrysum ad ambusta
etiam torrefactum, & melli permixtum valere tradit.

DE STOECHADE CITRINA, SIVE
CHRYSOCOME. CAP. LXXIII.

AUREI coloris coma Elichryso similis est, à recentio-
ribus Stoechas citrina nuncupata. Cauliculos hæc edit do-
drantales, tenues: folia oblonga & angusta: vtraque incana
& lanuginosa: flores in summo cauliculorum, in dissoluta
inconditaq³ veluti umbella, odoratos, exiguis bullis similes,

℞ s

colore



colore luteo splendentes, qui priusquam plenè maturuerint collecti, colorem & pulchritudinem non marcescentes, diu retinent: radices graciles ac nigras. Nasçitur locis asperis & sabulosis & in conuallibus, frequens iuxta Rhenum, præsertim inter Spiram & Vormaciam. Iunio mense & post Solstitium floret.

GERMANI quòd in regionibus, quæ Rheno vicine sunt, proueniat, Rheinblumen nuncupant: Item & Jungling / Motten blumen / Motten kraut: Belgæ, Rhtjn bloemen / Motten cruyt: Latine Tineariam: Officina Stœchadem siue Stichadem citrinam: Fuchsus & Tragus Eliochrysum faciunt. Nihil autem, aut omnino parum, cum eo conuenire, ex ijs quæ superiore capite scripta sunt, palam est. Ageraton esse, etiam sunt qui sentiant, propterea quòd flos bullarum instar globosus sit, & non facile aut citò marcescat: ἀγνεάτου siquidem flos πομφολυγῶδες, id est, bullæ modo tuberosus est, & diutissimè in sua coloris specie conseruatur: sed folium Agerati, Origani folio simile est, tale autem nequaquam Stœchadis citrina, quod diximus oblongum & angustum esse; vnde etiam non esse Dioscoridis Ageraton, euidentius est. Nobis Stœchas citrina cum Chrysocome, quæ & Chrysitis, similitudinis plurimum habere videtur; breuis siquidem est herba, coma aurei coloris, eaq; diuulsa & corymborum similitudinem referente, radices tenues sunt & nigre; qualem omnino Chrysocomen esse Dioscorides scriptum reliquit. χρυσόκλμν, ait, ἐαδίων ἐστὶ σπιθαμιαῖον, ἔχον κόμην κορυμβοειδῆν, ὁμοίαν ὑσσώπῳ· ῥίζαν δασεῖαν, λεπτὴν, ὥς ἐλλεβορου μέλανος, γευσάμενός δὲν ἀπὸν, κυτρίων ἴσθην ὁδῶν, id est, Chrysocome herbula est dodrantalis, comam habēs corymborum specie, similem Hyssopo; radicem hirsutam tenuem, vt veratri nigri, gustu non iniucundam, Cypero similem.

IN qua descriptione occurrit obseruandum, verum & legitimum antiquorum hyssopum, corymborum quandam similitudinem summis cauliculis proferre; atque ea de causa vulgaris vsus hyssopum, nequaquam esse genuinum: vt pote quod flores non in corymbis aut corymborum specie ferat, sed secundum cauliculos iuxta singula foliola edat; Thymbra videlicet modo, cuius haud dubio species, & maior quidem est.

² STOECHADI autem citrina & aliam similem obseruare contigit herbam, ramulis à radice multis tenuibus, folijs angustis, aliquantulum sed minus multo quam Stœchadis citrina albicantibus: floribus in umbella luteis, non tamen globosis, sed medio orbiculo florum Chamameli similibus, sed minoribus. Quo loco sponte exeat compertum non habemus, in Belgij hortis à nobis visa est. Anonymos quoque & absque nomine est. Eliochrysi speciem angustifoliam nonnulli faciunt.


CAETERVM Stœchadis citrina flores in vino decocti, potu ventris lumbricos expellere feruntur: & cum lixiuio pediculos & lentes delere.

CHRYSOCOMES radicem, Dioscorides ait, excoalfacere & adstringere, conuenientemq; esse hepaticis & peripneumonicis: sumi & cum hydromelite decoctam ad vteri purgationes.

DE SANTOLINA. CAP. LXXIIII.

AUREI coloris corymbos Santolina quoque veluti Eliochryson & Stœchas citrina profert, odorata est & coronis non raro admiscetur. Eius aliquot sunt genera.

¹ PRIMA caudice surgit lignoso, ex quo virgula, ramulorum instar, tenues, cubitales complurima, folijs circundata.



cundata paruis oblongis, angustis denticulatis: è summo virgularum, singuli eminent orbiculi, ex breuibus staminibus farti, Tanaceti floribus, & medijs discis florum Chamæmeli similes, sed tamen aliquantulum latiores, colore lutei, qui in semina obscuri coloris permutantur: radix lignosa. Est ipse frutex cauliculis & folijs albicans, & suauiter cum grauitate quadam odoratus.

2 HVIC similis est & altera species, folijs tamen longioribus, virentioribus ac minus candidis; flore pallidiore.

3 TERTIA folijs breuissimis, tenuissimis & Erica proximis: floribus luteis, & aliarum similibus.

4 QVARTA folijs est minus denticulatis & cupresso similioribus.

5 QVINTAE cauliculi non eriguntur, sed procumbentes per terram repunt: folia crassiora & lanuginosiora magis canescunt: flores in corymbis aurei, aliarum Santolinarum similes.

IN Belgio omnes peregrinae sunt, neque alibi quàm in hortis reperiuntur. Primum genus familiarissimum; reliqua rariora. Florent Iulio & Augusto. Appellantur hæ omnes vno Santolina nomine: Belgæ vulgo Cypres nominant. Chamæcyparissum plerique faciunt; sed de Chamæcyparisso adeò breuis & succinctus est Plinius, vt ex eo, horum sententia nec reijci, nec probari queat. Officina semen, semen contra vermes, & semen sanctum appellant. Quod nonnulli ignorantes ex qua stirpe colligatur, Santonici semen esse existimant; alij Seriphij siue Absinthij marini. Vtrique autem à vero aberrant, nec etenim alterius quàm Santolinae est. Hallucinantur etiam non parum, qui Santolinam Abrotanum feminam esse volunt. Abrotanum siquidem femina folijs est maris, Seriphij videlicet, sed procerius & fruticis modo arborescens. Santolina humilior est & non Seriphium,

riphium, sed proximius Ericam folio exprimit. Plus similitudinis cum Abrotano femina Elichryson habet, folio namq³ Abrotanum refert, odoreq³ ei vicinum est, non tamen Abrotanum, sed sui generis herba.

EST autem Santolina semen, gustu amarum, potentia calidum siccumq³, tertio ordine: ventris lumbricos sumptum interimit, & aduersus eosdem efficax est.


PLINIUS Chamacyparissum herbam, ait, ex vino potam, contra venena serpentium omnium, scorpionumq³ pollere.

DE MAIORANA, SIVE MARO.

CAP. LXXV.

POST flores, coronaria aliquot describende sunt herbae: inter quas Maiorana, quae humilis & fruticosa est stirps, candicans & suavis admodum odoris, sesquipalimum aut pedem alta; cauliculis siue surculis tenuibus, in plures alas diuisis; circa quos foliola sunt penè rotunda, mollia & incana; & in summo flosculi candidi perpufilli, è spicis Heracliotici Origani similibus exeuntes, exiguis videlicet, oblongis, & squamatim compactilibus: radicibus tenuibus. Reperitur haec quandoque maior, subinde tenuior ac minor, odoreque praestantior. Hortensis vtraque est. Vtraque aestate quoque floret.

ITALI Persam, & minorem Persam gentilem nominant: Germani, Mayoran & Meyran: Belgae, Mariolepyne: Galli, Mariolaine & Marone: Officina & passim Maioranam. Creditur veterum Sampsyichum. Sed Σαμψύχον herba est, Dioscoride auctore, per terram repens; Maiorana verò non repit, sed in rectum & altum assurgit;



assurgit; quod eam non esse Sampsychum, vel solum, manifeste innuit.

SCRIPSIMVS aliâs Maioranam legitimam Ma-
rum

rum esse; confirmat sententiam nostram Maiorana nomen, quod à Maro videtur derivatum; sed apertius ipsa Mari descriptio, cum qua exactissimè conuenit. Herba siquidem est fruticosa, flore vt diximus Origani, folijs candidioribus, flore odoratiore. Cuiusmodi Marum esse Dioscorides scriptum reliquit. Μαρόν, αἶτ, ἢ ὑσόβριον, πῶς γινώσκω, φρυγανώδης, ὁμοία τῷ ἀνθει δριγάνῳ, τὰ μέντοι φύλλα τούτοις λευκότερα πολλῶ, καὶ τὸ ἄνθος ἐυωδέστερον: hoc est, Marum siue Isobryon nota est herba, surculosa, flore Origano similis: folia tamen huius candidiora multo, & flos odoratior. Et substitutam pro Sampsycho Maioranam, alienum putari non debet, quando & ipso Galeni tempore Marum Sampsychi loco in Amaricinum vnguentum fuerit immissum: vt lib. 1. de Antidotis ipse testatur, vbi ait; Marum longè odoratius esse Sampsycho; & ea de causa hoc omisso, Marum fuisse compositionibus additum. Præbuit istud occasionem posteris, vt Marum siue Maioranam, Sampsychi loco habuerint, eiusq; nomine appellauerint.

EXCALFACIT autem Maiorana & resiccat, & in vtraque qualitate secundi est ordinis: auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis quouis modo assumpta: naribus imposita sternutamentum facit & pituitam euocat: dentium dolores lenit commansa aut apposita; vrinas & aquosos humores in potu sumpta ducit, & menses mouet: admisceatur antidotis.

DE SAMPSYCHO, SIVE AMARACO EX
DIOSCORIDE, THEOPHRASTO,
ET ALIIS. CAP. LXXVI.

SAMPSYCHON, Dioscorides inquit, herba est πολυκλῶρος, siue multum ramosa, serpens per terram, folia habens

habens hirsuta & rotunda, similia Calamintha tenuifolia: multum odorata & calida, qua in coronis neçitur, Cyzicenum & Cyprium laudatissimum. Secundum locum habet Aegyptium. Appellatur à Cyzicenis & Siculis Αμαράκον siue Amaracum.

THEOPHRASTVS Amaracum in censu φρυγανίων siue suffruticum satiuorum ac coronariorum lib. 6. enumerat, & prestare ait, seminis copia, quod εὐοσμὸν, id est, boni ac suavis est odoris; nasci semine & auulsione: ex aestiuis esse, vnguentisq; misceri.

PLINIO lib. 21. cap. 11. auctore, Amaracum Diocles medicus & Sicala gens appellauere, quod Aegyptus & Syria Sampsyichum: seritur utroque genere, & semine & ramo: copiosum Amaraco aequè ac Abrotano semen.

VERGILIUS Aeneid. 1. Amaracum fruticem floriferum esse ostendit, sic scribens:

— Vbi mollis Amaracus illum

Floribus, & dulci aspirans complectitur vmbra.

Idem testatur Catullus in Epithalamio Iulie & Maltij:

Cinge tempora floribus

Suaue olentis Amaraci.

GALENVS Amaracum & Sampsyichum differentes facit stirpes, de utroque locis agit separatim, & suas cuique tribuit vires. Sed Amaracus Galeni Parthenium est: siquidem, vti Dioscorides testis est, Parthenion quidam Amaracum vocant; & in libris de simpl. Medica facult. Galenus nusquam Parthenij meminit.

PORRO Sampsuchum, vt Galenus ait, tenuium est partium & digerentis facultatis; desiccatur & exalfacit tertio ordine. Dioscorides decoctum eius potum tradit, conuenire hydropicis in morbi initio; & vrina difficultate, ac torminibus laborantibus: arida verò folia cum melle appo-


fit,

fit a , tollere sugillata ; & menses ducere subdita , ad Scorpionum ictus cum sale & aceto imponenda ; ad luxata verò cum cerato excepta , & similiter œdematis ; ad oculorum verò inflammationes cum tenuissima polenta farina apponenda : misceri acopis & malagmatis calfacientibus.

DE MARO VVLGARI, SIVE CLINOPODIO. CAP. LXXVII.

QVOD à plerisque modo Marum nominatur, frutex parvus est, odoris admodum suavis, sesquipedem aut duos dodrantes altus: surculos habet tenues, ramosos, lignosos, & foliola circa eos exilia, durioris Thymi aut Serpylli vulgaris folijs similia, sed albicantia, candidiora, & aliquantulum maiora, ac in summo veluti lanuginosa capitula, & ambientes similes verticillos; è quibus perpusilli flosculi exeunt albi: radices tenues & lignosas. In Hispania passim una cum Stœcade locis aridis desertisq; gignitur: apud Belgas & alibi, non absque studio, & cura in hortis seritur. Aestate verticilli & capitula lanuginosa, cum floribus emicant.

MULTI hac ætate Marum vocant; Marum autem nequaquam est, verum Dioscoridis Clinopodium. Clinopodium autem Dioscorides θάμνιον, id est, exiguum fruticem esse refert, ορυζανόδον, siue surculaceum, duorum dodrantum, in petris nascentem, folia habentem Serpyllo similia; flores verò lecti pedibus, ex interuallis uti Marrubij. Cum qua descriptione hæc odorata stirps satis conuenit. Surculacea etenim est, & ad duorum dodrantum altitudinem asurgit; flores ita habet per verticillos digestos, ut quibusdam caulem veluti Marrubij ambientibus, alij in summo instar globosum lecti pedis capitulum emineant: folia Serpylli veri folijs colore similia, nempe candicantia; qualia



Smyll
Origan
phragm
Clinopo
verid
pyran, l
Vi
obinet
cienium
ham fer
fiarum
mens
tum: al
non febr

D

Co
caudice
tenibus
caudice
non ingy
tus, e fol
pro radie

IN G
lus & in
preuentu
lacta bo
et primo
Ascar

nam coro

Serpylli esse Dioscorides ostendit, quando candidiora, quam Origani esse ait: sunt eadē tenuia, veluti Serpylli esse Theophrastus testatur. Quae omnia maximam huius stirpis cum Clinopodio similitudinem ostendunt. Appellatur verò κλινωπόδιον, à quibusdam etiam Cleonicum, Ocymoides, Zopyron, Latinis lectipes.

VIM autem, vt Galenus, Clinopodium excalfaciendū obtinet, cum essentia subtili, & in tertio est, cum excalfacientium, tum resiccantium ordine. Dioscorides bibi herbam scribit, & decoctum eius aduersus venenatarum bestiarum morsus, conuulsa, rupta, & vrina stillicidia; ducere menses: foetus & acrochordonas eijcere aliquot diebus potum: aluum idem sistere ad tertias decoctum & bibitum; non febricitantibus in vino, febrientibus in aqua.

DE ROSMARINO CORONARIO.

CAP. LXXVIII.

CORONARIUS Rosmarinus frutex est lignosus, caudice subinde tres aut quatuor pedes alto; ramis multis tenuibus: folijs crebris, oblongis, angustis, duriusculis, subtus candicantibus, superius verò saturi viroris, cum granitate non ingrata odoratis: floribus paruis ex caeruleo albicantibus, è foliolorum sinubus prodeuntibus: semine exili & nigro: radicibus tenuibus, fibrosis, non altè descendentibus.

IN Gallia, Hispania, & alijs prouincijs locis syluestribus & incultis nascitur; tantus eius in Narbonensi Gallia prouentus, vt haud temere aliud incolae lignum vrant. In Italia hortorum sepit areas: Belgarum etiam exornat. Floret primo quoque Veris tempore.

Λιβανωτίδα στεφανοματικὴν Graeci, Latini Rosmarinum coronarium, nominant. Coronarium autem cognomi-

natur, ad differentiam aliarum *umbelliferarum* *Libanotidum*. *Libanotidum* siquidem species complures sunt; quaedam *umbellifera*, vna non *umbellifera*, forma ab alijs differens, *coronaria*, de qua nunc agimus. Germani hanc *Rosmarin*, & similiter Galli nuncupant.

CALIDVM autem & siccum *Coronarium* *Rosmarinum* secundo est ordine, & simul adstringentis facultatis particeps; vipote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, cōpositum. Proinde & omnes vteri diuturnos fluxus sistit, & sanguinis profluvia suppressit. Conuenit etiam, & praesertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humidag; causa malis: cerebrum etenim desiccant: sensu & memoriam acuiunt: nervosas partes confortant.


SERAPIO *Rosmarinum*, quo *Coronarij* vtuntur, calfacere & multum resiccare, testis est; & ex auctoritate *Abin Mesuai*, conferre, ait, coriza frigida cerebri.

DIOSCORIDES regium morbum sanare tradit, si quis ipsum in aqua coctum, ante exercitationem bibat, deinde exercitatus lauet, & vinum bibat.

DE LAVANDVLA. CAP. LXXIX.

ODORATA & *coronaria* stirps *lauandula* est, sed humilis, ramulos siue virgas profert tennes, quadrangulares, geniculatas, cubitales aut longiores: folia circa singula genicula bina, oblonga, carnosae, vtraque parte albicantia. *Rosmarini* *coronarij* folijs multo longiora latiorag; & in summo spicas oblongas tennes, floribus refertas caruleis: radices lignosas in fibras diuisas. Spirant flores & folia copiosum caputq; implentem odorem.

VNA huius species folijs est maioribus, crassioribus & longio-



longioribus, quæ odoratior: altera minoribus & tenuioribus: inuenitur & flores candidos habens.

VESTIVNTVR in Hispania & Narbonensi Gallia plerique montes & campi deserti Lauandula. In reliqua Gallia, apud Germanos, & alibi in hortis seritur. Iunio ac Iulio flores exeunt.

ITALI maiorem, Nardum Italicam, & Spicam, vulgariq; lingua Spigo nuncupant: minorem, Lauandam & Lauandulam: Germania & Belgium vtramq; Lauandulam & Lauendulam vocat: & maiorem quidem Lauandulam marem; minorem feminam: vulgo Lauender. Existimatur esse Casia odorata herba, cuius Vergilius subinde meminit, vt Bucolicôn Ecloga secunda:

Tum Casia atque alijs intexens suauibus herbis

Mollia luteola pingit Vacinia Caltha.

Et similiter Georgicôn quarto, vbi agit de statione & sedibus apibus deligenda, apiarioq; constituendo, his verbis:

Hæc circum Casia virides, & olentia latè

Serpilla, & grauitè spirantis copia Thymbra

Floreat.

EST tamen & alia Casia ούγρυξ siue fistula, quæ passim hoc tempore Cinamomum & Canella appellatur. Plinius Casiam ab Hygino Cneoron appellari refert. Sunt autem Theophrasto ac Plinio auctoribus Cneora duo: vnum candidum, folio carnosò, oblongo, figura quodammodo oleagino simili, odoratum: alterum nigrum, nullius odoris: radice virique altè descendens, grandis, ramuli permulti, crassi, lenti: germinant florentq; post Autumni æquinoctium, & multum denique temporis florent. Talis autem nequaquam Lauandula est, quæ nec crassa est radice, nec altè descendente; ramulis non lentis, & non Autumno, sed Æstate flores profert; proinde etiam nec Cneori aliqua species.

EST

Cneoron.

EST autem *Lauandula*, potentia ac viribus calida sicca³, & ordine quidem tertio, tenuium item partium & ex multis aëreis spirituosisque³ partibus constans: frigidis ea de causa capitis morbis quouis modo adhibita confert, & praesertim ijs, qui non ex copioso humore, sed ex sola potissimum qualitate originem ducunt. Proinde & stillatitius eius liquor odoratus, & temporibus ac fronti illitus, Catalepsi, leuiori hemiplexia, & subinde Comitiali morbo, ac non raro syncope laborantes reficit. Sed ubi humorum copia adest, praesertim sanguini permixtorum, non satis tutus huius usus est: sicuti neque compositionis, quæ ex stillatio vino in quo huiusmodi herbae, flores, seminae, & aromata quadam macerata sunt, conficitur; quam plerique temerè & indifferenter exhibent. Nam calidorum huiusmodi caput implentium usu, & morbus intenditur, & ager in periculum inducitur: praesertim quando sanguinis missio aut purgatio non praecesserunt. Quod ideo monendum duximus, quia passim plerique medici indocti, & temerarij audacesq³ nimium pharmacopœi, aliaq³ stolidæ mulieres statim similes compositiones, & id genus alia non modo apoplecticis, sed & Catochis cum febre occupatis infundunt, quibus nihil potest peius dari, cum plurimum obsint, & non raro ipsos aegrotantes perimant.

DE STOECHADE. CAP. LXXX.

STOECHAS caudice est uti *Lauandula* breui & lignosa, sed tenuiore: ramulis siue virgulis multis ac tenuibus; folijs circumuestitis oblongis, angustis, candicantibus, minoribus quam *Lauandula*; comantibus in summo capitulis, siue spicis densis, compactis, breuibus & crassis, e quibus flores purpurei & pusilli exeunt, & quadam eminentia foliola: semen in his subnigrum: radices lignosæ.



H
sile
da
facile
cellas
patie
A
oi dip
officiu
C
comp
string
que a
ctione
ra om
eius
dotis
prale
eius
esse
tione
nam

T
loron
C
cat
cacu
bus

HISPANIA, Narbonensis Gallia, & Stœchades insula è regione Massilia, Stœchade herba siue frutice redundant. In Germania ac Belgio è semine sata prima astate facile adolescit; sed hyeme, nisi intra ades aut penuarias cellas transferatur, perit; Hyemis siquidem & frigoris impatiens est.

A Dioscoride *στίχας*, ab alijs, ac à Galeno *στοίχας*, per oi diphthongum syllaba secunda: Latine Stœchas. Florem officina Stœcados nuncupant.

CÆTERVM Stœchadis, Galenus inquit, temperies composita est, ex terrena essentia frigida exigua, vnde adstringit; & extenuata altera terrena copiosiore, à qua vitæque amara est, ob vitrorumq; verò conuenientiam, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum viscera omnia, tum totum corpus est nata. Dioscorides decoctum eius tradit, veluti hyssopi, ad pectoris vitia facere, & antidotis vtiliter admisceri. Posteriores medici Stœchadem, & præsertim flores eius, aduersus capitis dolores, & omnes eius ex frigidity ac frigida causa morbos, valde efficaces esse affirmant: miscentur ea propter, omnibus ferè compositionibus, quæ aduersus Cephalalgiam diuturniorem, Apoplexiam, Catalepsin, Epilepsin, & similes affectus adhibentur.

DE THYMO. CAP. LXXXI.

THYMI duo apud veteres sunt genera: vnum Cephaloton dictum; alterum durius.

CEPHALOTON multis exilibus ac tenuibus fruticat virgis, folijs exiguis & copiosis circumdatis: capitulis in cacuminibus Stœchadis ferè similibus, sed minoribus; è quibus flosculi exeunt purpurei. In Creta insula copiosum nascitur:

tur: unde illi Cretico cognomen datum est. Dioscorides græci solo & petroso provenire scribit.

- 2 DURIUS Thymum furculosum quoque est, & perpusilla habet foliola; colore quod vulgatissimum est virentia, & suave odorata; candida verò & graueolentiora, quod rarius est: flores verò non in capitulis aut spicis, sed iuxta foliola: radices tenues. Huius generis Thymo, Hispania & Narbonensis Gallia loca deserta & inculta abundant: In Germania, Belgio, & alibi in hortis studiosè colitur.

GRÆCIS Θύμος dicitur, Latine Thymus, & Thymum. Prior κεφαλῶτος, id est, capitatus, & δῦσιον: alter σκληρότερος, id est, durior à Dioscoride, cap. de Epithymo, cognominatur. Plinius Thymi duo genera esse tradit: vnum candidum; alterum nigrinus ac nigricans appellat: & candidum præstare ait, ac in collibus nasci; lib. 21. cap. 21. Vtrumq; ad durius genus referendum videtur, nam ut scripsimus, durioris Thymi quoddam folia habet candicante; aliud verò virentia, quod nigricans dicitur, quia saturo colore & non candicante vireat. Germani ac Belga Thymum/Thymus: Galli, du Thym nominant.

THYMVM autem, ut Galenus tradit, in excalfaciendo exiccandoq; in tertio statuendum est ordine, incidit & calfacit vehementer; ob id & vrinam & menses prouocat, foetum euellit, viscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert. Potum, Dioscorides scribit, cum sale & aceto pituitam per aluum ducit. Decoctum eius cum melle Orthopnoicis & Asthmaticis prodest. Lumbricos ventris, menses, foetus, & secundas pellit: vrinam cit. Mixtum mellis & delinctum, faciles è thorace excreationes facit. Oedemata recentia cum aceto impositum discutit, sanguinis grumos dissoluit: thymos & ἀνποχρῶδες siue pensiles verrucas

verrucae tollit. Ischiadicos cum vino & polenta impositum iuuat. Hebetibus oculis in cibo sumptu prodest. Vtile etiam pro condimento tempore sanitatis.

DE SERPILLO VVLGARI.

CAP. LXXXII.

VVLGARI Serpillo multi sunt exiles cauliculi, duri tamen & lignosi, nonnulli in rectum palmi altitudine surgentes, alij repentes, & alicubi terra superficiei exiguis fibris annexi: folia exigua, virentia, Thymi similia: capitula in cacuminibus rotunda, è quibus flosculi exeunt, colore rubente purpurei, non raro etiam albi: radices tenuissima ac fibrosa.

NASGITVR passim locis incultis, iuxta agrorum margines, pingui praesertim & fecundo solo: subinde etiam locis petrosis: & non modo in Germania aut Belgio, sed & in Italia ac Gallia sponte exit. Matthiolus apud Goruienses Saluatino monte copiosissime nasci refert. Tota fere Aestate floris eius prouentus.

GERMANI, Quendel/kumel/ & kienlin: BELGA, Quendel/wilden Thymus/ & onser Woutwen bedstroo: Galli, Pillolet: Officina, Serpillum; pleraque verò etiam Pulegium montanum nuncupant. Et passim quidem Serpillum veterum existimatur: non tamen tam Serpillis, quam Saxifraga Dioscoridis respondens. Si etenim diligenter, & ad Serpilli viriusque, & ad Saxifrangæ descriptionem expendatur, exiguum Serpillis, plurimum verò Saxifrangæ simile esse comperietur. Primum etenim Serpillum, praeter quod ramulis & folijs Origano simile est, in quantamcunque altitudinem adminiculo sultum, aut viciniis stirpibus innixum crescit, & quandoque ex Ocymo
per



per nimiam siccitatem mutato gignitur : alterum verò non
 serpit, & folio est Ruta, id est, Hyperici aut Cētaurij mino-
 ris (vt alibi ostendimus) longiore . Serpillum verò vulgare
 humile est, frutices non conscendit, ex Ocymo non proue-
 nit, & folijs est, multo quàm Hyperici aut Centaurij mino-
 ris, minoribus & breuioribus; omnino videlicet exiguis, ac
 Thymi, vt diximus, folijs similibus. Ex his Serpillum vulga-
 re, non Serpilli veterum aliquam speciem, sed Saxifrangam
 Dioscoridis esse, palam est. Saxifrangam enim, ait, esse her-
 bam Thymo similem, in petris nascentem. Serpillum autem
 vulgare Thymum folijs & capitulis refert, & non raro in
 locis petrosis reperitur : propter eam siquidem quam cuni

Thymo

Thymo similitudinem habet, sylvestre Thymum & à Belgis, & ab alijs nominatur.

VERBA Dioscoridis de Saxifraga sunt: Σαρξίφαγον, Saxifraga. οἱ δὲ σαρξίφαγον, οἱ δὲ ἐμπέτρον: ῥωμαῖοι σαξίφαγγα, δάμνος ἐστὶ φρυγανώδης ἐν πέτραις καὶ τραχεῖς τόποις φεόμενος, θυμῷ ἐμπεγής. hoc est, Sarxiphagon, alij Sarxiphangon, alij Empetrum, Romani Saxifraga, frutex est furculaceus in petris & asperis locis nascens, Thymo similis. Exemplaria quadam ἐπιθυμῷ ἐμπεγής legunt, sed emendatiora θυμῷ habent.

Locus
Dioscori-
dis resti-
tutus.

FACULTATE autem Serpillum vulgare calidum & siccum est, tertio penè ordine; tenuium item partium & incidens: menses euocat; vrinam cit: calculos expellit; & in balneis ac fomentis adhibitum, sudorem euocat.

EADEM ferè de Saxifraga Dioscorides memoria prodidit: cocta, aut, in vino febricitantibus opitulatur: stranguria prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit: & vrinam cit.

DE SERPILLO EX DIOSCORIDE,
THEOPHRASTO ET ALIIS.

CAP. LXXXIII.

SERPILLUM Dioscoride auctore, duorum est generum: hortense & sylvestre.

HORTENSE coronarium est, & odore Sampsy-
chum refert: folia habet & ramulos Origani similia, multo candidiora; iuxta sepes relictum procerius assurgit.

ALTERUM non serpens sed erectum, ramulos emit-
tit tennes furculosos: folijs refertos Rutæ similibus, angustioribus tamen, oblongioribus, durioribusq;: flores gustu
acres,

acres, odore suaves: radix inutilis. Nascitur in petris efficacius, & magis excalfaciens satiuo.

THEOPHRASTVS de historia stirpium, lib. 6. Serpillum tradit ex suffruticibus esse, lignosis ac coronarijs: ac ramis & folijs tota sua natura odoratum, veluti Helenium & Sisymbrium; apud nonnullos etiam Thymum penitus redolere: summa terra adhaerere; radice multifida torrida; peculiarem illi auctiorem germinum; quippe cum in quantumvis longitudinis procedere valeat, nactum adminiculum, aut iuxta sepes aliquas satum: squalorem pati, atque aquae paucae indigum: nasci ex Ocimo per immodicam siccitatem degenerante; lib. de causis quinto, Ocimo videlicet ipso, minoris folij, sed odoris potentioris facto. Vnde colligendum, Serpillum Ocimo esse odoratius & folijs minoribus.

SYLVESTRE Serpillum idem, quoddam esse ait, quod deferentes ex montibus ferunt, ut apud Sicyonem fieri solet, atque etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios verò, ut in Thracia, montes & plana omnia Serpillo scatere. Sylvestre autem istud, à Dioscoridis sylvestri aliud est: sola etenim cultura ab hortensi differt: veluti Theophrastus ipse ostendit ex montibus translatum seri referens.

DIOSCORIDI aduersatur Plinius lib. 20. cap. 22. ubi sylvestre ait serpere, satiuum verò minimè. Serpillum, inquit, à serpendo putant dictum, quod in sylvestri euenit maximè in petris. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increfcit.

MEMINIT Serpilli Aelianus varia historia lib. 9. & ipsum inter flores numerare videtur. Dionysius Iunior, inquit, in Locresium urbem veniens maximas ciuitatis domos occupauit, easq; Rosi, Serpillis, alijsq; id genus floribus strauit. Vergilius tamen Bucolicòn ecloga secunda, Serpillum

pillum herbam esse manifestissimè testatur his verbis:

Thestylis & rapido fesis messoribus astu

Allia, Serpillumq³, herbas contundit olenteis.


Ex quo loco colligendum sunt qui putent, vulgare Serpillum, verum & legitimum esse, quod videlicet non aliud passim in Italia sponte gignatur: quasi nullibi quàm in agro reperiri, & non in hortis serì potuisset.

SERPILLVM autem Græcis ἐρπυλλος ἢ ἐρπυλλον dicitur. Marcellus vetus auctor, à Gallis antiquitus Gilaurum nominatum affirmat, vt verò Plinius Valerianus ab eisdem Laurio nuncupatur.

EXCALFACIT verò vsque adeò Serpillum, vt Galenus dicit, vt & menses & vrinas moueat: gustu multum est acre. Prodest etiam, vti Dioscorides addit, ad tormina, rupta, conuulsa, iocinoris inflammationes, & ad serpentium morsus, & potum, & impositum; capitis dolores mitigat coctum rosaceo permixtum: cum aceto irrigatum maximè quidem lethargicis, sed & phreneticis conuenit: sedat & sanguinis vomitus quatuor drachmis potus cum aceto succus eius.

DE OCIMO. CAP. LXXXIIII.

SATIVI Ocimi species magnitudine differentes duæ sunt vulgares, ambæ furculosæ, dodrantis aut pedis altitudine attolluntur; ramulis rotundis in plures alas diuisis. Et maior quidem folia habet lata, per margines leniter crenata, Mercurialis herba magnitudine & forma similia: minor verò minora: vtraque splendida, & dilutè viridia: flosculos exiguos, colore vel candidos, vel obscurius purpurascens: semen exiguum, nigricans: radices oblongas duras non absque adherentibus fibris: odor vtri-
que



que se
que se
appe
M
rium
Amat
ly: fin
S
rimé,
positu
men
ius re
im qu
On
lani; n
Ocym
genus
scribit
scrip
gium
mani,
Basilic
flucum
O
dem est
cremen
intra co
concoqu
Di
visum b
euocat
qui faci

que similis, nisi quod maioris, species quadam reperitur, que Citrium malum odore refert, quod Ocimum citratum appellant.

MATTHIOLVS præter hæc duo Ocima, etiam tertium quoddam maximum reperiri, memoria prodidit, folijs Amaranti maioribus, longis, latis & crassis, Citrea mali folijs similibus.

SERITVR Ocimum in hortis & in fictilibus; celerime, vt Theophrastus auctor est, prouenit. Quod Soli expositum est, eodem teste, transit in Serpillum; quia vehementius siccatur; folia namque minus, odoreq; vehementius redditur. Iunio ac Iulio Ocimum floret, & particulim quidem, ac diu, ab imo incipiens.

Οκίμων, & per ω prima syllaba Οκίμων Græci appellant; nonnulli etiam ὀκίμων: Latine Ocimum. Differt ab Ocymo quod ostendimus in Frumentorum historia, pabuli genus esse, & ad differentiam huius per υ secunda syllaba scribitur; tamen si & per υ, odoratum Ocimum quandoque scriptum reperitur. Recentiores Βασίλικον, Latine Regium id est, quoque nominant: Officina, Basilicum: Germani, Basilgen. Belgæ, Basilicom: Galli, Basilic: Itali, Basilico, & quod minus est, Basilico gentile: pleriq; Basilicum Gariophyllatum hoc vocant.

OCIMUM autem, auctore Galeno, ex secundo quidem est ordine ex calfacientium, sed humiditatem habet recrementitiam adiunctam, ob quam commodum non est vt intra corpus sumatur: sed foris adhibitum ad digerendum concoquendumq; idoneum est.

DIOSCORIDES Ocimum, ait, si multum edatur, visum hebetat; aluum molliat, flatu mouet, vrinam cit, lac euocat, sed agrè conficitur: impositum verò cum polenta tenui farina, rosaceo & aceto inflammationibus medetur, &

Draconis marini ac Scorpionis plaga ; per se & cum vino Chio, oculorum doloribus.

SVCCVS oculorum caligines purgat, & defluxiones exiccat.


SEMEN potum prodest atram bilem colligentibus, suspiriosis, & vrina difficultate laborantibus : facit idem sternutationes frequentes, si per nares attrahatur : idem ipsa herba facit. Claudere autem oculos oportet, sternutatione vrgente.

SVNT qui Ocimum vitant, & non edunt ; eo quod commansum & in sole positum vermiculos gignat. Aphri adiiciunt eos qui à Scorpione icti sunt, & ipsum comederrunt, absque dolore permanere.

RECENTIORES, inter quos Simeon Zethy est, Ocimum tradunt olfactu cordi capitique prodesse : semen cardiacis affectibus succurrere, animi mœrorem ab atra bile ortum discutere, & hilaritatem letitiâq; procurare.

DE OCIMO SYLVESTRI VVLGARI, SIVE
ACINO. CAP. LXXXV.

QVOD recentiorum plerique Ocimum sylvestre nuncupant, cauliculos promit complures quadrangulares infirmos, terram versus reclinatos : folia ex intervallis bina contra se posita, parua longiuscula ac latiuscula, aliquantulum hirsuta & aspera, vti & cauliculi : flosculos è foliorum sinubus exeuntes, paruos, orbiculatim cauliculos ambientes, colore è candido nonnihil purpurascens : semen exile : radices fibris coherentes. Odore herba hac multo quàm Ocimum est infirmiore ; vtpote exili ac obscuro, sed tamen cum gravitate quadam non insuavi ad Calaminthes aut Ocimi accedente. Exit multis Germania ac Italia locis



locis sua sponte, præsertim incultis & arenosis. Aestate tota floret, & non raro Septembri etiam mense.

OCIMUM sylvestre, ut diximus, appellant plerique recentiorum. Quod autem Ocimum sylvestre Plinio, alijs est Ocimastrum & ὀκμοειδὲς. Ocimoides verò multum à præsentì herbula differt. Siliquas siquidem Ocimoides habet, Hyoscyami siliquis similes, semine nigro, quale est Melanthij prægnantes: huius autem semina minima sunt, & vasculis omnino exiguis continentur, nullam cum Hyoscyami cytini similitudinem habentibus: ita ut hinc herbulam istam, non esse legitimum Ocimum sylvestre siue Ocimastrum evidens sit. Quam ob causam ab alijs non pro Ocimo sylvestri, sed pro Clinopodio habetur: sed nec horum sententia laudanda videtur. Nam si propter florum secundum cauliculos ambitum, Clinopodium dici mereatur, multa alia eodem nomine nuncupanda erunt: ut, Calamintbes, Oruala, Ormini, Lamij, Dictamni, & Marubij species quædam, Pulegium, Salvia, Scordium, Melissophyllum, Sideritis, Galeni Alysson, recentiorum Bugula & Cardiaca, similesq; alia, quarum omnium flores orbiculatim cauliculos circundant, nulla tamen Clinopodium dicitur. Nobis hæc herba Acino haud dissimilis videtur. Acino enim Dioscorides ait, πόναν λεπτοκαρπον siue herbam tenuium sarmentorum, coronariam Ocimo similem sed hirsutiorē & odoratam. Cum qua descriptione præsens nostra satis conuenit.

FACILTATE autem aliquantulum calida est & sicca, non absque adstringendi vi ac potentia.

ACINON verò Dioscorides tradit, menses & album sistere potum; impositum verò Phygethla & erysipelata curare.


Acinos.

DE ORVALA. CAP. LXXXVI.

ORVALÆ species prior (eius etenim tres aut quatuor numerantur) quæ propriè Oruala nuncupatur, caules promit crassos quadrangulos, duos pedes longos, in alas divisos : folia & è radicibus multa, & secundum caules interuallis bina contra se posita, magna, palmum lata vel ampliora, aliquantulum aspera, inæqualia, albicantiq̃, ac nonnihil vti & caules hirsuta : flores forma florum Saluie aut Lamij, colore ex diluto ceruleo candicantes, post quos oblonga denticulata vascula pro siliquis, in quibus semen nigrum : radices verò fibrosas. Tota herba grauem fortemq̃ spirat odorem caput opplentem, & maturato semine interit, quod altero sit à satione anno. Seritur ab olitoribus in hortis. Iunio ac Iulio floret.

GALLITRICVM Officina nuncupant. Dicitur & Oruala siue Orualla, Tota bona, Sclarea, Scarlea, Centrum Galli, Matrisaluia : à Gallis Oruale : à Germanis Scharlach : à Belgis Scharlepe. Falluntur qui Alektorolophon existimant. Alektorolophon in Frumentorū siquidem historia multum ab Oruala differentem ostendimus. Videtur autem hac Oruala species, Horminum sylvestre, quod Dioscorides ait, viribus magis pollere. Inter omnes etenim Oruala ac Hormini species, nulla odore aut viribus hac potentior est.

ALTERA Oruala species, caules habet similiter quadrangulares, sed proceriores, bicubitales videlicet vel altiores : folia quoque aspera, nigriora tamen ac minora : flores similes colore purpureo rubentes : radices vti prioris. Odore hac minus præstat, omnino exiguo prædita : rara est. Floret eodem quo prior tempore. Baccharim esse, sunt qui putent ; eorum autem sententia quàm sit probanda,



ostend
mam
T
vonn
prioru
gricau
perma
Alpib
Aetlar
um d
P
fri Ho
res, ca
nora, o
matur
ces sim
ait, om
pore flo
mini h
videtur
A
E' succ
uet: sec
facit, sa
A
cution
illos in
renolat
more p
sum e

ostendet Baccharis descriptio, quam à subsequenti proximum dabit caput.

TERTIÆ Orualæ, caules quoque quadrangulosi & 3 nonnihil hirsuti sunt : folia per ambitus serrata, Orualæ prioris similia, sed minora : flores lutei : semen sufflaum nigricans : radix fibrosa, durabilis naturæ, & multis annis permanens. Apud Belgas à nonnullis in hortis feritur ; in Alpibus autem Italia iuxta Tridentum, sponte gigni fertur. Aestate floret. Horminum luteum & Horminum Tridentinum à plerisque appellatur.

POTEST his, & quarta addi species, quæ pro sylvestri Hormino à Fuchio depingitur : cauliculi huic breviores, ceterum hirsuti quoque & quadrangulares : folia minora, oblonga, profundius incisa : flores cerulei : siliquæ per maturitatem deorsum nutantes : semen nigricans : radices similiter nigre & fibrosæ. Fuchsius in Germania passim ait, omnia prata exornare, suæque sponte in ijs nasci. Tempore floreendi cum superioribus conuenit. Orualæ & Hormini hæc quoque species, sed iners, & nullius facultatis esse videtur.

AT prior, quam diximus propriè Orualam dici, calida & sicca est ordine tertio ; menses modo quouis sumpta mouet : secundas eijcit : ceruicis aut vino permixta ebrietatem facit, caputq; implet.

ANTONIVS Mizaldus semen vitile tradit, ad excutiendam oculorum caliginem, & educenda ea, quæ in illos inciderunt : in oculum siquidem immissum, & multa reuolutione circa bulbum eius circumductum, tandem humore prægnans, & tenuibus membranulis ac sordibus onustum elabitur.

HORMINVM Oruale etiam quadam species est, sed reliquis minor: caules promit complures dodrantem aut pedem altos, angulosos similiter, subhirsutos: folia lata, rotundiuscula, subaspera, Oruale multo minora, Marrubij ferè similia, quorum quatuor aut sex superiora, purpureo nigra Viola colore, sed tamen dilutiore emicant: flores iuxta folia cauliculos ambientes, colore purpureo diluto albicantes: semen exiguum oblongum nigricans, in oblongis receptaculis, veluti siliquis, quæ maturato semine radicem versus spectant: radicem longam, tenuem, non absq; fibris. Peregrinum Belgio Horminum est, & aliunde in hortos illatum. Aëstius mensibus florum eius productio: semen interea maturatur.

Οπρῖνον Græci: Latini Horminum & Geminalem appellant.

CALIDVM autem, vt inquit Paulus Aegineta, Horminum est, mediocriter siccum & abstergens. Hormini semen, Dioscorides ait, putatur cum vino potum Venerem excitare: verum cum melle, argema & albugines oculorum depurgat: cum aqua impositum oedemata discutit & aculeos extrahit. Idem herba imposita facit. Galenus in libris de Alimentorum facultatibus, de Hormino: Hoc quoque, ait, friso vtuntur, deinde eatenus leuigant, vt farina euadat; mel quoque ei admiscet. Parum in seipso habet alimenti, vt quod media inter Erysimum & Cuminum sit natura.



DE BACCHARE, EX DIOSCORIDE ET
ALIIS. CAP. LXXXVIII.

BACCHARIS auctore Dioscoride, odorata & coronaria est herba, cuius folia τράχεια; id est, aspera, alias δασέα, hoc est, densa sunt, magnitudine inter Violam & Verbascum media: caulis angulosus, cubitalis, subasper, τραπεζοειδής, id est, iuxta adnatas propagines habens: flores purpurei, subalbicantes, odorati: radices Veratri nigri similes, odore Cinamomi. Amat aspera & squalida loca. Gracili solo nec humido provenit: Plinius.

Βάκχαρις Gracè dicitur, aut τράχεαρις quasi τάρχεαρις, ut plerisque placet: à quibusdam Nardum rusticum appellatur, ut Plinius lib. 21. cap. 6. testatur. Quin & ipse Plinius lib. 12. cap. 12. Nardum rusticum appellat. Sed lib. 21. cap. 19. perperam ita dici refert; statim videlicet, ut quosdam errore falso Barbaricam eam appellare scripsit: Sed eorum quoque error, inquit, corrigendus est, qui Bacchar rusticum Nardum appellauere. Est enim alia herba sic cognominata, quam Graci Asaron vocant. Idem eodem lib. cap. 21. Baccharim quosdam Perpensam appellare ait. Perpensa autem si Asarum est, veluti inter nothas & ascriptitias voces reperitur, non minus horum error, quam priorum refellendus. Nam Baccharis & Asarum non parum differunt, uti Plinius testis est, & ex utriusque descriptionibus collatis euident. Proinde & perperam Officina Asarum, Asaram baccaram nuncupant, nomine ex Asaro & Bacchari composito; quasi idem sit Asarum & Baccharis. Qui error ex eo videtur manasse, quod inter nothas Asari appellationes, Baccharis vox etiam reperiatur: aut quod Baccharim Crateuas Asarum nuncupauerit. Quod siquidem Crateuas Asarum nominat, Dioscoridi nequaquam

quam Asarum, sed Baccharis est. Nam Asarum Dioscoridis caule caret: odoratum non est, nisi solis radicibus: nec etiam coronarium, si uti Plinius ait, vocitatum sit Asarum, quoniam in coronas non addatur. Asarum autem Crateua caules facit, & odoratum ac coronarium est. Patet ex ipsa descriptione, quæ sic habet.

ASARVM odorata & coronaria est herba: caules Asarum
eius geniculati: folia δασέα, id est, densa: flores purpurei: Crateuæ.
radix boni odoris, similis Peratri nigri, odore Cinamomo
similis. Nasquitur in asperis & squalidis.

Ex quibus verbis manifestissimum est, Asarum Crateue idem cum Dioscoridis Bacchari, & ab Asaro eiusdem esse differens: & male inter nothas voces Asaro Baccharis nomen attributum: peius verò adiectum Asarum coronariam & odoratam esse herbam, quod inter notha, etiam ascriptum reperitur.

MEMINIT Baccharis etiam Vergilius in Bucolicis ecloga septima, & non modò coronariam eam esse stirpem ostendit, verum etiam fascini depulsoriam:

— Bacchare, inquit, frontem

Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

EST & Baccharis vnguentum apud Athenæum lib. 15. quod à Bacchari odorata herba nomen habere potest. Nam, uti Plinius, vnguenta ex ea radice fieri solita, apud antiquos Aristophanes prisca Comædia Poëta testis est.


CÆTERVM Baccharis, ut Paulus Aegineta paucis complexus est, radicis decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menses citat. Folia ipsius cum sint adstringentia, fluxionibus opitulantur.

BALSAMITA coronaria herba non est, sed foliorum eius cum gravitate quadam gratus est odor. Eius duo sunt genera, folijs multum differentia: Maior videlicet & minor.

1 MAIOR caulibus assurgit rotundis, duris, sesquipedalibus: folia eius oblonga, lata, leniter per oras crenata, Lapatii folijs ferè similia, minora tamen & viroris magis albicantis: coma aurei coloris ex multis flosculis veluti corymbis, Tanaceti ac Elichrysi modo in umbella coherentibus; quorum singuli ex multis exiguis staminibus luteis simul factis, compositi sunt; radices lignosæ, durabilis naturæ, non absque multis adherentibus fibris. Apud Belgas hortensis est, passimq; etiam ab olitoribus colitur. Aestivis mensibus aurei coloris umbellas promit.

GERMANI, Frautwenkraut: Belga, Balseme: & earum officinæ Balsamitam, ac Balsamitam maiorem nuncupant. Est tamen & alia Balsamina, quæ & Charantia ac Momordica; item Balsaminum genere neutro, herba ab hac Balsamita differētes ac dissimiles. Matthiolus Mentham Græcam nominat: alij Saluiam Romanam; item herbam Lassulatam, Costum hortensem, Mentham Saracenicam, herbam D. Mariæ. Sunt qui volunt Panaces Chironium esse. Plinius etenim, & vulgaria Theophrasti exemplaria Chironium Panaces folio esse referunt Lapatii, floreg, aureo; cuiusmodi hæc herba est. Sed Dioscorides, & Nicandri interpres testem citans Theophrastum, folio illud aiunt esse Amaraci: cuius folium Balsamitæ nequaquam simile est.

2 MINOR Balsamita colore, odore, sapore & flore in umbellis aureo, maiore refert: cauliculos promit numerosos, tenues, rotundos: folia parva oblonga, serrata, ac profunde incisa;



an Achillea ageratum?



Tanacetum Balsamita

incisa
 vi pr
 herba
 tenu
 I
 Coryn
 Coryn
 ali Di
 Mesue
 viridib
 corrup
 poster
 malum
 rido E
 niam m
 minor
 Agerat
 Nam
 ni folio
 rum, ab
 Agerat
 C
 secunda
 cura fa
 appellat
 sumpta
 humore
 aut Leu
 omnibu
 non sec

incisa; comam aurei coloris, sed corymbos minores: radices
vtri prioris. Rarior hac est, nec alibi quàm apud cognitionis
herbarum studiosos reperitur. Floret eodem, quo pracedens
tempore. Balsamita haud dubio species minor est.

ITALI Giulam vocant: Valerius Cordus Mentham
Corymbiferam minorem appellat: priorem verò Mentham,
Corymbiferam maiorem. Plerique Eupatorium Mesues:
alij Dioscoridis Ageraton esse volunt. Eupatorium autem
Mesues idem cum Auicenna Eupatorio est: vires etenim
virobique eadem: sed forma descriptio in viroque auctore
corruptissima: vt satis ostendunt Auicenna exemplaria, cuius
posteriora ex Bellunenſis correctione, à prioribus hoc loco
multum differunt. Eupatorium autem Auicenna à Dioſco-
ridis Eupatorio nequaquam differt; quod vulgo Agrimo-
niam nominant herba ea notissima est, cum qua Balsamita
minor, siue Giula similitudinis nihil aut perexiguum habet.
Ageraton verò hanc herbam esse, non est quoque verisimile.
Nam Agerato folia Dioscorides tribuit Origani: at Origa-
ni folium subrotundum est: huius verò longum & ferra-
tum, ab Origani forma multum differens; quod Giulam &
Ageraton dissimiles esse stirpes ostendit.

CÆTERVM Balsamita vtraque calida & sicca est
secundo ordine, cum amaritudine & adstringendi haud ob-
scura facultate. Auxiliatur foliorum eius quam Conseruam
appellant, diuturnis capitis doloribus matutino tempore
sumpta: defluxiones è capite reprimat ac reficiat: crudos
humores ad concoctionem perducit. Prodest item Cacexia
aut Leucophlegmatia laborantibus, praesertim in initio; ac
omnibus quibus iecur debile ac refrigeratum est. Semen
non secus ac Santolina lumbricos & ventris tineaſ expellit.

REMB. DODONÆI

AD LECTOREM

EPILOGVS.



VANDO eam stirpiū quam concepimus historiam non elementorum serie, sed alia methodo, per genera videlicet digerere, propositum esset, amice Lector, omni studio ac diligentia annisi sumus, stirpes ipsas in generalissima quādam genera distribuere, ac per communissimas differentias diuidere: diuisas in libros aliquot disponere; singulis libris non modò vnus generis, sed consimilium generum complures, suo tamen quæque ordine congerentes. In vno siquidem, flores herbasque coronarias, odoratas, tum & vmbelliferas coniungere curæ fuit: in alio radices, *καθαγρινὰς* siue purgandi vi præditas, omnes excedentem qualitatem habentes, cuiusmodi sunt deleteriæ & somnificæ, ac alias nonnullas. In frugum historia, præter frumenta, leguminaque, frugum vitia, palustres & aquatiles complexi sumus. Proximus locus oleraceis relictus est: posterior arboribus ac fruticibus. Concessa etiam pars est, inconditæ multitudini, quæ ad prima illa, commodè referri non potuit genera.

Sic autem digestam historiam, & iam olim vernaculo Brabantorum sermone, nec non Gallico idio-

co idiomate editam, dudum in animo fuit Latine conscriptam dare, sed dum impendentia negotia conatus nostros remorantur, nec integram mox absolueri conceditur, proximum fuit per otium particulatim ipsam exhibere; ut in præfatione, frumentorum, leguminum, &c. historiæ latiùs scripsimus.

ITAQUE & nunc non opus totum, sed denuò partem eius, florum videlicet, & coronariarum, odoratarumque nonnullarum herbarum, historiam legendam communicamus. In qua flores quidem omnes, in coronas ac ferta receptos, tum & reliquos, qui propter eam, qua placent gratiam in hortis feruntur colunturque, contraximus: perpaucis admodum exceptis.

FLORES autem nomino eas stirpes, quæ propter flores commendatæ ac gratæ sunt: veluti radices Theophrastus appellat, quarum præcipuè in radicibus vires sunt; herbas verò, in folijs eas habentes.

OMISSI autem & præteriti illi modo flores sunt, qui ad alia stirpium genera spectare videbantur: ut quam nostri Rosam Menapiam, siue Geldrensem nuncupant, Rhododendron, Rosa fera siue Hyemalis dicta, & tales pleræque, quæ ad consimiles, quarum species sunt, aptiùs referuntur.

ROSA etenim Menapia Sambuci aquatici siue palustris species est, floribus multiplicibus, & in globum mali magni magnitudine coactis; ab

alia vulgari flores in umbellis faciente solum differens. Appellat hunc fructem Valerius Cordus *Lycostaphylum*, & utramque speciem eleganter describit: feminam nuncupat, cui flores in umbellis; marem multiplicibus flosculis, qui sterilis est.

RHODODENDRUM frutex similiter est, quem inter flores numeratum nusquam observare contingit.

ROSA hyemalis aut potius Autumnalis, Malva sativa species est, quæ ad oleracea genera pertinet.

ANEMONES simili de causa prætermissa; ex Anemone. acrium etenim herbarum genere sunt, Ranunculis haud multum ab similes. Vnius tamen hîc iconem addidimus, sativæ nempe siue hortensis à Dioscoride nuncupatæ. Depingit Matthiolus tres aut quatuor sativas, radicibus olivis stantibus similes; folijs multis, multifidis. Sed hæc nostra folia habet perpauca, Coriandri & Ranunculi cuiusdam palustris similia: flores verò pulchro quasi diluto rubore purpureos, aspectu gratissimos: radicem unius anni, olivæ supinæ ac iacenti similem, nonnihil geniculatam; vetustiore verò, omnino nodosam, ex multis veluti olivis supinis congestam. Nascitur hæc in Germania nonnullis circa Rhenum locis. Floret non primo Vere, sed serius. Sylvestrem eius speciem Theophrastus *λειμώνιαν*, id est, palustrem nominat. Floret hæc statim primo Vere. Fuchsius eam olim pro Ranunculi specie depinxit. Sunt qui Ranunculum phragmitem
voci-



vocitent . Flores eius aut lutei , aut candidi , aut purpurei .

H V I V S autem historiae editionem dum paramus ; duarum ecce rarissimarum stirpium , & ad hanc operis partem pertinentium , ad nos icones dantur , Chrysanthemi videlicet Peruniani , & Asphodeli palustris . Chrysanthemi Peruniani nobis communicavit integerrima ac honestissima domina Christina Bertolzia , à charissimo coniuge suo , clarissimo ac amplissimo viro D. Ioachimo Hoppero Regis consiliario ex Hispania sibi missam . Asphodeli autem palustris , misit multis modis ornatissimus ac nobilissimus D. Carolus à S. Audomaro , dominus de Dranoutre , vir non modò stirpium , verùm & historiae animalium omnium studiosissimus , idemque peritissimus . Vtramque autem huic libro , coronidis vice addendam putauimus . Nequaquam enim tam celebris & admirandae magnitudinis floris imago ; aut tam peregrini Asphodeli , prætermittenda videbatur .

E A D E M verò occasione & aliarum quarundam rarissimarum icones adiunximus prius non editas ; utpote Cirsij , Campanae Lazuræ à recentioribus appellatae , Papici Indici , & cuiusdam speciei Panacis ; quas stirpes , licet ad hanc florum historiam non pertineant , in notitiam tamen adduci incommodè accidere non potest . Stirpium siquidem cognitionem augeri non modò pulchrum iucundumque , verùm utile ac honestum .



Chrysan-
themum
Perunianū.

EST autem Chrysanthemum Perunianum annua quidem, sed admodum procera stirps: flos pulcher & insolitæ magnitudinis. In Peru, alijsque quibusdam Americæ prouincijs repertum fertur. Satum Madritij apud Hispanos in horto Regio, ad pedes vsque 24. adoleuit: caulem promit rectum, brachij crassitudine: folia latissima: florem Chrysanthemum aliquatenus forma similem, sed amplissimum. Medius siquidem eius discus siue orbis pedem latitudine ad duas aut tres uncias excessit, singula verò ipsum orbiculariter ambientia folia, floris Lilij purpurei maioris quodammodo similia, sed maiora, auri luteo colore. Solem Indianum, quòd Solis modo radiatus videatur, appellant. Visa hæc nobis stirps est in horto amœnissimo, ac variarum plantarum generibus refertissimo magnifici ac generosissimi D. Ioannis Brancionis, viri stirpium varietatis studiosissimi, cuius liberalitate ac beneuolentia, non pauci flores huic historiæ accesserunt, qui aliàs non fuissent additi; vtpote quos temerè alibi, quàm in eius hortis, quærere fuisset. In huius dico horto, Chrysanthemum Peruniani stirps visa est, sed ad 10. aut 11. tantum pedes adoleuit: folia aliquantulum aspera, eius quod in Hispanijs natum fuit multò minora: floris non nisi rudimentum apparuit, idque hyeme imminente; qua de causa ad perfectionem peruenire non potuit. Eadem verò stirps Patavij in Italia multò quàm in Hispania procerior facta fuit; ad pedes etenim x l. siue palmos Geometricos cxx. adoleuit; & florem quidem perfecit, sed semen ad maturitatem non perduxit, vt ab
excel-


excellentissimo viro Iacobo Antonio Cortuso Patritio Patauino in simplicium palæstra exercitatissimo ac doctissimo accepimus; in cuius amœnissimo viridario enata fuit; qui etiam facultates huius cognoscere maximè curæ habuit. Nam pediculos foliorum teneros adhuc, pilisque derasis, in craticula decoctos, sale oleoque prius preparados, esui suaues, & per quàm gratos esse, euidenti experimento cognouit; & similiter ipsos quibus floris foliola semenque insident calyces: quos & ipsius Cinaræ conis siue capitibus delicatiores suauioresque in cibo esse scribit, & non minùs, verùm amplius, πρὸς τὰ ἀποδύσσια, ad quæ plurimum possunt, facere. Qua in re industria ac diligentia eius commendari ac laudari satis non potest, dignus certè est, quem omnes docti, ac simplicis Medicinæ studiosi venerentur ac colant: cum propter diligentiam & industriam, quibus in simplicium rarorum & peregrinorum facultatibus perquirendis utitur: tum vel maximè, quòd conatus multorum, qui circa hanc Medicinæ partem laborant, ingenuè etiam adiuuare conetur, & quàm plurimum non rarè adiuuet, eorumque studia multum promoueat. Veluti ex ipsius P. A. Matthioli commentarijs omnibus notissimum est, qui ipsius Cortusi opera maximum incrementum & haud exiguum splendorem sumpserunt: ut pluribus locis Matthiolus ipse candidè testatum reliquit. Potuissent & idem quoque historiæ nostræ testari, si absolueret & ad finem perducere eas licuisset. Non pauca siquidem ab eo & rarissima & valde peregrina accepimus, quæ reliquis partibus, quibus

seruantur, non exiguum auctuarium conferent, si aliquando eas absoluere ocium fuerit. Sed ad Chrysanthemum Perunianum excurrere redeat sermo. Existimari autem posset hic flos Plinij esse Bellio, si credibile foret, illa ætate Romæ vel visum, vel vlllo modo agnitum; per ambitum siquidem luteus est, & plus quàm quinquaginta folijs, medius eius orbis cingitur. Talem etenim Plinius Bellionem esse, videtur innuere, lib. 21. cap. 8. Luteus, inquit, Bellio patulicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur. Sed verissimilius Bellionem omnino alium & minorem fore, & fortassè eundem cum Bellide; vt non pauci eruditi suspicantur; qui hunc Plinij locum corruptum iudicant.

Asphodelus palustris.

ASPHODELVS palustris folia promit pulchrè vitentia, aliquantulum striata, Iridis aut Gladioli similia, sed angusta & dodrante breuiora: caulem rectum pedalem, Asphodeli satis similem: flores è senis foliolis, exiguis staminibus in medio, veluti Asphodeli; minores tamen, colore è luteo pallentes: semen perexiguum in oblongis acuminatis vasculis: radix longa, geniculata; non absque fibris, serpit Graminis modo. Reperitur huiusmodi Asphodelus locis humidis ac palustribus in Ericetis, haud procul à Brugis Flandriæ. Æstiuis mensibus floret. Anonymos vulgo est. Asphodeli esse speciem caulis cum floribus Antherico similis ostendit; tametsi folia Gladioli sint, aut Iridis.

CIR.





Cirsion.

CIRSION ex Carduorum generibus est : folia habet oblonga, Lactucæ folijs quasi similia : verum acuminata, Buglossi vulgaris candidiora, per extrema aculeata & aliquantulum crenata : caules rectos duorum cubitorum in plures diuisos, in quorum singulis capitulum eminet hispidum, quod posteaquàm flos emarcuit, deorsum reflectitur, & tandem in lanugines resoluitur : flos ex multis staminibus, pulcher, colore purpureo rubet : semen oblongum, splendens, aliorum carduorum simile, sed quàm multorum minus : radix oblonga, in duas aut tres diuisa. Belgio peregrinum est, & aliundè in hortos illatum. Fertur alicubi in maritimis locis exire. Floret æstiuo tempore, altero à quo satum est anno. Matthiolus Cirsion etiam quoddam depingit, folijs ab isto haud multum differens, sed floribus in exiguis capitulis multis simul congestis; aliter omnino quàm istius, cuius flores, vt diximus, singulares sunt, & è maioribus capitulis exeunt.

Campana
Lazura.

CAMPANA Lazura Conuoluuli species est, Belgio & alijs multis prouincijs peregrina. Folia eius lata, angulosa, vetustis & angulosis hederæ folijs maiora, non læuia, verum aliquantulum hirsuta : cauliculi teneri, qui appositis iuxta pedamentis ac perticis in altum scandentes se circumuoluunt : flores calathi figura, Smilacis læuis ferè similia, sed per oras angulosi, colore in cæruleo purpurei. Plerique Campanam cæruleam ea de causa nominant. Videtur Ligustri non fruticis, sed alterius, cuius veterum nonnulli meminere, species.





cies.
cand

A
da, h

Ite
scribe

Ni
in ho

N

putat

putu

tur: v

huius

ntillo

cadere

N

cum l

crallos

folia e

spicas

ctas, b

tamen

ex sinu

veluti

capilla

cies. Huius etenim Ligustri duæ sunt : vna flore candido , altera nigro.

Alibi Ligustri meminit Vergilius ecloga secunda, hoc carmine:

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Item & Martialis Epigrammatôn lib. primo , scribens in Procillum:

Quadam me cupit inuide Procille

Toto candidior puella Cygno,

Argento, niue, Lilio, Ligustro.


Nigri verò mentionem fecit Columella lib. 10. in hortis.

Fer calathis Violam, & nigro permista Ligustro

Balsamia cum Casia nectens.

NIGRUM autem istud Ligustrum , Campana putatur esse Lazura siue cærulea . Nam è cæruleo purpureus color , etiam niger subinde nuncupatur : veluti Violæ nigræ . Ligustrum autem album huius generis Smilacis lævis flos est ; qui vilis nulloque colligente perit , quam ob causam eum cadere Virgilius scribit.

NON minus , immo magis peregrinum Panicum
cum Indicum nuncupatum est , culmos id promit Indicum.
crassos 8. aut 9. pedes altos , crebrò geniculatos : folia è singulis nodis arundinacea , magna , lata , spicas siue verius paniculas crassas , densè compactas , breuiiores quidem quàm legitimi Panici , sed tamen crassiores ; quæ non è summo tantùm , sed ex sinibus foliorum , breuioribus ac tenuioribus veluti culmis insidentes exeunt : semen oblongum capillaceis glumis implicatur : radices vt similitum fibrosæ




fibr
 cali
 c
 prot
 pani
 P
 aspe
 inqu
 ction
 totiu
 lijs q
 lem
 adnal
 supra
 flavu
 locis
 tis lu
 state
 enata
 tur) r
 pharm
 accept
 P A
 multi
 & alia
 pion,
 ter ha
 & alre
 uerfor
 rantur
 romio c

fibrosæ ac firmæ. Sub finem æstatis, etiam si feruens calidaque fuerit, maturitatem semen in Belgio vix consequitur : in calidioribus regionibus melius proficit. Panici speciem esse ipsa dense compacta panicula ostendit.

PANACIS species folia edit nonnihil hirsuta Panacis species.
asperaque, & terræ proxima, ampla & multiplicia, inque plura alia diuisa; circa caules verò contractiora & pauciora; quorum singularia, ex quibus totius folij compositio, oblonga sunt, lapathi folijs quadantenus similia, sed tamen minora : caulem trium aut quatuor cubitorum in ramulares adnascentias superius diuisum : flores in umbellis supra eminentibus, luteos : semen inde latum, subflauum : radix longa est & candida, quibusdam locis veluti genicula habens. Floruit in Belgij hortis Iulio & Augusto. Panacis esse speciem constare videtur : semen etenim ex quo primum hic enata in Panacis lachryma (Opoponax nuncupatur) repertum fuisse à fidissimo ac diligentissimo pharmacopœo Antuerpiensi Petro Coldenbergo accepimus.

PANACES autem, auctore Theophrasto lib. 9. multiplex est. Quoddam in Syria nascitur : deinde & alia tria sunt, Chironium, Heraclium, & Asclepion, quæ à Dioscoride solum describuntur. Præter hæc & vnum est πλατύφυλλον siue latifolium; & alterum λεπτόφυλλον tenuifolium; ita vt in vniuersum sex à Theophrasto Panacis species referantur. Cum primo autem istorum vel cum Chironio conuenire præfens posse videtur, cum reli-



quis
amp
v
m
alre
aut
Cen
rium
dem
tauri
tauri
appa
speci
fit, c
au
Syria
Plini
magn
rachij
cap. 4
suppo
Plinij
Nica
qua
roniu
esse: t
lia esse
Syriac
videtur
astriui
Syriac
stus in

quis verò minimè . Heracium siquidem folio est amplo, magno, ad ficulnea accedente : Asclepium verò Thapsiæ, aut vt Dioscorides ait, fœniculo simili . Istud verò nec huius, nec illius, sed omnino alterius formæ, neque ad ficus, neque ad Thapsiæ, aut fœniculi accedente. Rursus Panaces latifolium Centaurium magnum; tenuifolium verò Centaurium minus non temere esse putatur. Teste siquidem Plinio, Panaces à Chirone repertum, Centaurium cognominatur . Et Theophrastus Centaurij maioris aut minoris non meminit. Ex his apparet, nullum istorum quatuor, hanc Panacis speciem esse. Quòdnam verò ex reliquis duobus sit, certò etiam affirmari non potest; cum propter auctorum breuitatem; tum eorundem varietatem. Syriacum quale sit, Theophrastus non describit: Plinius illud esse ait lib. 12. cap. 26. folijs ampla Plinij error magnitudine rotundis: sed suspicio est, hæc ex Heraclij descriptione desumpta fore . Lib. etenim 25. cap. 4. Heracleoticum Origanum pro eo perperam supposuit . Chironium Theophrasti exemplaria & Plinij, folio tradunt Lapathi; Dioscoridis verò & Nicandri interpretis Amaraci. Expende Lector, & quæ magis lectio probanda veniat, cogita. Si Chironium folio est Lapathi, poterit istud Chironium esse: singularia eius siquidem folia, Lapathi similia esse scripsimus: si verò Amaraci, haud erit; sed Syriacum esse consequetur, quod verisimillimum videtur. Effundit etenim lachrymam, si caulis eius æstiuus mensibus, Sole feruente vulneretur: quod Syriacum facere Plinius apertè scribit, Theophrastus innuit; quam Chironium reddere nusquam

scriptum reperitur. Est autem lachryma hæc Opoponaci colore similis, sed nullius aut exigui apud nos odoris, quod propter soli frigiditatem accidit. In calidis siquidem regionibus omnia odoratio-
ra; in frigidis verò minus odorata gignuntur, ut Theophrastus testis. Et de his hæcenus.

At in florum historia, quid à nobis præstitum sit, qui æquum adhibiturus est iudicium, facile æstimabit. Nos ut in aliorum scriptis, sicubi veritati minus nitantur, eleuandis, nullis aut exiguis verbis utimur; ita in nostrarum lucubrationum commendatione non putamus inhærendum. Bene vale, Pridie Cal. Nouemb. Anno 1567.

FINIS.

Hic liber nihil habet Romana Ecclesia fidei contrarium, aut Reipub. offensuum.

Quod attestor Sebastianus Baer, Delphius, insignis Colleg. Eccles. S. Mariae Antuerpiens. Plebanus.

H V I V S L I B R I

I N D E X.

A

A Cinos.	278	B	
Acoros.	155 Baaras.		116
Acroscorodon.	171 Baccaris.	279. &	284
Adonidis flos.	236 Balsamita.		286
Aegilops.	171 Baptisecula.		51
Ageraton.	289 Barbahirci.		222
Aglaophotis.	114 Barbarica.		66
Alabastri.	99 Basilicum.		275
Albucus.	137 Basilicum satyrium.		216
Alisma.	76. & 220 Bellis.		245
Allium caninum.	173 Bellio.		298
Alopecuros.	34 Betonica coronaria.		66
Amarantum.	249 Bifolium.		220
Amarantus purpureus.	89 Bolbocastanon.		129
Amaracus.	257 Bolbonac.		25
Anemone.	237. & 292 Bucinum.		56
Anthemis.	227 Bulbine.	171. &	173
Anthera.	99 Bulbus esculentus.		169
Anthericos.	137 Bulbus leucanthemus.		176
Antirrhinum.	82 Bulbus sylvestris.		179
Antirrhinum sylvestre.	84 Bulbus vomitorius.		187
Aphricanus flos.	60 Bupthalmum.	230. &	237
Aquileia.	80 Buzeiden.		219
Aquilina.	ibidem	C	
Armerij flores.	66 Calathiana Viola.		34
Asarum Crateuz.	285 Calendula.		57
Aperugo.	132 Callionymos.		132
Aphodelus.	135 Caltha.	57. &	241
Aphodelus bulbosus.	140 Caltha Alpina.		59
Aphodelus luteus.	138 Camomilla.		227
Aphodelus palustris.	298 Campana lazura.		300
Astragilitis iris.	150 Campanula.		36
Aurelia.	249 Canina sentis.		190

V ;

Canis

I N D E X.

Canis cerebrum	82	Cotula alba	229
Cantabrica	66	Cotula foetida	228
Cassia	264	Cotula lutea	231
Caryophyllei flores	64. & 66	Crocus	164
Caryophyllus Indicus	60	Cuminum sylvestre alterum	
Centrum Galli	279	56	
Cepa agraria	180	Cyanus flos	49
Ceruicaria	31	Cyanus maior	51
Chamaecyparissus	254	Cyix	171
Chamaeiris	149	Cynoforchis	201. & 214
Chamaemelū odoratum	232	Cynobatos	101
Chamaemelū Romanum	234	Cynospastos	114
Chamaemelum sylvestre	228	Cynorhodon	123
Chamaemelum vulgare	225	Cypirus Plinij	157
Chironium panaces	286	D	
Chrysanthemum	231. & 243	Damasonium	76
Chrysanthemum odoratum	232	Damasonium nothum	77
		& 79	
Chrysanthemum Perunia-		Delphinium	55
num	294	Desiderium	74
Chrystitis	251	Dichomenion	114
Chrysocome	251. & 249	Digitalis	40
Cirsion	300	Digitis citrini	219
Cistus	105	Dulcisida	114
Clauellata herba	18	E	
Cleonicon	261	Elichryson	247
Clinopodium	259	Empetron	271
Cneorum	264	Entaticos	214
Color ferrugineus	125	Equitis calcar	53
Color filis Attici	15	Eranthemum	235
Comosandalus	121	Eupatorium Mesuae	286
Concilium	39	F	
Confligo	239	Ferrugineus color	125
Consolida media	247	Flores Armerij	68
Consolida minor	246	Flos Adonidis	236
Constantinopolitanus flos	72	Flos Aphricanus	60
Cornicis flos	ibid.	Flos caryophylleus	64
Corymbe	45	Flos Constantinopolitanus	
Costus hortensis	286	72	

Flos

INDEX.

Flos Cornicis	72	Intybum agreste	47
Flos Cyanus	49.& 51	Iouis flos	44
Flos frumentorum	51	Iris	142
Flos Hierosolymorum	74	Iris Astragalites	150
Flos Iouis	44	Iris bulbosa	163
Flos micancalus	49	Iris Illyrica	149
Flos petilius	62	Iris lutea	153
Flos Pothus	74	Iris sylvestris	152.& 153
Flos regius	53	Iris sylvestris lutea	155
Flos solis	109	Iris tenuifolia	148
		Iunonis Rosa	118

G

Gallitricum	279	K	
Geminalis	282	Keyri	21
Gilarus	273	L	

Githago	49	Ladanum	108
Gith ex segete	ibidem	Lanaria	74
Giula herba	289	Lassulata herba	286
Gladiolus	157	Lavandula	263
Gratia Dei	109	Laurio	273

H

Haftula regia	137	Lectipes	261
Helianthe	109	Ledon	108
Helianthemum	ibidem	Leo	84
Helleborastrum	240	Leucanthemum	227
Hemerocallis	121.& 130	Leucanthemum odoratū	232
Herba casta	114	Leucoion album	19
Herba clauellata	18	Leucoion bulbosum	191
Herba D. Mariæ	286	Leucoion luteum	21
Herba lassulata	286	Lilialis	146
Herba siminina	82	Lilium	118
Herba Trinitatis	18	Lilium caruleum	36
Hieris	146	Lilium conuallium	133
Hierobulbus	163	Lilium non bulbosum	128
Hirci barba	222	Lilium purpureum	121
Horminum	282	Lilium sylvestre	126.& 128

I

Iacea	18	Lingua ceruina	157
Iafione	39	Lunaria	27.& 114
Idæus dactylus	114	Lunaria Græca	27
		Lunaris	114

V 4

Lupi

INDEX.

Lupi	146	Ocellus Damascenus	216
Lychnis coronaria	42. & 44	Ocimastrum	47. & 278
Lychnis sylvestris	45. & 47	Ocimoides	278
Lychnitis	42	Ocimum	273
Lycopersium	63	Ocimum sylvestre	276
Lycostaphylos	192	Oculus Christi	44
Lyron	76	Oculus bouis	230
Maiorana	255	Opalis grata	82
Mariana Rosa	44	Ophris	220
Mariana Viola	27	Orchies	201. & 214
Martagon	128	Orminalis	214
Marum	255. & 257	Ornithogalon	178
Marum vulgare	259	Orontium	86
Matricaria	230	Oruala	279
Matrifaluia	279	Osyris	38. & 89
Medion	29	Othonna	62
Melandrium	231	P	
Melanthium ex Tritico	49	Pæonia	110
Menion	114	Palma Christi	219
Menogonion	ibidem	Panaces Chironium	286
Mentha corymbifera	289	Panacis species	305
Mentha Græca	286	Panicum Indicum	304
Mentha Sartacenica	ibidem	Panion	214
N		Parthenium	230
Narcissus	180	Petilius flos	74
Narcissus Iuncifolius	187	Phyteuma	86
Narcissus luteus sylvestris	189	Pneumonanthe	36
Narcissus Marcelli	186	Pothus flos	74
Narcissus medio luteus	183	Pseudo acoros	155
Narcissus medio purpureus	181	Pseudo iris	153
Nardus Italica	264	Pseudo Melanthium	49
Nardum rusticum	284	Pseudo Narcissus	189
Naronica radix	146	Pseudo orchis	220
Nautica radix	156	Pulegium montanum	269
Nigellastrum	47	Pytion	171
O		R	
Ocellus	66	Radix nautica	156
		Rapum sylvestre	27. & 31
		Rapunculum	33
		Regium	

INDEX.

Regium	275	Setanium	171
Regius flos	53	Silis attici color	15
Rhaphanitis Iris	149	Singentiana	156
Rhizotomos Iris	ibid.	Sinapi perficum	27
Rhododendron	292	Sisynrichium	159.& 161
Rosa	92	Solsequium	59
Rosa canina	100	Spatula	146
Rosa cæli	44	Spatula fœtida	151
Rosa dominarum	ibid.	Spica	264
Rosa fatuina	114	Sticas citrina	251
Rosa Græca	45	Stœcas	265
Rosa hyemalis	292	Stœcas citrina	249
Rosa Iunonis	118	T	
Rosa Menapia	291	Tanacetum Perunianum	60
Rosa syluatica	107	Taura	45
Rosmarinus coronarius	261	Testiculus canis	201
S		Testiculus hirci	210
Salvia Romana	286	Testiculus leporis	208
Sampsyichum	255.& 257	Testiculus Morionis	205
Santolina	253	Testiculus odoratus	213
Santonici semen	254	Testiculus Serapias	210
Saponaria	47.& 74	Thlaspi Crateuæ	27
Saxifragon	271	Thryallis	42.& 44.& 53
Satyrion	199.& 214	Thymum	267
Satyrion basilicum	216	Thymum capitatum	268
Saxifraga	271	Thymum durius	ibidem
Scarlata	70	Thyrus	78
Scarlea	279	Tinearia	251
Sclarea	ibidem	Tora	45
Scorzonera	222	Tota bona	279
Selenion	114	Tragopogon	222
Selenogonion	ibidem	Tragorchis	208
Semen sanctum	254	Tricolor Viola	16
Semen contra lumbricos		Trifolium Satyrium	199
ibidem		Trinitatis herba	18
Serapion	114	Tulipa	196
Serpentaria	225	V	
Serpillum	271	Vaccinium	15.& 168
Serpillum vulgare	269	Venerea radix	156
		V	
		5	Venuſta

INDEX.

Venusta minor	82	Viola Mariana	27
Veratrum nigrum	237	Violamatronalis	23
Veronica coronaria	66	Viola nigra	13. & 14
Viburnum	99	Viola parietina	23
Victoralis rotunda	157	Viola peregrina	25
Victoralis longa	159	Viola tricolor	16
Viola alba	19. & 21	Violaria	14
Viola alba bulbosa	193	Viperina	225
Viola arborefcens	21	Vnguentaria	156
Viola Calathiana	34	Vnifolium	133
Viola flamma	18	Vxinalis	87
Viola hyemalis	25	X	
Viola latifolia	26	Xyris	152

ERRATA.

Pag. 8. lin. 10. palabundos 18. 25: quod φλόγιον.
 19. 20. Micancalum. 51. 5. digestis. ibidem. 7. Cen-
 taurij. 61. 11. Othonnam. 82. 14. ci videlicet cui.
 109. 30. Chironium. 155. 23. amaras. 162. LIRIVM
 MAIVS. 180. 9. nuncupatus. 188. IVNCIFOLIUS.
 202. ALTER. 227. 9. familiare. 236. 13. ἡράνθειμον.
 287. MINOR. 288. MAIOR. transpositæ siquidem his
 locis imagines sunt. 300. 28. similes.

INDEX GRÆCARVM

VOCVM.

A

Α Γλαφοῦτις

114

Γ

ἀγριακάσσανον

179 γεραινοπόδιον

45

ἀθάνατος

45 γλυκουσιδή

114

ἄκινος

278 γογγύλη ἄρξια

30

ἄκορος

156

Δ

ἀκυλάνιον

45 διάχυσις

56

ἀμάραντον

91 διάχυτος

ibid.

ἀμέδυστος

82 διελφίνιον

55

ἀνακτόριον

157 διός ἄνθος

44

ἀνάρρινον

82

Ε

ἀνέμωνη

237. 292 ἐλειόχρυσον

249

ἀνθεμῖς

227 ἐλίχρυσον

ibid.

ἀνθμον φυλλῶδης

49 ἐμπέτρον 271 ἔρωπλος 273

ἀνθρικός

137 ἐρυθρόνιον σατύριον

199

ἄνθος τῶν ῥόδων

99

Η

ἄνθιγγονον

82 ἡμεροκαλῖς 121. & 130. 131

ἄνυδρος

184 ἡράνθεμον 227. & 236

ἄριον

157

Θ

ἄσφρόδελος

137 θαυμαστός

146

ἄτόκιον

47 θελπίδη

ibid.

ἄυτογενές

184 θεοδόνιον

114

ἄφροδισίας

156 θρυαλλῖς

42. & 44

Β

θύμος

268

Βάκχαρις

284 θύμος κεφαλῶς

268

βαλλάριον

45 θύμος σκληρότερος

ibid.

βασιλικόν

275 θύρσιον

ibid.

βειπονική

66 θύρσος

78

βολβοκάσσανον

179

Ι

βολβίνη

169. & 171 ιασιάνη

38. & 39

βόλβος αιματικός

131 ιερακοπόδιον

47

βόλβος ἐμειλικός

184. ἱέρῖς

146

& 189

ἱεροβόλβος

163

βουκράνιον

82 ἰον πορφυρεῖον

14

ἱρίς

I N D E X.

ἔρις	146 λευκόδιον	21.&169.&193
ἔρις ἄρχει	15 λευκόδιον μήλινον	23
	λήδον	108
καθαίρων	146 λιθανωτὶς τεφανωμαπική	261
κακίος	152 λιμνική	157
κακός	ibid. λυγνίτης	42.&44
καλλείριον	118 λύκοι	146
κάμαρος	56 λυχνὶς ἄρχει	47.&82
καρπός	87 λυχνὶς τεφανωμαπική	44
κέρειον	66 λυχνίτης	ibid.
κίρσιον	300	M
κίςος ἢ κίσθος	107 μαλόδιον	45
κλινονπόδιον	261 μάρον	257
κομή	222 μαχαίροφυλλον	157
κομοσάνδαλος	126 μαχαίρωνιον	ibid.
κορύμβιον	45 μελάνδιον ἐκ τῶν πυρῶν	49
κρινάνθεμον	118.&131 μελάνιον	14
κρίνον	118 μονόφυλλον	134
κρίνον ἄρχειον	131	N
κρίνον πορφυροῦν	121 Ναρκίσσος	184
κρινώνεια	118 Νηρείάδιον	56
κρόνιον	56 Νήριον	ibid.
κρόκος	165	Z
κύβηξ	171 ξίφιον	157
κύμινον ἄρχειον	56 ξυρίς	152
κυνανθεμὶς	230	O
κυνοδοτανή	ibid. ὄθωννα	62
κυνοκεφάλιον	82 ὄχιμον	275
κυνόροδος	100 ὀπερτρίτης	146
κυνόσβατον	101 ὀρμινον	282
κυνὺς ὄρχις	201.&204 ὀρνιθόγαλον	178
κύπριος	107 ὄρχις	201.&214
	ὄρχις σεραπιάς	212
λάδον	108 ὀσυρίς	89
λάδαλον	ibid. ὀυράνια	146
λαμπάς	47	Π
λείριον	118. 163.& 184 παίονια	114
λείριον ἔπερον	163 πάκχαρις	284
λευκάνθεμον	227 παράλυσις	56
		πίπτον

INDEX.

πιπών	169. & 199	τραγοπώνων	222
πιθήκιον	82	τραγορχίς	208
πόθος	74	τραχηλίον	31
πορφυρανθές	123. & 131		Υ
Ρ		υάκινθος	56. & 123. & 168
ῥόσθηρον	107	υποκίσις	107
ῥόδον	98	υσόβριον	257
ῥοδάνισα	ibid.		Φ
Σ		φάσγαγον	157
σαμψύχον	255	φλόγιον	18
σαξίφραγμα	271	φλόξ	ibid.
σαρξίφαγον	ibid.	φύτευμα	86
σατύριον	199		Χ
σατύριον βασιλικόν	216	χαμαιμήλον	227
σεισυρίχιον	161	χρυσάνθεμον	227. & 243
σκηπτρον	45	& 249	
στίχας	267	χρυσονόμη	251
στοίχας	ibid.		Ψ
σώσανδρον	56	ψιχόσσοφον	66
Τ			Ω
τάυριον	45	ώκιμοειδές	42. & 47
τραγόνατον	47	ώκιμον	275

PRIVILEGIUM CÆSAREVM.

MAXIMILIANVS II Diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus; Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatia & Sclauonia, &c. Rex; Archidux Austriæ; Dux Burgundiæ, Styriæ, Carnithiæ, Carniola, & Wirttembergæ; Comes Tyrolis &c. Recognoscimus & notum facimus tenore presentium vniuersis: inter alia maiorum nostrorum consilia, illud haud postremum fuisse comperimus, vt ad Imperij Romani decus & dignitatē plurimum facere arbitrentur, nō minus rem litterariam, quā militarem disciplinam propagare: quōd litterarum monumentis, quidquid fortiter & præclare gestum esset, illustrari cognoscerent, & æternæ memoriæ consecratum ad posteros ita transmitti, vt tam exteris quā domesticis populis, exemplo ad virtutē esse posset: quodque optimarum artium studia, & quidquid ad humanæ vitæ cultum atq; vtilitatem in quaque arte fuisset excogitatum, litteris & contineri & conseruari optimè didicissent. Illorum nos laudatis vestigiis insistere summo studio cupientes, dignum imprimis duximus prudenter & accuratè cauere; vt si quis ad eam rem quidquam vel industria vel laboribus & impensis suis cōtulerit, ne huic fraudi beneficium publicum sit. CVM itaque sincerè nobis dilectus Christophorus Plantinus ciuis & typographus Antuerpiensis nobis humiliter exponi curarit; se veteres nonnullos auctores, vel nunquam antea visos, & raros, vel emendatiores, aliæque opera magni momenti; in primis verò Biblia Hebraica, Nouum Testamentum, Eunapium de vitis Philosophorum, Illustrium de poëtis, Nonium Marcellum, Petronium Arbitrum, omnes veteres Poëtas correctos vel commentariis illustratos: Emblemata Sambuci, Dictionarium Hebraicum, Dictionarium Græcum, L. Iulium Florum de Gestis Romanorum cum Commentario Ioannis StadI, & si quæ huius generis alia, vel antea non edita vel emendatiora, locupletiora, auctiora, & illustriora facta sunt, quacunque in lingua, imprimere cōstituisse: vereri autem, ne, quod sæpenumero vsu venire consueuerit, alij non nulli, qui alieno labore & industria partis, fucorum more inhiare, & frui soleant, ea quæ ille magnis sumptibus & impensis collegit, & typis procuderit, mox ad suum cōpendium, minore sumptu & labore imitentur, atq; effingant, illi que labor omnis,

nis, sumptus & impensæ, omne quoque lucrum & laboris præmium, atque adeo (quod dici solet) oleū & opera pereat: ideoque suppli- citer à nobis petierit, vt contra huiusmodi im- probos quorundam lucri cupidorum conatus, fraudem & iniurias, Priuilegij nostri prærogatiua munire illum digna- remur. Nos huiusmodi illius precibus æquis & iustis be- nignè annuentes, & prædicti Christophori Plantini honestos conatus promouere, atque indemnitati illius quàm maximè consultum cupientes, hoc publico edicto cautum volumus, & sancimus, ne quis cuiuscunque status, gradus, ordinis, aut conditionis fuerit, quacunq; sacri Romani Imperij & ditio- nis nostræ fines patent, deinceps prædicta, aut alia quæcunq; probatorum auctorum opera, quotquot vel hæcenus non- dum impressa, vel ab aliis quidē impressa, nouis autem dein- ceptis scholiis, annotationibus, aut commentariis aucta & il- lustrata, præfatus Plantinus primus typis procuderit, intra proximum sexennium à prima cuiusque operis aut volumi- nis editione vlllo pacto eiusdem vel diuersi characteris forma excudat, aut excusa ab aliis intra nostros & Imperij fines ven- denda importet, seu quouis modo distrahat manifestè vel oc- cultè, sub pœna decem Marcharum auri puri, quarum dimi- dia fisco nostro imperiali fraudis vindici, residua verò pars prænominato Plantino cedat, præter librorum, sicut præmit- titur, ad imitationem impressorum amissionem; quos idem Plantinus vbicumque locorum nactus fuerit per se, vel suos, adiumento magistratus loci, vel citra, propria auctoritate sibi vendicare inque suam potestatem redigere potest. In cuius rei fidem præsentī edicto manu nostra subscripsimus & si- gillum nostrum apponi iussimus. Datum in ciuitate nostra Vienna Austriae, die xxi. mensis Februarij, Anno Domini M. D. Lxv. Regnorum nostrorum, Romani, I I I. Hunga- rici, I I. Bohemici verò xvii.

M A X I M I L I A N V S.

Ad mandatum sacrae Cæs.
M. proprium.

Haller.

